БАЙКАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

1930

В.В. Попов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС И ОХРАНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИКАЯ
ПРИРОДА
АЗИИ



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Байкальский государственный университет

В.В. Попов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС И ОХРАНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Иркутск
Издательский дом БГУ
2023

УДК 502.743(571.53)
ББК 28.68(253.5)
П58

Издается по решению редакционно-издательского совета
Байкальского государственного университета

Рецензенты
д-р биол. наук, проф. А.А. Баранов (КГПУ им. В.П. Астафьева)
д-р биол. наук, проф. Ц.З. Доржиев (БГУ)

Попов, В.В.
П58 Распространение, природоохранный статус и охрана наземных позвоночных Иркутской области / В.В. Попов. — Иркутск : Изд. дом БГУ, 2023. — 196 с.

ISBN 978-5-7253-3122-6.

Содержатся сведения о наземных позвоночных Иркутской области. Рассматриваются подходы к решению проблемы сохранения биоразнообразия наземных позвоночных животных с правовой точки зрения, а также вопросы их территориальной охраны.

Для широкого круга читателей: специалистов в области охраны природы; охотоведов; работников охотничьих хозяйств, правоохранительных органов, особо охраняемых природных территорий и других природоохранных учреждений; руководителей и специалистов муниципальных учреждений, проектных организаций; студентов и преподавателей вузов. Издание также может использоваться учителями общеобразовательных учреждений в качестве учебного пособия.

УДК 502.743(571.53)
ББК 28.68(253.5)

© ISBN 978-5-7253-3122-6
© Попов В.В., 2023
© ФГБОУ ВО «БГУ», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

СПИСОК ВИДОВ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 11

КЛАСС АМФИБИИ — AMPHIBIA 11

Отряд Хвостатые — Caudata 11

Отряд Бесхвостые — Anura 11

КЛАСС РЕПТИЛИИ — REPTILIA 14

Отряд Чешуйчатые — Squamata 14

КЛАСС ПТИЦЫ — AVES 17

Отряд Гагарообразные — Gaviiformes 17

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes 18

Отряд Веслоногие — Pelecaniformes 19

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes 20

Отряд Фламингообразные — Phoenicopteridae 23

Отряд Гусеобразные — Anseriformes 23

Отряд Соколообразные — Falconiformes 35

Отряд Курообразные — Galliformes 47

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes 50

Отряд Ржанкообразные — Charadriformes 55

Отряд Голубеобразные — Columbiformes 78

Отряд Кукушкообразные — Cuculiformes 80

Отряд Совообразные — Strigiformes 82

Отряд Козодоеобразные — Cahrimulgiformes 85

Отряд Стрижеобразные — Apodiformes 86

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes 87

Отряд Удодообразные — Upupiformes 87
Отряд Дятлообразные — Piciformes..... 88
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes 90
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA 145
Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla 145
Отряд Рукокрылые — Chiroptera..... 149
Отряд Хищные — Carnivora..... 154
Отряд Парнокопытные — Artiodactila 162
Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha..... 166
Отряд Грызуны — Rodencia..... 168
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..... 182

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохранение биоразнообразия, несомненно, одна из важнейших задач современности. В данном издании рассмотрены подходы к решению проблемы сохранения биоразнообразия наземных позвоночных животных с правовой точки зрения, а также вопросы их территориальной охраны. Зачастую в практике нам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда экологи имеют довольно слабое представления о правовой стороне охраны животных, а юристы практически не проявляют интереса к этой теме. Тем не менее знание правового природоохранного статуса животных имеет очень важное значение при разработке всевозможных мероприятий, связанных с их охраной, в частности при подготовке мероприятий по охране окружающей среды и оценке воздействия на окружающую среду, при проведении экологических экспертиз различных проектов, при обосновании и проектировании особо охраняемых природных территорий (ООПТ), при ведении хозяйственной деятельности, а также при проведении эколого-просветительской деятельности.

Данное издание является переработанной и дополненной версией книги «Наземные позвоночные Иркутской области: распространение и охрана», вышедшей в свет в 2015 г. В настоящем издании приведена информация о 6 видах земноводных, 6 видах пресмыкающихся, 437 видах птиц и 87 видах млекопитающих, отмеченных на территории Иркутской области. В видовых очерках приводится краткое описание вида, его распространение на территории области, характер пребывания вида, указание правового природоохранного статуса со ссылками на соответствующие нормативно-правовые документы и указание обитания вида на особо охраняемых территориях федерального значения — в заповедниках и национальных парках и регионального значения заказников. Информацию о распространении позвоночных на территории памятников природы из-за их незначительной площади мы не приводим. На территории Иркутской области в настоящее время находится два заповедника — Байкало-Ленский (659 519 га) и Витимский (585 021 га), один национальный парк — Прибайкальский

(418 000 га) и 14 заказников регионального подчинения. В настоящее время Байкало-Ленский заповедник и Прибайкальский национальный парк вместе с двумя федеральными заказниками («Красный Яр» и «Тофаларский») объединены в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Мы приводим самый полный по состоянию на данный момент список наземных позвоночных животных, когда-либо отмеченных на территории Иркутской области. Список составлен на основе анализа значительного числа доступных литературных и иных источников, картотек, собственных материалов автора и результатов опросных сведений; в него включены все виды, упоминания о встречах которых на территории Иркутской области без определенного срока давности нам удалось обнаружить. Следует отметить, что существует ряд видов, статус которых в области, возможно, нуждается в подтверждении, но критический разбор достоверности таких случаев не входит в задачи данной работы. В видовых очерках отсутствуют ссылки на конкретный источник информации о распространении видов, автор не ставил перед собой такой задачи. Применение конкретных ссылок значительно бы увеличило объем книги. Более подробное описание распространения наземных позвоночных животных в Иркутской области с соответствующими ссылками на источники сейчас находится в стадии подготовки и будет издано позднее. Таксономический и природоохранный статус наземных позвоночных определен по следующим книгам: «Млекопитающие России. Список видов и прикладные аспекты» (Лисовский и др., 2019), «Таксономический и правовой статус наземных позвоночных животных России» (Ильяшенко, 2002), «Список птиц Российской Федерации» (Коблик и др., 2006), «Красная книга Иркутской области» (2020).

Если у вас возникли вопросы, замечания или дополнения, просим обращаться по адресу: vpopov2010@yandex.ru, автор с благодарностью их рассмотрит и учтет при подготовке подобных изданий в будущем.

Книга предназначена для широкого круга читателей: специалистов в области охраны природы; охотоведов; работников охотничьих хозяйств, особо охраняемых природных территорий и других природоохранных учреждений, правоохранительных учреждений; руководителей и специалистов муниципальных учреждений, проектных организаций; студентов и преподавателей вузов Иркутской области, а также для может быть использована учителями общеобразовательных учреждений в качестве учебного пособия.

Условные обозначения

К.к. России (0, 1, 2, 3, 4, 5) — Красная книга Российской Федерации. Список видов и категории статуса редкости утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды) «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» от 24 марта 2020 г. № 162. Цифрами обозначены категории статуса редкости: 0 — вероятно исчезнувшие; 1 — находящиеся под угрозой исчезновения; 2 — сокращающиеся в численности; 3 — редкие; 4 — неопределенные по статусу; 5 — восстановленные и восстанавливающиеся.

К.к. Ирк. (0, 1, 2, 3, 4, 5) — Красная книга Иркутской области. Список видов утвержден Постановлением главы администрации области «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области» от 25 мая 2020 г. № 370-пп. Цифрами обозначены категории статуса редкости: 0 — вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных — в последние 50 лет, для позвоночных, растений и других организмов — в последние 25 лет); 1 — растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть; 2 — растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются в численности и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1); 3 — редкие растения, животные и другие организмы с естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области или спорадически распространены на значительной территории Иркутской области; 4 — неопределенные по статусу растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, которые, вероятно, относятся к одной из перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии

в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий; 5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории Иркутской области, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и которые приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

Пр. 2 Ирк. — Перечень видов растений, животных и других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но нуждающихся в бережном отношении к их популяциям по причине уязвимости, связанной с низкой конкурентоспособностью в современных условиях, реликтовостью, эндемичностью, хозяйственной значимостью (лекарственные, декоративные, пищевые, кормовые и т.п.), или иным причинам. Утвержден распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 23 апреля 2020 г. № 251-мр.

СИТЕС (I, II) — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (или Вашингтонская конвенция). Подписана 3 марта 1974 г., вступила в силу 1 июля 1975 г., СССР участвует с 1976 г., Россия заявила о продолжении выполнения обязательств по СИТЕС с 1 января 1992 г. Цифрами обозначены номера приложений Конвенции.

Меморандум о взаимопонимании в области принимаемых мер по охране стерха. Подписан в июне 1983 г. В декабре 1998 г. в текст внесены изменения. Правительство Российской Федерации (Распоряжение от 5 апреля 2001 г. № 448-р) согласилось с предложением Министерства природных ресурсов России о подписании Меморандума.

РА — Конвенция между Правительством СССР и Правительством США об охране перелетных птиц и среды их обитания. Подписана 19 ноября 1976 г.

РК — Конвенция между Правительством СССР и Правительством КНДР об охране перелетных птиц. Подписана 2 сентября 1967 г.

РК — Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об охране перелетных птиц. Подписано 2 июня 1994 г., вступило в силу 2 июля 1994 г.

РКт — Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об охране перелетных птиц и их местообитаний от 22 марта 2013 г.

РИ — Конвенция между Правительством СССР и Правительством Индии об охране перелетных птиц и мест их обитания. Подписана в октябре 1984 г. Протоколом третьей сессии межправительственной российско-индийской группы по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и природных ресурсов (Москва, 27 декабря 2000 г.) из приложения исключены виды, не распространенные на территории России, и включен в приложение дальневосточный аист.

РЯ — Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об охране перелетных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. Подписана 10 октября 1973 г., вступила в силу для СССР 10 октября 1975 г. (Постановление Совета Министров СССР от 10 марта 1975 г. № 195). В 1991 г. продлена и стала выполняться на двусторонней основе.

МСОП (CR, EN, VU, CD, NT, LC, DD) — Красная книга Международного Союза охраны природы. Буквами обозначены следующие категории: CR — находящиеся на грани полного исчезновения; EN — исчезающие; VU — уязвимые; CD — зависимые от мер охраны; NT — находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; LC — вызывающие наименьшее опасение; DD — виды, по которым недостаточно данных; NE — неоцененные. Следует отметить, что включение вида в этот список не подкреплено в России соответствующими правовыми документами.

ОО — Охотничьи виды, определены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1289» от 30 июля 1995 г. № 859, в котором приведен перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Список охотничьих ресурсов также приведен в ст. 11.1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ.

Характер пребывания видов

Гн. — гнездящийся вид.
Гн.? — возможно гнездящийся вид.
Пр. — пролетный вид.
Ос. — оседлый вид.
Зим. — зимующий вид.

Зал. — залетный вид.
Зах. — заходящий вид.
Вым. — вымерший вид.

Сокращенные названия особо охраняемых природных территорий Иркутской области

ВГЗ — Витимский государственный заповедник.
ЗП — ФГУ «Заповедное Прибайкалье (включает Байкало-Ленский заповедник, Прибайкальский национальный парк, заказники федерального подчинения «Красный яр» и «Тофаларский»).
ББ — заказник «Бойские болота».
ЗЛ — заказник «Залумайский».
ИР — заказник «Иркутный».
КД — заказник «Кадинский».
КР — заказник «Кирейский».
КЧ — заказник «Кочергатский».
ЛО — заказник «Лебединые озера».
МГ — заказник «Магданский».
ОЗ — заказник «Озерный».
ПГ — заказник «Птичья гавань».
ТР — заказник «Таюрский».
ТК — заказник «Туколонь».
ЧС — заказник «Чуйский».
ЭД — заказник «Эдучанский».

СПИСОК ВИДОВ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛАСС АМФИБИИ — AMPHIBIA

Отряд Хвостатые — Caudata

1. Сибирский углозуб — *Salamandrella keyserlingii* (Dybowski, 1870)

Имеет широкую приплюснутую голову, сжатый с боков, но лишенный кожистых плавниковых складок хвост. Окраска серо-коричневая или буроватая с мелкими пятнышками и более светлой продольной полосой на спине. Размеры взрослых достигают 12–13 см, из которых меньше половины приходится на хвост (у самцов он длиннее, чем у самок). У сибирского углозуба только по четыре пальца на задних ногах. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, более обычен в таежных районах на заболоченных участках по берегам небольших водоемов. Обычный, но немногочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Бесхвостые — Anura

2. Серая жаба — *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)

Крупная жаба, длиной 50–130 мм. Кожа спины с округлыми бугорками, иногда с заостренной вершиной. Сверху светло-серая, серая, коричневая или оливково-бурая с более или менее развитыми темными пятнами. Иногда эти пятна отсутствуют, иногда сливаются в неровные продольные полосы. В период размножения фоновая окраска становится однообразной. Брюхо светло-серое с темными пятнами.

Обитание связано с темнохвойной тайгой и производными растительными сообществами на месте гарей и вырубок по террасам рек и берегам озер. На территории области можно выделить три участка обитания этого вида: западные районы области (Тайшетский, Нижнеудинский и, возможно, Чунский), долина Ангары от окрестностей Иркутска до Куйтунского района и долины верхней Лены и Киренги. На этих участках распространена спорадически. Редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗЛ, КР, ЛО, ПГ.

3. Монгольская жаба — *Bufo raddei* (Strauch, 1876)

Средних размеров жаба: взрослые экземпляры достигают 85 мм в длину; преобладают в популяции половозрелые особи длиной 60–65 мм; сеголетки имеют длину от 18 до 21 мм. Спинная сторона окрашена в оттенки оливкового, зеленоватого и буроватого цветов с многочисленными буровато-красными крапинами; вдоль середины спины проходит узкая кремовая полоса; брюшко грязно-белое или кремоватое. Населяет побережья Малого Моря, острова Ольхон и водоемов в Тажеранской степи, единичные находки известны в устье Голоустной, в окрестностях пос. Култук и в пойме Иркута в г. Иркутске. Распространение спорадическое и носит реликтовый характер. Имеется тенденция к сокращению численности и ареала, особенно на побережье Малого Моря. Редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (1).

ООПТ: ЗП.

4. Остромордая лягушка — *Rana arvalis* (Nilsson, 1842)

Довольно широко распространенная лягушка. Сверху она коричневая или сероватая с темными пятнами и точками. Горло беловатое, большей частью с мраморным рисунком. Брюхо белое или желтоватое, в подавляющем большинстве случаев без пятен. Обычная длина взрослых лягушек — от 51 до 70 мм. Населяет заболоченные участки и побережья водоемов на большей части территории области, за исключением северо-восточных районов, причем на севере области является более обычным видом, а в бассейне Байкала ее можно отнести к редким видам.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

5. Сибирская лягушка — *Rana amurensis* (Boulenger, 1876)

Лягушка средних размеров. Задние ноги длинные с перепонками, передние короткие. Кожа гладкая и слизистая. Верх тела зеленова-

то-бурый. От других лягушек отличается яркими красными пятнами на животе. Активна в вечерние часы, нередко деятельна и днем. Населяет заболоченные участки и побережья водоемов на большей части территории области, за исключением Восточного Саяна. Отдает предпочтение луговым биотопам, по этой причине редка на севере области и более обычна в ее южной части, особенно в котловине озера Байкал.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

6. Дальневосточная квакша — *Hyla japonica* (Günther, 1858)

Мелкая лягушка, сверху ярко-зеленая или голубовато-синяя, нередко с более темными пятнами. Под глазом часто темное пятно. Темная, неясная полоса на боках не образует паховой петли. Снизу белая. Концы пальцев расширены в диски-присоски. Но основное внешнее отличие от обыкновенной квакши — отсутствие петли изгиба черной боковой линии перед задней ногой. Барабанная перепонка меньше глаза. Кожа спины гладкая, кожа брюха зернистая. Отмечена в Бодайбинском районе в Витимском заповеднике и его окрестностях в долине Витима.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (4).

ООПТ: ВГЗ.

КЛАСС РЕПТИЛИИ — REPTILIA

Отряд Чешуйчатые — Squamata

1. Прыткая ящерица — *Lacerna agilis* (Linnaeus, 1758)

Ящерица среднего размера. Длина ее тела 9–11 см, хвост примерно в 1,5 раза длиннее тела. Тело покрыто мелкой чешуей, щитками, зернышками. Самцы обычно зеленые или зеленовато-бурые, а самки буровато-серые. В зависимости от характера мест обитания окраска их тела может несколько различаться, но всегда сохраняется типичный рисунок из полос и пятнышек. Населяет западную и южную части области, в некоторой степени ее распространение привязано к Транссибирской магистрали. Обитает на сухих и хорошо прогреваемых склонах, насыпях вдоль дорог, склонах карьеров. Относится к редким видам, численность сокращается. Отдельные локальные популяции исчезли или сильно сократились в численности.

Природоохранный статус: Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП.

2. Живородящая ящерица — *Lacerna vivipara* (Jacquin, 1787)

Среднего размера ящерица длиной 15–18 см, из которых 10–11 см приходится на хвост. Она имеет коричневый окрас с темными полосками, тянущимися по бокам и вдоль середины спины. Питается мелкими насекомыми, дождевыми червями. Удерживает их мелкими зубами, не способными к разжевыванию, и проглатывает целиком. Живородящая ящерица хорошо плавает. Населяет сухие леса, луга и степи, в том числе преобразованные человеком ландшафты на большей части территории области. Обычный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

3. Узорчатый полоз — *Elaphe dione* (Pallas, 1773)

Змея среднего размера длиной тела до 110–150 см, длина хвоста не превышает 17–30 см. Вид характеризуется очень изменчивой окраской. Общий фон тела сверху серовато-буроватый, иногда с

коричневым оттенком, с четырьмя бурыми продольными полосами (две из которых «вытягиваются» на хвост) и с черноватыми пятнами. На верхней поверхности головы расположен специфический рисунок, меняющийся с возрастом. Брюхо сероватое, желтоватое со светло-красным налетом в задней части, иногда с небольшими неправильной формы размытыми пятнами. Не ядовит. Населяет степные участки вдоль побережья Байкала и остров Ольхон, также известны изолированные поселения в долинах рек Иркут и Ангара на север до Нукутского района. Населяет степи, луга, сухие леса, каменистые склоны вдоль водоемов. Редкий вид, численность которого снижается, отдельные поселения прекратили свое существование.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (2).

ООПТ: ЗП.

4. Обыкновенный уж — *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758)

Длина взрослых ужей, обитающих в Прибайкалье, достигает лишь 52–54 см, что свидетельствует об их обитании за пределами зоны экологического оптимума, для которой характерны более крупные средние размеры. Отличается от других видов встречающихся в области змей свинцовой или черноватой окраской спинной стороны тела с заметным синеватым отливом и наличием по бокам задней части головы крупных парных пятен, цвет которых изменяется от кремового до желтого и даже оранжевого. Брюшная сторона грязно-белая с черноватыми пятнами. Глаза довольно крупные с круглым зрачком. Отмечено обитание этого вида на крайнем западе области в Тайшетском районе в окрестностях пос. Нижняя Пойма. Находки относятся к 80-м гг. прошлого века, современное состояние неизвестно. Имеется информация о встречах в Нижнеилимском районе.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (4).

5. Обыкновенный щитомордник — *Agkistrodon halis* (Pallas, 1773)

Змея среднего размера: длина тела достигает 69 см, длина хвоста — 11 см. Голова широкая с хорошо выраженным шейным перехватом, сверху покрыта крупными щитками, образующими подобие щита. Между ноздрёй и глазом расположена лицевая термочувствительная ямка; зрачок вертикальный. Окраска верхней стороны тела бурая или серо-коричневая с поперечными темно-коричневыми пятнами, число которых варьирует от 29 до 50. По бокам тела проходит по одному продольному ряду более мелких темных пятен. На голове четкий пятнистый рисунок, а по ее сторонам расположена темная заглазничная полоса. Брюхо от светло-серого до бурого цвета с мел-

кими темными и светлыми крапинами. Встречаются одноцветные кирпично-красные или почти черные особи. Населяет степные и лесостепные районы на юге области, на севере до Братского водохранилища и вдоль побережья Байкала и на острове Ольхон, отмечен в высокогорье Байкальского хребта. Предпочитает прогреваемые каменистые участки на склонах гор. Обычный вид, в местах интенсивного рекреационного освоения численность сокращается.

ООПТ: ЗП.

6. Обыкновенная гадюка — *Vipera vipera* (Linnaeus, 1758)

Змея среднего размера. Самцы в среднем достигают 60 см, самки — 70 см. Голова отделена от туловища короткой шеей, морда сверху, впереди от линии, соединяющей передние края глаз, имеет три крупных щитка (один посередине и два по бокам), а также ряд более мелких. Морда закругленная на конце. Окраска варьирует от серого и голубоватого до медно-красного и черного с характерным зигзагообразным рисунком на спине вдоль хребта. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, за исключением крайнего севера Катангского района и северо-восточных районов области. Предпочитает сырые затененные с густым травостоем заболоченные участки. Редкий вид, на отдельных локальных участках может быть обычным. Численность сокращается.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

КЛАСС ПТИЦЫ — AVES

Отряд Гагарообразные — Gaviiformes

1. Краснозобая гагара — *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763)

Меньше чернозобой гагары, размером примерно с крякву. От чернозобой гагары отличается слегка вздернутым клювом. В гнездовой период голова и бока шеи серые, на шее яркое каштановое пятно. Окраска спины серовато-бурая со светлыми крапинками без контрастного рисунка. Зимой и осенью спина, голова и задняя часть шеи светло-серого цвета, остальное оперение белое. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем пере. Посадка на воде глубокая, часто и надолго ныряет. Взлетает после длительного разгона, по земле передвигаться практически не может. Полет тяжелый, напряженный. Населяет таежные труднодоступные богатые рыбой озера северной и северо-восточной части области. На пролете отмечена на побережье Байкала. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

2. Чернозобая гагара — *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758)

Водоплавающая птица крупнее кряквы с длинным прямым клювом и толстой шеей. В брачном наряде голова серая, передняя часть шеи черная, спина с контрастным черно-белым узором. В осеннем наряде и у молодых птиц верх тела и головы и задняя часть шеи темные, слабо контрастируют с белесым низом и передней стороной шеи. Посадка на воде глубокая, часто и надолго ныряет. Взлетает после длительного разгона, по земле передвигаться практически не может. Населяет горные и лесные богатые рыбой озера в северной и северо-восточной части области на юг до верховий Лены. На пролете очень редко встречается на побережье Байкала и в Верхнем Приангарье. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО.

Отряд Поганкообразные — Podicipediformes

3. Малая поганка — *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

Самая мелкая из поганок с коротким клювом и округлым телом. Хохолка на голове нет. Окраска черно-бурая, низ грязно-белый. Щеки, горло и бока шеи красно-каштанового цвета. У основания клюва желтоватое пятно. В зимнем наряде верх серый, низ белый. Известны единичные залеты на юг области в долины рек Ангара, Иркут и Тойсук (приток р. Китой). Отмечена зимовка на р. Ангара в г. Иркутске. Зал.

Природоохранный статус: РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП.

4. Черношейная поганка — *Podiceps nigricollis* (C.L. Brehm, 1831)

Размером немного меньше чирка. На голове округлый хохол и рыжие украшающие перья за глазом. Голова и шея черные, верх черновато-бурый, брюшко белое. Тонкий клюв слегка вздернут вверх. Молодые и в зимнем наряде серые с беловатым горлом и белым брюхом. Населяет пойменные богатые водной растительностью водоемы в долинах рек Иркут и Ангара, пруды и озера на территории Верхнего Приангарья и соленые озера в Тажеранской степи. Местами обычный вид, отмечена тенденция к росту численности и расширению ареала. Имеется информация о встречах в долинах рек Киренга и Тетея и на озере Очеул. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ.

5. Красношейная поганка — *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)

Мелкая поганка размером с чирка. На голове рыжие украшающие перья и черный воротник. Спинная сторона буро-серая, брюшко белое. Шея и полоса на боку рыжие. У молодых и в зимнем наряде брюшко, передняя сторона шеи и щеки белые, остальное оперение серое. Населяет лесные водоемы северной и центральной частей области, озера на побережье Байкала в Байкало-Ленском заповеднике, водно-болотный комплекс в пойме Иркута, соленые озера в Тажеранской степи и, возможно, пруды в лесостепи Верхнего Приангарья. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: К.к. России (2), Пр. 2 Ирк., РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

6. Серощекая поганка — *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)

Размером немного меньше чомги. На голове небольшой хохол. Верх тела буровато-серый, шея красно-каштановая, голова черная с

серыми щеками, брюшко белое. Клюв желтоватый с темным концом. Молодые птицы бледнее с бурой шеей. Имеется информация о встречах и возможном обитании этого вида на озерах в верхнем течении Лены, в Витимском заповеднике и в долине Нижней Тунгуски. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ.

7. Чомга — *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)

Самая крупная из поганок, размером с крякву, но стройнее. В брачном оперении хорошо отличается пышным черно-рыжим воротником и черными «ушами», осенью — чисто-белой передней стороной шеи, белой полосой над глазом и черной уздечкой, красноватым клювом. На крыле у всех птиц белое зеркало и белое пятно на переднем крае крыла, смыкающееся с зеркалом по основанию крыла. Населяет высокопродуктивные озера в окрестностях городов Иркутска (пойма Иркута) и Ангарска (бывший заказник «Сушинский Калтус»), устье р. Анга на западном берегу Байкала, побережье Братского водохранилища, пруды и озера в лесостепи Верхнего Приангарья на север до г. Тулуна. Редкий, местами обычный вид, отмечена тенденция к росту численности и расширению ареала. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП, ПГ.

Отряд Веслоногие — Pelecaniformes

8. Кудрявый пеликан — *Pelecanus crispus* (Bruch, 1832)

Крупная водная птица. Оперение белое, верхняя часть спины светло-серая. Характерен огромный клюв с подклювным мешком. Подклювный мешок и голая кожа «лица» желтые, ноги серые, радужина желтоватая. На голове и верхней части шеи «курчавые» перья образуют нечто вроде гривы. Хорошо летает, может парить. Прекрасно плавает, на воде сидит высоко. Нырять не может. По земле ходит медленно, в воздух поднимается с трудом. И с воды, и с земли поднимается на крыло, отталкиваясь обеими лапами. Отмечены единичные залеты на южный Байкал (окрестности пос. Большое Голоустное и Малое Море), в долину Лены и на Братское водохранилище (окрестности Братска и Нукутский район). В XVII в., возможно, гнездился в долине р. Ангара и на южном Байкале. Зал.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (I), К.к. России (3), К.к. Ирк. (0), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

9. Большой баклан — *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

Птица размером с гуся. Туловище продолговатое, хвост довольно длинный, клюв длинный и узкий с острым крючком на конце. Взрослые птицы черные с металлическим блеском, молодые — с белым брюхом и более бурые. У летящих взрослых птиц в брачном наряде заметны белые пятна на бедрах и щеках. Хорошо плавает и ныряет, на воде сидит очень низко, клюв при этом слегка приподнят, а хвост опущен на воду. Иногда издалека видны только голова и шея. Во время отдыха сидит вертикально, часто держит крылья широко раскрытыми, просушивая оперение. С воды взлетает после разбега, полет тяжелый, но быстрый. В прошлом многочисленный гнездящийся вид на Байкале (остров Ольхон, Малое Море, западное побережье Байкала), но к 60-м гг. прошлого века исчез на гнездовании, в отдельные годы отмечались залеты. После сорокалетнего перерыва, в 2006 г., вновь загнездился на островах Малого Моря и существенно расширил ареал на север, заселяя Братское, Усть-Илимское и Богучанское водохранилища. Отмечены залеты во внутренние районы Иркутской области на север по долине р. Лена до устья р. Чечуй. Отмечена тенденция к быстрому росту численности. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП, ЗЛ, ИР, ПГ.

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes

10. Большая выпь — *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)

Птица размером с крупную курицу, относительно коротконогая и сутулая — шея втянута в плечи и почти не видна. Окраска пестрая и сливается со цветом сухого тростника или рогоза, общий тон окраски соломенно-рыже-бурый. Ведет скрытый образ жизни, редко выходя из растительности. При опасности затаивается, вытягивая шею и клюв вертикально. Летит неторопливо, с медленными и неглубокими взмахами крыльев, шея в полете сложена и выглядит толстой и короткой. Ночью в полете издает карканье — «кау». Гнезда устраивает в зарослях тростника или рогоза. Населяет околоводные биотопы с обширными зарослями тростника на большей части территории области, но гнездование установлено только для поймы Иркута и заказника «Сушинский Калтус» в окрестностях Ангарска. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

11. Белокрылая цапля — *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855)

Размером немного крупнее вороны с относительно короткими ногами. На голове длинный свисающий хохол из рассеченных перьев. Голова и шея рыжие, спина и пятна по бокам груди черные, остальное оперение белое. Клюв желтый, ноги бледно-оранжевые. Зимой голова, шея и спина темно-бурые, остальное оперение белое с пестринами. Отмечены залеты на остров Ольхон и в Байкало-Ленский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

12. Египетская цапля — *Bubulus ibis* (Linnaeus, 1758)

Коренастая цапля размером немного крупнее вороны. От других цапель отличается более плотным сложением, массивной головой, недлинной шеей и коротким клювом ярко-оранжевого цвета. Общий окрас белый. В гнездовом наряде на темени, шее, спине и зобу окрашены в оранжево-желтый и охристый цвет. На голове, особенно у самцов, имеется хохолок. Молодые птицы без яркого цвета и с черным клювом. Отмечен залет в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ.

13. Большая белая цапля — *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица величиной с гуся с длинными ногами и шеей. Размером с серую цаплю, но отличается от нее снежно-белым оперением. Клюв черный с желтым основанием, в зимнем наряде и у молодых птиц клюв желтый. Полет и повадки как у серой цапли, вне колоний молчалива. Отмечены единичные залеты на Байкал в окрестности поселков Култук и Листвянка и в окрестности Братска и на Богучанское водохранилище. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РЯ.

ООПТ: ЗП.

14. Малая белая цапля — *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше большой белой цапли. Внешне похожа на нее. Оперение снежно-белое, хохол на голове отсутствует. Клюв желтого цвета с буроватой вершиной зимой и черный летом, ноги черные. Известен единичный залет в долину р. Нижняя Тунгуска. Зал.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ, МСОП (LC).

15. Серая цапля — *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица размером с гуся с длинными ногами и шеей. Окраска тела пепельно-серая, концы крыльев, полоса вдоль шеи и хохол

черные, клюв желтый. У молодых птиц нет хохла и клюв двухцветный с черным надклювьем и желтым подклювьем. В полете характерен S-образный изгиб шеи. Полет легкий с неторопливыми взмахами крыльев, практически не планирует. В полете шея сложена и выглядит короткой. Селятся колониями по берегам водоемов, устраивая гнезда на деревьях (Братское и Усть-Илимское водохранилища) или на скалах (Малое Море). Гнездование установлено для побережья Братского водохранилища в Нукутском, Балаганском, Братском и Усть-Удинском районах, спорадическое гнездование в Куйтунском, Иркутском, Зиминском и Усть-Илимском районах, на островах Малого Моря и на мысе Арул в Ольхонском районе и в окрестностях дельты Голоустной. На пролете посещает водоемы на большей части территории области. Обычный вид, имеется тенденция к росту численности и увеличению числа колоний. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, ЛО, ОЗ, ПР, ТК, ЭД.

16. Колпица — *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758)

Белая птица размером с цаплю. Клюв широкий и плоский, темно-бурый с желтоватым концом, расширяется на конце в виде лопатки. Ноги черные. У взрослых — желтоватый хохол, свисающий на спину (у самки он короче). У молодых нет хохла, клюв свинцового цвета, однотонный. В полете колпица то быстро машет крыльями, то держит их неподвижно; ноги вытянуты назад, шея слегка изогнута книзу. Может парить. Отмечены залеты в долину р. Ангара, на южный Байкал в окрестности пос. Култук и Иркутска. Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, СИТЕС (II), МСОП (LC), К.к. России (2), К.к. Ирк. (4).

17. Черноголовый ибис — *Treskiornis melanocephalus* (Latham, 1790)

Крупная птица, ноги относительно короткие. Отличается длинным загнутым клювом. Общий фон окраски белый, на крыльях серый цвет. Голова и шея неоперенные черного цвета. Ноги и клюв черные. Отмечен единичный залет на Малое Море в окрестности пос. Зама. Зал.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ЗП.

18. Черный аист — *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица с характерной внешностью аиста. Оперение в основном черное с металлическим зеленым и медно-красным отливом. Брюшная сторона тела белая, что хорошо заметно во время по-

лета. Клюв, ноги, верхняя часть горла, уздечка и кольцо вокруг глаз у взрослых птиц красные, у молодых — буровато-зеленые. Часто парит высоко над лесом. Населяет бóльшую часть лесной зоны, за исключением северной части Катангского района. Более обычен в долинах рек Лена и Киренга. Редкий вид, численность на территории области составляет ориентировочно несколько сот пар. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ, РИ, СИТЕС (II), МСОП (LC), К.к. России (3), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Фламингообразные — Phoenicopteridae

19. Розовый фламинго — *Phoenicopterus roseus* (Pallas, 1811)

Крупная водно-болотная птица с очень длинными ногами и шеей и большим загнутым вниз клювом. Оперение белое, чуть тронутое розовым цветом, особенно на крыльях, маховые черного цвета. Ноги розового цвета. При взлете пробегает по неглубокой воде 5–6 м. В полете вытягивает шею и ноги, образуя форму креста. Отмечены регулярные залеты на территорию области — в долину р. Ангара (окрестности г. Ангарска и устье р. Куда), на побережье Байкала и Братского водохранилища, в Тайшетский, Нижнеудинский, Усть-Кутский и Качугский районы. Зал.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (3).

ООПТ: ЗП.

Отряд Гусеобразные — Anseriformes

20. Черная казарка — *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758)

Мелкий гусь — немного больше крупной утки. Издали кажется спереди черным, сзади и снизу беловатым. На шее заметна белая полоса. Полет довольно тяжелый, но быстрый. Во время миграций стая летит волнистой линией либо тесной беспорядочной стайкой низко над землей. Редкий пролетный (залетный?) вид. Отмечены единичные встречи в долинах рек Ангара, Ока и Нижняя Тунгуска и в окрестностях Иркутска. Охота запрещена. Пр.

Природоохранный статус: РА, РЯ, К.к. России (2), К.к. Ирк. (3).

21. Краснозобая казарка — *Branta ruficollis* (Pallas, 1769)

Небольших размеров пестроокрашенный гусь, в окраске которого сочетаются черный, рыжий и белый цвета. Лоб, верх головы и

шеи, спина и брюхо черные. Пятно позади глаза, зоб и грудь каштаново-рыжие. Пятно у клюва, полоса на боку, задняя часть брюха и подхвостье белые. Редкий залетный (пролетный?) вид. Краснозобая казарка отмечена в окрестностях Иркутска, на Братском водохранилище в Братском районе, в окрестностях пгт Балаганск, в долине Киренги в заказнике Туколонь и на озере Ближнем. Известны единичные встречи. Охота запрещена. Пр.? Зал.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (3), МСОП (EN).

ООПТ: ЛО, ТК.

22. Серый гусь — *Anser anser* (Linnaeus, 1758)

Крупный гусь со светло-серой окраской головы, спины и кроющих перьев крыла. Клюв и ноги розового цвета. Хорошо плавает, полет прямой, быстрый. Очень осторожный. В прошлом гнездящийся на Байкале и в Присаянье, ныне залетный вид, но не исключено спорадическое гнездование отдельных пар. Встречен в Присаянье, на Масеевских озерах (Куйтунский район), на Братском и Иркутском водохранилищах, в лесостепях Верхнего Приангарья и Витимском заповеднике. Встречаются не ежегодно как одиночные птицы и пары, так и небольшие стаи до 30 и более особей. Охота запрещена. Вым. Гн.? Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. России (2), К.к. Ирк. (0).

ООПТ: ВГЗ, ББ.

23. Белолобый гусь — *Anser albifrons* (Scopoli, 1769)

Относительно мелкий гусь. Отличается белым пятном на лбу. Общий фон окраски светлее, чем у гуменника. Во время полета на брюхе заметны темные поперечные полосы. Клюв розовый, лапы желтоватые. Долины рек Витим, Лена и Ангара и их притоков, побережье Байкала. На пролете встречен на перевалах Восточного Саяна. Численность во время миграций сравнительно невелика. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РИ, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

24. Пискулька — *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758)

Мелкий гусь однотонного буровато-серого цвета, на брюхе при полете заметны темные пятна. На лбу белое пятно, заходящее на темя. Крылья относительно узкие, при полете характерны частые взмахи. Клюв розовый. Во время пролета встречена в долинах рек Лена и Ангара и их притоков и на южном Байкале. Численность невелика, охота запрещена. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. России (2), К.к. Ирк. (3), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

25. Гуменник — *Anser fabalis* (Latham, 1787)

Крупный гусь. От других гусей отличается черным клювом с желтой или оранжевой предвершинной полосой и очень темными (темнее туловища) головой и шеей, кроме того, от серого гуся — оранжевыми лапами, бурыми верхними кроющими крыла, от белолобого — отсутствием белого пятна на лбу и отсутствием черных поперечных пятен на брюхе. На территории области встречаются три подвида гуменника. Западносибирский гуменник и — в меньшей степени — восточносибирский гуменник пролетные на большей части территории области. На отдельных участках (побережье Братского водохранилища в лесостепной зоне) могут иметь высокую численность. Известны случаи остановки в местах отдыха во время пролета до нескольких тысяч особей. Популярный объект спортивной охоты. Численность снижается, в основном из-за неблагоприятной ситуации на зимовках. Пр. Таежный гуменник гнездится в лесных районах северной части области (Катангский, Братский, возможно Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Киренский и Казачинско-Ленский) и Присаянья (Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Нижнеудинский районы). Численность не превышает нескольких десятков пар. ОО. Таежный гуменник — Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2), К.к. Ирк. (1).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР,ЧС.

26. Белый гусь — *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758)

Гусь средних размеров. Окраска чисто-белая с черными концами крыльев. Лапы и клюв розовые, клюв с темными пятнышками по бокам и белым кончиком. У молодых верх и голова буровато-серые, брюхо белое, клюв и лапы серые. Известны залеты отдельных особей и небольших стаек на южный Байкал, в верховья р. Лена, Присаянье и Баяндаевский район. Зал. ОО.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

ООПТ: ЗП.

27. Горный гусь — *Anser indicus* (Latham, 1790)

Гусь средней величины, издали отличающийся от других гусей общей светлой окраской и белой головой. Спина темно-серая в волнистых полосах, низ светлее. Голова и бока шеи белые, сверху и снизу шея темно-бурая. На темени и затылке две поперечные черные поло-

сы. Клюв и лапы желтые. Молодые — одноцветно-серые. В большой степени наземная птица, ходит по земле быстро и легко, плавает также хорошо. Отмечены залеты отдельных особей и пар на побережье Байкала — в окрестности пос. Култук, в окрестностях Усолья-Сибирского и Иркутска, а также на хребты Хамар-Дабан и Восточный Саян. Отмечено спорадическое гнездование на Малом Море. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (2), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

28. Сухонос — *Anser cygnoides* (Linnaeus, 1758)

Крупный буровато-серый гусь (крупнее гуменника). В бинокль шея кажется светлой спереди и с боков и темной сзади. Клюв черный. Полет тяжелый. Голос громкий, протяжный, звучит как звонкое протяжное «го-о-о-о-о». Линные гуси могут плыть почти полностью под водой, высунув лишь голову. В XIX в. гнездился на южном и восточном побережьях Байкала. В настоящее время известны нерегулярные залеты отдельных птиц и небольших стаек на юг области. Вым. Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, К.к. России (1), К.к. Ирк. (0), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

29. Лебедь-шипун — *Cygnus olor* (J.F. Gmelin, 1789)

Очень крупная белая птица с длинной шеей. Клюв розовый или красный с черным основанием и вздутием. На воде сидит с приподнятыми крыльями и с изогнутой в виде буквы «S» шеей. Взлетает после длительного разбега по воде. В конце прошлого века была предпринята попытка акклиматизации на турбазе на Теплых озерах, на юге Байкала, в долине р. Снежная (Иркутская область). Залеты в исток Ангары и на Братское водохранилище в Осинский район. Зал.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт.

ООПТ: ЗП.

30. Лебедь-кликун — *Cygnus* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная птица. У особей старше года все оперение чисто-белое, у молодых — серое. Клюв желтый с черным, причем желтый цвет занимает гораздо больше половины площади клюва и заходит на черную вершину отчетливым острым углом. От лебедя-шипуна отличается окраской клюва и посадкой на воде. Населяет труднодоступные водоемы в лесной зоне на севере области, спорадическое гнездование в лесостепи (Баяндаевский район) и в окрестностях Ангарска, на пролете на большей части области. Отмечена тенденция к росту численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, ЛО, ПГ, ТК, ЧС.

31. Малый лебедь — *Cygnus bewickii* (Yarrell, 1830)

Окраской и посадкой похож на кликуна, но значительно меньше размером, клюв выглядит коротким и в его окраске значительно больше черного цвета. Граница желтого и черного цветов на клюве идет под прямым углом к плоскости клюва, а не под острым, как у кликуна. Отмечен на пролете на южном Байкале, в Тажеранской степи, в Иркутске, в окрестностях пос. Усть-Ордынский, в Баяндаевском районе, на Братском водохранилище и в Витимском заповеднике. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

32. Огарь — *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)

Крупная утка ярко-рыжего цвета во всех нарядах, что легко отличает ее от других гусеобразных. На крыле зеленое зеркало и большое белое поле. Самец хорошо отличается от самки темно-коричневым ошейником, исчезающим в осеннем пере. Цвет молодых более тусклый, буроватый. Гнездящийся вид по берегам водоемов в степных и лесостепных районах области в Верхнем Приангарье, в долине р. Лена до Усть-Кута, в Братском районе и на побережье Байкала, в Приольхонье и на острове Ольхон. Более обычен в Приольхонье и на побережье Братского водохранилища. Численность на острове Ольхон и в Приольхонье на территории Прибайкальского национального парка снижается, в Верхнем Приангарье имеет тенденцию к росту и к расширению ареала. Отмечены случаи зимовки в Иркутске. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. Ирк. (5).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

33. Пеганка — *Tadorna* (Linnaeus, 1758)

Утка крупнее кряквы, яркой пегой — черно-бело-рыжей — окраски, хорошо отличающей пеганку от других уток. Клюв красный, у самца со вздутым основанием. В полете напоминает небольшого гуся. Голос — свист у самца и тихое кряканье у самки. Хорошо плавает, легко и охотно ходит по земле. Спорадически гнездится в Тажеранской степи, известны залеты в Верхнее Приангарье. Численность не превышает нескольких пар. Охота запрещена. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

34. Кряква — *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица размером с домашнюю утку. У самца в брачном наряде темно-зеленая голова, темно-рыжая грудь и светло-серые верх и нижняя часть тела. В полете на крыльях заметно фиолетовое зеркальце. Самки, самцы вне брачного периода и молодые птицы пестрые коричнево-бежевые. Хорошо плавают, задняя часть тела и хвост приподняты над водой. Кормится на мелководьях, погружая голову и шею в воду или переворачиваясь кверху хвостом. Взлетают с воды почти вертикально, полет тяжелый и неманевренный. Населяет водоемы на большей части территории области, до нескольких сотен птиц зимует на р. Ангара в городской черте Иркутска. Обычный широко распространенный вид, может населять различные биотопы. Гн. Зим. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

35. Черная кряква — *Anas poecilorhyncha* (J.R. Forster, 1781)

Крупная утка размером с крякву. Напоминает крякву в летнем пере. Самец и самка окрашены одинаково: спина темно-бурая, бока светлые, низ грязно-белый с буроватыми пятнами. На крыльях белые пятна, образованные концами третьестепенных маховых, они у птицы видны и в полете, и при плавании. Клюв черный с желтой вершиной и черным ноготком. Ноги оранжевые, глаз коричневый. Спорадически гнездится по всей территории области, более обычна на побережье Байкала в Ольхонском районе, залеты до Витимского заповедника. В последние годы отмечена тенденция к снижению численности. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

36. Чирок-свистунок — *Anas crecca* (Linnaeus, 1758)

Размером вдвое меньше кряквы. В брачном наряде голова у самца каштаново-красная с широкой зеленой продольной полосой, проходящей через глаз. На крыле яркое зеленое зеркальце. Самки и самцы вне брачного периода однотонные коричневато-серые с пестринами. Характерен стремительный полет. Населяет водоемы различного типа на всей территории области. Один из самых обычных и широко распространенных гнездящихся и пролетных видов уток. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

37. Клоктун — *Anas formosa* (Georgi, 1775)

Немного крупнее свистунка и трескунка. В брачном пере на голове самца сложный рисунок из желтых, зеленых и черных пятен, позволяющий легко отличить его от самцов других чирков. У самки неяркое светлое округлое пятно на щеке позади клюва, отличающее ее от самок свистунка и трескунка. Самец в летнем пере похож на самку, но без пестрин на темени и с более темной спиной. Зеркало черное с зеленым блеском и белой полосой по краю. Молодые похожи на самку, но более серые. Редкий гнездящийся вид таежных районов области. На пролете встречается в долинах рек Лена, Ока, Ия, Ангара и Иркут и на побережьях Байкала и Братского водохранилища. В середине прошлого века произошло катастрофическое сокращение численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (1), МСОП (LC).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, МГ, ТК.

38. Косатка — *Anas falcata* (Georgi, 1775)

Утка средних размеров, заметно мельче кряквы. На голове длинный хохол. Третьестепенные перья крыла удлинены в виде оригинальных косиц. У селезня крупная зеленая голова с «косой» и белая шея. У самки «косы» и «косиц» нет. Она черно-бурой окраски с чешуйчатой рябью на зобу. Лапы и клюв у самцов и самок почти черные. Спорадически гнездится по всей территории области. На пролете встречается повсеместно. Относительно малочисленный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2), Пр. 2 Ирк., МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

39. Серая утка — *Anas strepera* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше кряквы. От других уток хорошо отличается белым зеркальцем на крыле, заметным на большом расстоянии. Основной тон окраски у самцов в брачном наряде — серый со струйчатым рисунком, у самок и молодых — серо-охристый с пестринами. Населяет водоемы преимущественно на юге и в центре области. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, МГ, ПГ, ТК.

40. Свиязь — *Anas penelope* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше кряквы. У самца в брачном наряде ярко-рыжая голова с высоким желтым лбом и синим клювом, грудь красноватая. В полете перед узким зеленым зеркальцем заметно белое пятно. Самки

и самцы осенью темно-бурые с охристыми пестринами на боках. Молодые более тусклой окраски. Полет быстрый, маневренный. Обычный гнездящийся вид в Катангском районе, на остальной территории области — сравнительно малочисленный на гнездовье и обычный, а местами многочисленный пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

41. Шилохвость — *Anas acuta* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше кряквы. От остальных уток отличается более длинной шеей и длинным заостренным шиловидным хвостом. У самца коричневая голова, контрастирующая с белой шеей, серая спина и белое брюхо. Самки серовато-бурые с темными пестринами. Молодые птицы похожи на самок, но темнее. Обычный гнездящийся вид на водоемах лесной зоны на севере области. На остальной территории области — редкий на гнездовье и обычный, а местами многочисленный пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

42. Чирок-трескунок — *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758)

Размером почти в два раза меньше кряквы. В брачном наряде у самца голова и зоб коричнево-бурые, на голове белая полоса, проходящая выше глаза. В полете хорошо заметен светло-сизый верх крыла, зеркальце зеленовато-серое. Самка довольно светлая серовато-бурая с пестринами. Полет быстрый. На гнездовье обычен на водоемах в нижнем течении Ангары и в поймах рек Иркут, Ия, Ока в лесостепных районах, на остальной территории редкий гнездящийся и обычный пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

43. Широконоска — *Anas clypeata* (Linnaeus, 1758)

Заметно меньше кряквы, от других уток отличается длинным, расширенным к концу в виде ложки клювом. Самцы в брачном наряде пегие с преобладанием на брюхе рыжего, на груди белого и на голове темно-зеленого цвета. Самки и самцы вне брачного сезона рыжевато-серые с пестринами, со светлыми кроющими крыла и зеленым зеркальцем. Молодые похожи на самок. На гнездовании более обыч-

на в южной части области. На пролете на всей территории области обычный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

44. Мандаринка — *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758)

Мелкая утка чрезвычайно яркой окраски. В окраске сочетание рыжего, красно-коричневого, зеленого, белого и черного цветов. На голове хохол, воротник, на крыльях удлиненные перья. Клюв красный, лапы желтые. Самка дымчато-серая, с овальными серыми пятнышками на боках и груди, клюв серый. Молодые похожи на самку. Известны единичные залеты на побережье Байкала (мыс Кадильный и пос. Култук), в долину р. Ангара и в Бодайбинский район.

Природоохранный статус: РЯ, К.к. России (3).

ООПТ: ЗП.

45. Красноносый нырок — *Netta rufina* (Pallas, 1773)

Крупная утка, примерно с крякву, плотного телосложения. Весной у самца рыжая голова, верхние перья удлинены и образуют хохол, клюв красный, шея длинная, в полете издали видна продольная черная полоса на животе. Самка буровато-серая со светло-серой шеей, клюв серый с оранжевым концом. В полете у самца и у самки видно широкое белое зеркало на всю длину крыла, у самца есть еще белая полоса по переднему краю крыла. Ноги ярко-красные, глаза у самца красные, у самки — бурые. В летнем пере самец похож на самку, отличается от нее более темной окраской туловища, полностью красным клювом, красным глазом, более ярким зеркалом. Молодые похожи на самку, но темнее, с более пятнистым низом, полностью серым клювом и грязно-оранжевыми ногами. Редкий залетный вид, отмечен в окрестностях пос. Култук. Зал. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

46. Красноголовый нырок — *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)

Нырковая утка размером немного меньше кряквы. У самца в брачном оперении красновато-коричневая голова, голубоватый клюв, серая спина и черная грудь. Самцы вне брачного периода и самки коричневого цвета с более светлой головой и темной грудью. Крылья без белого зеркальца. Молодые похожи на самок. Взлетает с воды с разбегом, полет быстрый и шумный. Обычный гнездящийся вид водоемов юга и центра области. Предпочитает водоемы, отличающиеся высокой биологической продуктивностью. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК.

47. Хохлатая чернеть — *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)

Нырковая утка размером немного меньше красноголового нырка. Самец в брачном наряде черный с белыми боками, на голове хохолок из удлиненных перьев. Самка и самец вне брачного периода бурые с беловатым брюхом и маленьким хохлом, у основания клюва узкое светлое кольцо. На крыльях хорошо выражено длинное белое зеркальце. Молодые похожи на самку, но без хохла. При плавании задняя часть тела и хвост погружены в воду. С воды взлетает после разбега, полет шумный и стремительный. Для гнездования выбирает водоемы, отличающиеся повышенной биологической продуктивностью. Обитает на большей части территории области. Один из наиболее обычных гнездящихся и пролетных видов уток в области. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

48. Морская чернеть — *Aythya marila* (Linnaeus, 1761)

Размером с красноголового нырка. В брачном периоде у самца серая спина и белые бока, голова, шея и грудь белые. Самка грязновато-бурая, вокруг клюва грязно-белое кольцо. По заднему краю крыла проходит белая полоса. Молодые похожи на самок. Редкий пролетный вид, встречается в долинах рек Иркут, Лена, на побережье Байкала и в Бодайбинском районе. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

49. Каменушка — *Histrionicus histrionicus* (Linnaeus, 1758)

Мелкая утка, размером немного крупнее чирка. Окраска черно-сизая с белыми пятнами и полосами на голове, шее и крыльях, бока каштановые. Лапы и клюв серые. Самка бурая с белыми пятнами на голове у основания клюва и за глазом. Молодая птица сходна с самкой, но пятна на голове малозаметны. Гнездится на высокогорных хребтах в северной части озера Байкал от долины р. Сарма и на востоке области, в прошлом гнездилась на юге Байкала, на пролете отмечена на Братском водохранилище и озере Байкал. Иногда зимует в истоке р. Ангара. Редкий вид, численность низкая, охота запрещена. Гн.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

50. Морянка — *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

Размером заметно меньше кряквы. От других уток отличается короткой шеей и длинным хвостом у самцов. Самец зимой белый с черной спиной, хвостом и нагрудником. Самки отличаются коротким хвостом и бурыми тонами в окраске. На щеках по округлому темному пятну. Редкий пролетный и зимующий вид. Зимует в истоке Ангары и в Иркутске, на пролете отмечен на Байкале и Братском водохранилище. Пр. Зим. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

51. Обыкновенный гоголь — *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)

Большеголовая утка размером заметно меньше кряквы. Самец в брачном оперении белый с черными головой, спиной, хвостом и концевыми частями крыльев. Самки и молодые птицы темно-бурые с коричневой головой и белыми зеркальцами на крыльях. Хорошо ныряет и плавает под водой. С воды взлетает легко, полет стремительный и маневренный с характерным свистом крыльев. Населяет водоемы лесной зоны. На гнездовье обычен на всех водоемах таежной части области. Гнезда устраивает в дуплах деревьев. В области находится крупнейшая в Северной Азии зимовка в истоке и в верхнем течении р. Ангара, насчитывающая в отдельные годы до 20–25 тыс. гоголей. Гн. Зим. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

52. Сибирская гага — *Polysticna stelleri* (Pallas, 1769)

Морская утка средних размеров. На крыле у всех птиц блестящее зеркало с синим отливом. У самца весной спина, горло и шея черные, голова белая с зеленым пятном на затылке. Грудь и бока каштаново-рыжие, середина груди и брюхо черные. Клюв и лапы сине-серые, глаз красноватый. Самка и молодые — рыжевато-бурые с поперечным рисунком. Известны залеты на Братское водохранилище в Братском районе и в Куйтунский район. Зал.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ, К.к. России (2), МСОП (NT).

53. Синьга — *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758)

Крупная утка размером немного меньше турпана. Отличается от него отсутствием белого зеркальца на крыле. У самки нет светлых пя-

тен на голове, щеки и верхняя часть шеи имеют серую окраску. Полет быстрый, маневренный. Отмечены залеты в Бодайбинский район и окрестности Иркутска. Зал. ОО.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

54. Горбоносый турпан — *Melanitta deglandi* (Bonaparte, 1850)

Крупная утка, характерна черной окраской самца и темно-бурой у самки. Имеются белые зеркальца на крыльях. Клюв с сильно развитым наростом. У самца белое пятно около глаза, у самки два светлых пятна на голове перед и за глазом. Хорошо ныряет, долго оставаясь под водой. Населяет побережье в центральной и северной части Байкала, озера в высокогорьях, по западному макросклону Байкальского хребта и на хребте Хамар-Дабан и, возможно, долину р. Ангара в Нижнеилимском районе. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ТК, ЧС.

55. Обыкновенный турпан — *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)

Крупная утка, характерна черной окраской самца и темно-бурой у самки. Имеются белые зеркальца на крыльях. У самца белое пятно около глаза, у самки два светлых пятна на голове перед и за глазом. Хорошо ныряет, долго оставаясь под водой. Отмечен единичный залет в конце XIX в. в окрестности Иркутска. ОО.

Природоохранный статус: МСОП (EN).

56. Савка — *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1828)

Крупная утка с черно-белой головой и синим, заметно утолщенным у основания клювом. У самки голова бурая с белой полоской. Отличительным признаком является длинный и жесткий хвост, который савка часто держит поднятым вверх. Известен единичный залет в XVIII в. в окрестности пос. Никола в истоке Ангары. Зал.

Природоохранный статус: РИ, СИТЕС (II), К.к. России (1), МСОП (EN).

ООПТ: ЗП.

57. Луток — *Mergus albellus* (Linnaeus, 1758)

Размером вдвое меньше кряквы. Самец преимущественно белый с черными спиной и маской на голове. Самка темно-серая с рыжей головой и белыми щеками. На крыльях белые зеркальца. Молодые похожи на самок. На воде сидит глубоко, шея втянута в плечи. Хорошо ныряет, полет быстрый. Населяет водоемы северной и северо-восточной части Иркутской области, предпочитая относительно продуктивные небольшие лесные водоемы. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, КР, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

58. Длинноносый крохаль — *Mergus serrator* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше кряквы. Характерен узкий длинный клюв, загнутый на конце. У самца голова и спина черные, бока серые, зоб рыжий, «ошейник» и крылья белые. Самка серая с рыжей головой, граница рыжего и серого цвета размыта. На голове у самца и самки хохол, в полете на крыльях видны зеркальца. Хорошо ныряет. При взлете долго бежит по воде, полет быстрый с частыми взмахами крыльев. Населяет побережье Байкала, водоемы южной части области и долины р. Катанга. На побережье Байкала обычный, на Малом Море многочисленный вид, на остальной территории области — редкий. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, ЛО, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

59. Большой крохаль — *Mergus merganser* (Linnaeus, 1758)

Заметно крупнее кряквы. От других уток, кроме длинноносого крохаля, отличается длинным узким загнутым на конце клювом красного цвета. Самец белый с крупной черной головой и спиной, хохол отсутствует. В полете на крыле заметно крупное белое пятно. Самка серая с рыжей головой и хохлом, от самки длинноносого крохаля отличается резкой границей рыжего и серого цвета. Молодые похожи на самку, но с более коротким хохлом. Хорошо плавает и ныряет. Населяет побережье среднего и северного Байкала и водоемы таежной зоны области, особенно в северо-восточных районах. Отдельные птицы остаются на зимовку на незамерзающих участках рек и в верхнем течении р. Ангара. На таежных малодоступных участках рек обычный, на остальной территории редкий вид. Ориентировочно на территории области гнездится несколько десятков тысяч особей. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, ЛО, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Соколообразные — Falconiformes

60. Скопа — *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица, в два раза крупнее вороны, с длинными, сравнительно узкими крыльями вдвое крупнее, чем у вороны. Окраска контрастная: верх темный, низ с перевязью из темных пестрин поперек зоба, голова белая с широкой черной полосой через глаз. У молодых на спине

светлый чешуйчатый рисунок. Глаза ярко-желтые. Лапы не оперенные. Летает над водой, периодически зависая на одном месте. Питается исключительно рыбой, которую ловит, ныряя с разлета. Гнезда обычно устраивает на обломанных вершинах крупных деревьев вблизи от водоемов. Населяет побережья крупных водоемов и рек таежной зоны. Численность в области составляет ориентировочно около 100 пар. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ТФ, ББ, ЗЛ, ИР, КЧ, ЛО, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

61. Хохлатый осоед — *Pernis ptilorhynchus* (Temminck, 1821)

Сравнительно крупная птица, примерно в полтора раза больше вороны. Хвост относительно длинный, закругленный. Окраска очень изменчива — от темно-бурой до светло-охристой. На передней части шеи часто имеется темное подковообразное пятно. У самца на хвосте две широкие черные полосы, у самки и молодых — частые поперечные полосы. На затылке небольшой хохол. Весьма малозаметная, скрытная птица. Населяет мелколиственные леса южной и центральной части области. Отмечена тенденция к росту численности и расширению ареала на север. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, СИТЕС (II), Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ИР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

62. Черный коршун — *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)

Крупная хищная птица размером вдвое больше вороны. Отличается темно-бурой окраской, длинными крыльями и вильчатой вырезкой на хвосте. Его можно встретить парящим над лугами и лесными опушками. Населяет лесные, лесостепные и интразональные биотопы на большей части области, более обычен в лесостепи. Единственный вид из наших хищных птиц, способный образовывать внегнездовые скопления до нескольких десятков, а иногда сотен особей. Один из наиболее обычных видов хищных птиц. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

63. Полевой лунь — *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)

Размером заметно крупнее вороны. Старые самцы пепельно-серые, почти белые с черными концами крыльев. Самки коричневые с широким белым надхвостьем и со светлым ошейником, верх крыла без светлого пятна. Молодые птицы похожи на самок. Характерен скользящий полет низко над землей. Населяет открытые пространства

на большей части области, но гнезда устраивает в зарослях кустарников или подроста. Отмечены единичные случаи зимовки. Обычный вид, в области обитает свыше тысячи пар. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

64. Степной лунь — *Circus macrourus* (C.G. Gmelin, 1771)

Размером немного меньше полевого луня. У самца окраска немного светлее, чем у полевого, черное пятно на конце крыла меньших размеров и клиновидное. Самки и молодые похожи на самок других луней, но отличаются узким белым пятном на надхвостье. Полет как у других луней. Отмечен залет в водно-болотный комплекс в долине р. Иркут и на Зиминско-Куйтунский степной участок. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (3), МСОП (NT).

ООПТ: ПГ.

65. Луговой лунь — *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)

Похож на полевого луня, но более стройный и узкокрылый. Самцы несколько темнее полевого и степного луней, на раскрытых крыльях заметны темные пестрины, низ тела с немногочисленными рыжими пестринами. Самки и молодые птицы похожи на самок полевого луня, полет более маневренный, крылья светлее и белое пятно на надхвостье уже, чем у полевого луня. Отмечен единичный залет в водно-болотный комплекс в долине р. Иркут. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ПГ.

66. Пегий лунь — *Circus melanoleucos* (Pennant, 1769)

Размером меньше полевого луня. Самец окрашен пестро. Голова, шея, зоб, спина, полоса на крыле и первостепенные маховые черные, хвост сизый, все остальное белое. Самка темно-бурая, снизу светлее с рыжеватыми окаемками перьев и серым оттенком на крыльях, надхвостье — узкая полоса белого цвета с пестринами. Молодые — темно-бурые с рыжеватым теменем и охристо-рыжеватым надхвостьем. Известна единичная находка гнезда на острове на р. Ангара в окрестностях Иркутска и отмечены залеты в долину р. Иркут и в Киренский район. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РИ, СИТЕС (II).

67. Болотный лунь — *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из луней — в два раза крупнее вороны. Общий фон оперения коричневый, у старых самцов пепельный хвост и под-

крылья, концы крыльев черные. Самки и молодые птицы темнее, чем у других луней, белое надхвостье отсутствует. У взрослых самок на голове есть желтая шапочка. Полет характерный для луней. Населяет водно-болотные комплексы в долине р. Ангара и по ее притокам в Верхнем Приангарье и в долине р. Нижняя Тунгуска, на остальной территории области встречается на пролете. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ, ЭД.

68. Восточный болотный лунь — *Circus spilonotus* (Kaup, 1847)

Размером с болотного луня. У взрослого самца голова и шея беловатые, щеки черные, на серых крыльях белые пятна, брюшная сторона белая с черными наствольными пятнами на зобу и груди. Самки похожи на самок болотного луня, но более охристые и отличаются поперечно-полосатым хвостом. Молодые похожи на самку, но более охристые. Следует отметить высокую степень изменчивости окраски, как возрастной, так и индивидуальной, особенно у самцов. Установлено гнездование в пойме Иркута в окрестностях Иркутска и в заказнике «Сушинский Калтус» в окрестностях Ангарска, также отмечены встречи в Качугском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском и Аларском районах, отдельные встречи отмечены в западной части области. Численность имеет тенденцию к росту, а ареал к расширению. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, КД, ПГ.

69. Тетеревятник — *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)

Крупный хищник, вдвое крупнее вороны, причем самка почти на треть крупнее самца. Верх серый, низ светлый с поперечными пестринами у взрослых и продольными у молодых. У молодых в окраске есть охристые тона. Верх головы темный, над глазом имеется светлая полоса. Хвост длинный с поперечными полосами. Глаза светло-желтые. Скрытный, на добычу нападает из-за засады. Населяет лесные и лесостепные районы на большей части территории области, редко зимует в южной части области. Обычный вид. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РИ, РЯ, РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

70. Перепелятник — *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше вороны. Поведение, форма тела, голос и окраска как у тетеревятника. У взрослого самца щеки и полосы на нижней части тела рыжевато-красные. Полет легче и маневреннее, хвост от-

носительно длиннее. Относительно скрытен, часто нападает из-за засады. Обитает в лесной и лесостепной зонах, редко зимует в лесостепи и в Иркутске. Один из наиболее обычных видов хищных птиц, в области обитает несколько тысяч пар. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

71. Малый перепелятник — *Accipiter virganus* (Temminck et Schlegel, 1844)

Самый мелкий из ястребов (меньше голубя). У самца верх аспидно-сизый, низ рыжий с поперечными белыми полосками, глаза буро-красного цвета. У самки верх бурый, низ беловатый с бурым поперечным рисунком, глаза желтые. Потревоженные у гнезда ведут себя шумно, голос передается как «тай-тай-налетай». От обыкновенного перепелятника хорошо отличается отсутствием белых бровей. Населяет лесные районы центральной и южной частей области. Встречен в Витимском заповеднике. Более обычен в горных лесах Байкальского хребта. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, КЧ, ТК.

72. Зимняк — *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)

Внешне похож на канюка. Отличается более светлой окраской. Заметно светлее подкрылья, хвост и надхвостье. Имеются черные пятна на сгибах крыла и черная полоса на хвосте. Характерной особенностью является способность зависать на месте, как пустельга. Пролетный вид на большей части территории области и зимующий в лесостепных районах Верхнего Приангарья. Численность пролетных и особенно зимующих птиц сильно зависит от состояния кормовой базы. В наиболее благоприятные годы с высокой численностью грызунов в области может зимовать до сотни и выше особей. Пр. Зим.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

73. Мохноногий курганник — *Buteo hemilasius* (Temminck et Schlegel, 1844)

Очень похож на обыкновенного канюка, но несколько крупнее (размах крыльев до полутора метров). Имеет две морфы — светлую и темную. Светлые птицы светло-коричневой и охристой окраски — полосы на хвосте узкие и размытые, горло и грудь охристые. Хвост светлый и снизу, и сверху, имеет несколько неясных полос. Птицы

темной морфы однотонные темно-бурые, встречаются гораздо реже. Цевка спереди оперена до половины длины или до пальцев. Населяет степные и лесостепные районы, зимует в долине р. Куда и в населенных пунктах. Залеты в Киренский район и Витимский заповедник. На территории области стал гнездиться с конца прошлого века. Отмечался рост численности, но в последние годы она стабилизировалась или начала снижаться. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

74. Курганник — *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)

Похож на канюка, но несколько крупнее и светлее. Верх светло-бурый с рыжим оттенком, низ охристый или рыжеватый, часто с пестринами, маховые беловатые с серыми концами, на сгибах крыла заметны темные пятна, хвост в поперечных полосах, но издали кажется одноцветным. Встречается темная морфа, целиком окрашенная в бурый цвет. Отмечен единичный залет в прошлом веке в долину р. Ангара. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (3), СИТЕС (II), К.к. России (3).

75. Канюк — *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)

В полтора раза крупнее вороны. Оперение бурое, темное сверху и более светлое с густыми пестринами снизу. Нижняя сторона крыльев и хвост полосатые. Молодые птицы более пестрые. Глаза темные. В полете хорошо заметны округлые формы крыльев и хвоста. Характерно долгое паренье над лесными опушками или лугами. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области. Один из наиболее обычных видов хищных птиц в области. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

76. Орел-карлик — *Hieraaetus pennatus* (J.F. Gmelin, 1788)

Внешне похож на настоящих орлов, но отличается меньшим размером (размах крыльев немногим более метра). Хвост в отличие от хвостов других орлов длинный и узкий, причем снизу он всегда светлый, без поперечных полос. Лапы, как у всех орлов, оперены до пальцев. Окраска бывает двух морф — светлой и темной. У птиц светлой морфы верх тела бурый, низ светло-охристый с узкими темными пестринами. У темных птиц окраска коричнево-бурая, на голове часто золотистый или рыжеватый оттенок, как у настоящих орлов. Ма-

ховые перья всегда темные, без поперечных полос. Отмечены встречи в пойменных лесах Предсаянья, в долинах рек Лена, Киренга и Голоустная, в Усть-Илимском районе. На гнездовье отмечен в Верхнем Приангарье в Нукутском районе. Отмечена тенденция к расширению ареала и росту численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (5).

ООПТ: ЗП, ЛО, КЧ, ПГ, ТК.

77. Степной орел — *Aquila nipalensis* (Hodgson, 1833)

Крупный представитель орлов. Размах крыльев от 175 до 210 см. Окраска однотонная светло- или темно-бурая. Молодые отличаются от взрослых наличием полос на нижней поверхности крыльев, продольными пестринами на брюхе и штанах, более яркими тонами оперения. Встречается в степных районах юга Иркутской области, на гнездовье отмечен в Нукутском районе. Вероятно, на территории области гнездится около десяти пар. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП, ПГ.

78. Большой подорлик — *Aquila clanga* (Pallas, 1811)

Орел средних размеров, размах крыльев — 160–180 см. Оперение очень темное, на надхвостье часто имеется светлое пятно. От других орлов отличается также коротким и широким закругленным хвостом, несколько загнутыми книзу концами крыльев при планирующем полете. У молодых птиц на перьях спины и верхней части крыльев имеются четкие светлые пятна каплевидной формы. Населяет пойменные леса на большей части территории области, за исключением крайнего севера. Отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (2), МСОП (VU).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КР, КЧ, ЛО, ПГ.

79. Могильник — *Aquila heliaca* (Savigny, 1809)

Крупный орел (несколько мельче беркута), крылья относительно длинные, хвост короткий. Окраска взрослых темно-бурая, почти черная, без белого цвета на хвосте. Оперение головы и шеи золотистого, иногда почти белого цвета, примерно каждый десятый орел имеет белые пятна на «плечах». Молодые птицы светло-бурые, на груди и брюхе довольно широкие продольные пестрины. Клюв темный, восковица и лапы ярко-желтые. Населяет степные и лесостепные районы на север до Зиминского и Качугского районов, более обычен в

Верхнем Приангарье. В Приольхонье и на острове Ольхон практически исчез. Отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (1), К.к. Ирк. (1), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП, ПГ.

80. Беркут — *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из наших орлов. Окраска оперения темно-бурая. На затылке, задней стороне шеи, брюхе, голени заметная примесь рыжего цвета. Первостепенные маховые черно-бурые с сероватыми основаниями. У молодых птиц имеются белые пятна на крыльях, хвост белый с широкой темной полосой на конце. Восковица и ноги ярко-желтые. Лапы мощные, оперены до пальцев. При планировании держит крылья немного приподнятыми. Населяет лесные, лесостепные и горные районы на большей части области. Редко зимует, в отдельные годы до нескольких десятков особей. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ПГ, ЧС.

81. Орлан-долгохвост — *Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771)

Очень крупная птица (размах крыльев до двух с половиной метров), похожа на орлов, но с более широкими крыльями, мощным очень высоким обычно светло-желтым клювом, тяжелым, машущим полетом (парят редко). Цевка оперена только до половины. Похож на орлана-белохвоста, но мельче, более легкого сложения, темнее, голова и горло светлые, хвост длинный, закругленный, белый с поперечной темной полосой, клюв на конце синеватый. Молодые птицы светло-бурые с темным хвостом, по бокам головы темные пятна. Встречен на юге (окрестности пос. Култук и г. Слюдянка) и в средней части Байкала (Приольхонье), в Нукутском районе, в верховьях р. Лена и в долине р. Нижняя Тунгуска. Зал.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (4), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

82. Орлан-белохвост — *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная хищная птица размером больше беркута. Общая окраска бурая, у старых птиц хвост чисто-белый, у молодых — темный. У молодых птиц также отмечены светлые пестрины в оперении. Лапы желтые неоперенные с мощными и острыми когтями. В полете отличается широкими и длинными «прямоугольными» крыльями и

относительно коротким клиновидным хвостом. По полету похож на орлов — подолгу парит с неподвижными крыльями. Населяет побережье Байкала, а также берега крупных водоемов и рек лесной зоны в долинах рек Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска. Отмечены спорадические зимовки на Байкале в истоке Ангары и в Верхнем Приангарье. Отмечена тенденция к снижению численности. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (I), К.к. России (5), К.к. Ирк. (2), МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, МГ, ПГ, ТК.

83. Кумай — *Gyps himalayensis* (Hume, 1869)

Крупная птица, длина тела достигает 1 м, вес до 10 кг, размах крыльев до 3 м. Общая окраска оперения светлая, спина бледно-палево-серая, надхвостье белое, брюшная сторона беловато-охристая. Голова и шея не покрыты перьями, на шее имеется ожерелье из рассученных заостренных перьев охристо-буроватого цвета. Клюв роговой с желтизной, восковица бледно-бурая. Ноги серые, когти черные. Молодые птицы более темные. Отмечен залет в Тажеранскую степь.

Природоохранный статус: МСОП (NT), СИТЕС (II).

ООПТ: ЗП.

84. Черный гриф — *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)

Крупная птица с длинными и очень широкими крыльями (размах до 2,5 м) и коротким широким хвостом. Основной тон окраски темно-бурый, молодые птицы почти черные. Голова покрыта серым пухом, шея почти голая, голубоватая, вокруг основания шеи бурый воротник из рассученных перьев. Глаза черные, лапы серые. Полет парящий. Известны залеты с конца прошлого века на южный Байкал, в Тажеранскую степь, в Верхнее Приангарье (Нукутский и Иркутский районы) и в Катангский район. В ближайшие годы возможно появление на гнездовании. Зал.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (4), МСОП (NT).

ООПТ: ЗП.

85. Бородач — *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1766)

Огромная птица с длинными острыми крыльями (размах до 2,7 м) и длинным узким клиновидным хвостом. Под клювом «борода» из жестких черных перьев. Клюв и лапы серые. Цевка оперена до пальцев. Через глаз (красный) проходит косая черная полоса. Основной тон окраски светло-серый, буроватый или рыжий; спина, крылья и хвост темно-серые или черные. В полете заметно темное горло.

Молодые — буро-черные со светлым низом. Возможно, гнездится в Тофаларии, отмечены залеты в долину р. Нижняя Тунгуска и в Бодайбинский район. На территории области, возможно, гнездится не более пяти пар. Гн.?

Природоохранный статус: СИТЕС (II), МСОП (NT), К.к. России (3), К.к. Ирк. (4).

ООПТ: ЗП.

86. Стервятник — *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)

Крупная птица с длинными широкими крыльями и длинным сравнительно узким клиновидным хвостом. Клюв длинный и слабозагнутый, кожа на затылке и лицевой части неоперенная желто-оранжевого цвета, на затылке и шее воротник из заостренных перьев. Взрослые птицы чисто-белые с черным. Отмечен залет в окрестности Иркутска. Зал.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), МСОП (EN), К.к. России (1).

87. Кречет — *Falco rusticolus* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из соколов, значительно крупнее вороны. Имеется две морфы — темная и светлая. Окраска серая, иногда белая с темными пестринами как на верхней, так и на нижней стороне тела. «Усы» выражены слабо, глаза темные. Очень осторожен. Зимует и встречается на пролете в южной части области и на побережье Байкала, а также в населенных пунктах. Отмечено гнездование в Катангском районе и предположительно в горах вокруг Байкала. На гнездовье отдельные пары, не более пяти; на зимовке в благоприятные годы несколько десятков особей. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ, СИТЕС (I), К.к. России (2), К.к. Ирк. (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ.

88. Балобан — *Falco cherrug* (J.E. Gray, 1834)

Крупный (крупнее вороны) сокол. Окраска весьма изменчива — от темно-бурой до рыжевато-серой. Низ чаще всего светлый с темными каплевидными (у молодых — продольными) пестринами. У взрослых лапы и восковица желтые, у молодых — голубовато-серые. Населяет степные и лесостепные районы. Более обычен в Верхнем Приангарье, значительно реже встречается на Ольхоне и в Приольхонье. Во второй половине прошлого века наблюдалось расширение ареала, с 90-х гг. отмечено сокращение численности, сильно пострадал от браконьерства. В настоящее время в области гнездится не более 50 пар. Известен единичный случай зимовки в Боханском районе. Гн.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II), МСОП (EN), К.к. России (1), К.к. Ирк. (1).

ООПТ: ЗП.

89. Сапсан — *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771)

Крупный сокол. Несколько крупнее вороны, меньше кречета и балобана. Крылья острые, хвост чуть клиновидный. Окраска контрастная. Верх головы, спина, крылья, хвост темные. Низ тела светлый с темным поперечным рисунком. На щеках черные «усы» (таких нет ни у балобана, ни у кречета). У молодых низ тела покрыт крупными продольными пестринами, лапы желто-серые (у взрослых — желтые). Встречается на большей части области, за исключением высокогорных районов. Предпочитает гнездиться на скальных участках по берегам водоемов. Отмечена тенденция к росту численности, в последние годы стал гнездиться в лесостепи. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (I), К.к. России (3), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, ЛО, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

90. Чеглок — *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше вороны. Окраска контрастная — темная спина и светлый низ, черная голова и белые щеки, красное подхвостье у взрослых птиц. Брюхо и грудь с темными пестринами. Хорошо выражены черные «усы». Крылья длинные, заостренные. Полет стремительный и маневренный, добычу ловит в воздухе. Населяет лесные и лесостепные районы. Один из обычных видов хищных птиц, но в последние годы отмечена тенденция к сокращению численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

91. Дербник — *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758)

Мелкий сокол с относительно короткими крыльями и длинным хвостом. Верх сизый, низ беловато-рыжий с продольными пестринами. Хвост полосатый с темным концом. Самки и молодые сверху темно-бурые, снизу буроватые с пестринами сверху и снизу. На полете крылья изогнуты серпообразно. Охотится обычно на низком бреющем и маневренном полете. Возможно гнездование в горах по побережью Байкала и в лесостепи Верхнего Приангарья. На пролете встречается на всей территории области. Отмечены зимовки на юге области в населенных пунктах и степных районах. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КР, ЛО, ПГ, ТК.

92. Кобчик — *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766)

Мелкий соколок размером меньше голубя. Самец весь черный с ярко-рыжими штанами и подхвостьем. Лапы и восковица у клюва красные. У самки верх серый, низ охристый, голова рыжая. Полет легкий, порхающий. В прошлом обычный вид, населял западные, степные и лесостепные районы, отмечен и в окрестностях населенных пунктов в долинах рек Лена и Нижняя Тунгуска. В настоящее время в лесостепи встречается не ежегодно и только на пролете. В последние годы отмечены встречи в гнездовое время в Усть-Илимском районе. Вым. Гн.?

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), МСОП (NT), К.к. России (3,) К.к. Ирк. (4).

93. Амурский кобчик — *Falco amurevsis* (Radde, 1863)

Внешне похож на кобчика. Отличается крупными белыми пятнами на нижней стороне крыльев. У самки серая голова, белые щеки и горло. Отмечены единичные залеты в Витимский заповедник и в Иркутск. Зал.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ.

94. Степная пустельга — *Falco naumanni* (Fleischer, 1818)

Очень похожа на обыкновенную пустельгу, но мельче и стройнее. Полет легче, в воздухе не трясется. И самец окрашен поярче — верх красновато-коричневый без пестрин, голова темно-сизая, низ с редкими мелкими пестринами. Когти белые, «усы» совсем незаметны. Отмечены залеты в долину р. Иркут, в Нукутский район и в окрестности городов Тулун и Нижнеудинск. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (4), МСОП (LC).

ООПТ: ПГ.

95. Обыкновенная пустельга — *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше вороны. Общий фон оперения рыжий. Хвост длинный, тело в темных пестринах, «усы» слабо заметны. У самцов пепельные голова и хвост (на котором имеется широкая черная полоса), каштановый верх и охристый низ тела. Самки охристо-бурые, более темные сверху с рыжеватым и полосатым хвостом. Молодые похожи на самку. Характерная способность — умение зависать на одном месте в воздухе трепеща крыльями. Населяет бóльшую часть тер-

ритории области, за исключением таежных и высокогорных районов. Наиболее обычный и многочисленный вид хищных птиц, на зимовке в отдельные годы не более 20–30 особей. Численность меняется по годам в зависимости от состояния кормовой базы. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Курообразные — Galliformes

96. Белая куропатка — *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758)

Размером с ворону. Зимой отличается чисто-белой окраской тела с черным хвостом и красной бровью. Весной самец белый с ржаво-коричневой головой и шеей, летом самец и самка пестрые, рыжевато-бурые, с белым брюхом и крыльями. Молодые — пестрые, рыжевато-бурые. Держатся главным образом на земле, полет быстрый с частыми взмахами крыльев. Населяет горные хребты и межгорные котловины, северные районы области, особенно обычна на территории Катангского и Мамско-Чуйского районов. Предпочитает заросшие мелкими кустарниками обширные заболоченные мари. В зимнее время в горах совершают кочевки, спускаясь в предгорные долины. В отдельные годы отмечены залеты на юг вплоть до Иркутска. Ос. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО.

97. Тундряная куропатка — *Lagopus mutus* (Montin, 1776)

Похожа на белую куропатку, но мельче. Зимой у самцов на боку головы черная полоска, летом в окраске преобладает серый, а не рыжий тон. Не пуглива и близко подпускает человека. Населяет тундры на горных хребтах Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Северо-Байкальского нагорья и Байкальском хребте. Редкий вид. Численность значительно ниже, чем у белой куропатки. Ос. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

98. Тетерев — *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758)

Размером с домашнюю курицу. Самец окрашен в интенсивно-черный с фиолетово-синим отливом цвет с белыми зеркальцами и с белым подхвостьем. Крайние перья хвоста лировидно изогнуты. Самки буровато-рыжие с черными пестринами со светлой полосой вдоль крыла и выемчатым хвостом. Полет шумный прямолинейный. Весной самцы токуют. Населяет лесные и лесостепные районы на большей части территории области. В лесных районах придерживает-

ся открытых участков — опушек, марей, гарей, вырубок, сельхозугодий, избегает сплошные участки леса. Зимой образует стаи в несколько десятков, а иногда свыше ста особей. Численность в последние годы начала восстанавливаться. Ос. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

99. Глухарь — *Tetrao urogallus* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная лесная птица, самцы намного крупнее самок. Окраска самца темно-серая, почти черная, на крыльях проступают коричневые тона, грудь и зоб с блестящим зеленоватым отливом. Самки буро-пестрые, имеют на груди рыжеватое без пестрин пятно, хвост вееровидный. Глухарь очень осторожный, взлетает с земли шумно, но полет легкий. Весной самцы ежегодно токуют на одних и тех же местах. Населяет таежные леса на большей части территории области, за исключением восточной части. Предпочитает старовозрастные нетронутые участки хвойного леса. Численность подвержена колебаниям, местами в таежных районах высокая. Обычный вид. Ос. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

100. Каменный глухарь — *Tetrao parvirostris* (Bonaparte, 1856)

Похож на обыкновенного глухаря, немного меньше размером, темнее, более длиннохвостый. Самец отличается от обыкновенного глухаря темным клювом и белыми пятнами на кроющих крыла и хвоста, нет белых пестрин на рулевых. У самок каменного глухаря не бывает рыжего пластрона на груди и шее, этот участок оперения более темный, чем остальной низ тела, из-за сгущения черных поперечных пестрин. Во время токования не глохнет. Населяет леса восточной части территории области, северную часть Байкальского хребта и север Катангского района. Залеты на юг Байкала. Обычный вид. Ос. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО.

101. Рябчик — *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758)

Небольшая, размером с крупного голубя, плотно сложенная лесная птица с широким веерообразным хвостом и небольшим хохолком. Окраска буро-серая, на спине тонкие темные поперечные полосы, низ с крупными полулунными пестринами. Плечи и бока рыжевато-коричневые. Самец отличается черным пятном на горле, имеющим тонкую белую оторочку. Держится на земле, вспугнутый, с шумом взлетает на дерево, где затаивается. Населяет леса и лесостепи на большей части территории области, за исключением степей, высокогорий и острова Ольхон на Байкале. Не отмечен в левобережье Анга-

ры — в Аларском и Нукутском районах. На большей части обычный вид, численность подвержена ежегодным колебаниям. Ос. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

102. Алтайский улар — *Tetraogallus altaicus* (Gebler, 1836)

Крупная птица. Голова, шея и зашеек буровато-серые, спина темно-серая или черноватая с мелким охристо-струйчатым рисунком. Грудь буровато-серая с округлыми белыми пятнами, окаймленными черным со стороны основания пера. Самка меньше самца, темные пестрины на горле у нее развиты сильнее. Возможно, обитает на горных хребтах Восточного Саяна вдоль границы с Бурятией. Имеются указания на встречи в Тофаларии. Ос.

103. Серая куропатка — *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

Размером с голубя, окраска сверху буроватая с темными пестринами, снизу серая без пестрин. Горло рыжеватое, на брюхе темное подковообразное пятно и ярко-рыжие боковые перья хвоста. Самка мельче и бледнее самца. В брачный период самцы издают громкие двухсложные крики, в остальное время молчат. Взлет шумный, полет прямой и быстрый. Держатся парами, во внегнездовое время стайками. Отмечена для западного побережья Байкала. Возможно, указана ошибочно. Зал.? ОО.

ООПТ: ЗП.

104. Бородатая куропатка — *Perdix dauuricae* (Pallas, 1811)

Небольшая плотного сложения птица серо-охристой окраски. На брюхе черное или темно-бурое пятно, зоб охристый, осенью и зимой по бокам подбородка пучки жестких перьев в виде бороды. Вес около 300 г. Полет прямой и быстрый. Часто держится стайками. Летает редко. Населяет преимущественно степные и лесостепные районы области. Предпочитает степные участки, залежи, заросшие кустарником распадки и сельскохозяйственные угодья. В зимнее время держится стаями до 50–60 особей. На север встречается до Черемховского, Балаганского и Качугского районов. Обычна на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Численность в последние годы начала восстанавливаться, но подвержена колебаниям. Ос. ОО.

ООПТ: ЗП.

105. Перепел — *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

Размером чуть больше скворца, окраска буровато-коричневая с продольными пестринами. Самцы в весеннем наряде имеют черное

горло. Держится в густой траве, можно обнаружить по брачным крикам самца, так называемому бою — звонкому «подь-ролоть» и тихому «хва-а-ва». Летает редко и на небольшое расстояние. Обитает в западной, центральной и южной частях области на восток до Байкало-Ленского заповедника и на север до Братского района. Залет в Витимский заповедник. Предпочитает пойменные луга и сельскохозяйственные угодья. Отдельные особи остаются на зимовку. Численность низкая, подвержена колебаниям. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, КД.

106. Немой перепел — *Coturnix japonica* (Temminck et Schlegel, 1849)

Внешне похож на перепела, отличается светло-коричневой окраской горла и передней части шеи и менее пестрым зашейком у самцов и охристым налетом на груди у самки. Населяет южную и центральную часть области на восток до долины р. Лена и до Куйтунского района на север. Обитает на пойменных лугах и на сельскохозяйственных угодьях. Численность низкая, по экспертным оценкам, не превышает тысячи особей. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ, МСОП (NT), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

107. Фазан — *Phasianus colchicus* (Linnaeus, 1758)

Размером крупнее вороны. Хвост клиновидный, очень длинный. Около глаза участок голой кожи красного цвета, перья по бокам головы удлиненны. Окраска яркая и пестрая — золотисто-оранжевая с крупными черными поперечными пестринами. Голова сине-зеленая, на шее белый ошейник. Самка серовато-бурая с темными пестринами, хвост короче, чем у самца. Имеется информация об обитании этого вида в прошлом в долине р. Ангара, в настоящее время вымер. Отмечено несколько встреч в окрестностях Иркутска и в Черемховском районе (возможно, сбежавшие из неволи). Вым. Зал.? ОО.

Отряд Журавлеобразные — Gruiformes

108. Пятнистая трехперстка — Turnix tanki (Blyth, 1843)

Мелкая короткохвостая птица, внешне похожа на перепела. Крылья короткие, закругленные. На лапах три пальца. Верх буроватый с округлыми темными пятнами на спине, низ охристый с ржавым налетом на груди и округлыми пятнами на боках. Ноги желтоватые,

клюв желтовато-серый или беловатый. Самка окрашена ярче самца. Населяет поросшие травой и кустарником равнины. Отмечен залет в Нижнеудинский район. Возможно спорадическое гнездование в долине р. Куда в Верхнем Приангарье, где имелись летние встречи. Гн.

Природоохранный статус: РКт, Пр. 2 Ирк.

109. Стерх — *Grus leucogeranus* (Pallas, 1773)

Крупный (крупнее серого) журавль чисто-белой окраски, только концы крыльев черные. Голая кожа на передней части головы, клюв и ноги ярко-красные. Редкий пролетный вид, отмечены единичные встречи на побережье Байкала и в долинах рек Ока, Тойсук (приток р. Китой) и Киренга. Известны летние встречи в долине Киренги. Пр.

Природоохранный статус: РЯ, РИ, РКт, Меморандум, СИТЕС (I), К.к. России (2), К.к. Ирк. (4), МСОП (CR).

ООПТ: ЗП, ТК.

110. Серый журавль — *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

Крупный журавль общей серой окраски с черными концами крыльев. Голова и шея черные, от глаз по бокам головы белая полоса. На затылке кожистое красное пятно (у взрослых). Ноги черные. У молодых голова оперена, красный цвет отсутствует. В полете вытягивает шею и ноги почти по прямой линии. Населяет обширные заболоченные участки на большей части территории области, за исключением степей и высокогорий. Наиболее обычен в Предсаянье. На территории области ориентировочно обитает несколько тысяч особей. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

111. Даурский журавль — *Grus vipio* (Pallas, 1811)

Размером крупнее серого журавля. Окраска светло-серая, концы крыльев черные. Голова и шея белые, спереди по нижней части шеи проходит сизая полоса. На лбу и щеках участки красной неоперенной кожи. Ноги красные. Молодые птицы рыжие, низ с охристыми пестринами, голова полностью оперена. Отмечены залеты в устье Голоустной и в окрестности пос. Усть-Ордынский. Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, СИТЕС (I), К.к. России (1), К.к. Ирк. (4), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

112. Черный журавль — *Grus monacha* (Temminck, 1836)

Значительно меньше серого журавля. Общая окраска черная, голова и шея белые, темя красное. Клюв зеленоватый, ноги черные.

Глаза карминно-красные. Полет как у серого журавля. Менее осторожен, чем серый журавль. Молодые черные журавли издали кажутся серыми. Предположительно населяет обширные заболоченные мари в северных таежных районах Иркутской области — Катангском и Бодайбинском. На пролете отмечен на побережье Байкала, на острове Ольхон, в долине Ангары, в Тажеранской степи и в Баяндаевском районе. Гн.? Пр.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, СИТЕС (I), К.к. России (5), К.к. Ирк. (3), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

113. Красавка — *Antropoides virgo* (Linnaeus, 1758)

Мелкий (гораздо мельче серого) журавль. Окраска сизо-серая, голова, шея и концы крыльев черные. По бокам головы пучки длинных белых перьев — косицы. С шеи на грудь свисают длинные черные перья. Клюв желтоватый, ноги черные. Молодые птицы рыжевато-серой окраски. Населяет степные и лесостепные районы юга области. Отмечены залеты в Байкало-Ленский и Витимский заповедники и на север до Киренского района. На территории области стал гнездиться в конце прошлого века, ранее была отмечена тенденция к увеличению численности, в настоящее время численность стабилизировалась. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (2), К.к. Ирк. (5).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

114. Водяной пастушок — *Rallus aquaticus* (Linnaeus, 1758)

Размером с коростеля. Половой диморфизм не выражен. Спинная сторона тела оливково-бурая с темно-бурыми широкими полосами. Бока головы, шея, зоб и передняя часть брюха серовато-стального цвета. По бокам и на средней части брюха поперечные широкие черные и узкие светлые полосы, подхвостье белое. Клюв длинный, слегка изогнутый, надклювье и кончик его черные, а подклювье красное. Ноги красновато-коричневые. Встречается в южной и центральной части области, распространение спорадическое. Предпочитает заросшие рогозом закочкаренные с осоками берега водоемов. Редкий гнездящийся вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП.

115. Погоныш — *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)

Размером немного крупнее скворца. Половой диморфизм не выражен. Спинная часть оливковая с крупными темными и мелкими

белыми пестринами. Передняя часть тела серая с белым крапом. На боках выражены белые полосы. Клюв желтый с оранжевым пятном у основания. Ноги оливково-зеленые. Обычно держится в зарослях густой растительности. Встречается спорадически в южной и центральной части области. Предпочитает заросшие рогозом и закочкаренные берега водоемов. Редкий гнездящийся вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ.

116. Малый погоныш — *Porzana parva* (Scopoli, 1769)

Размером со скворца. Длина тела 18–20 см, вес 40–75 г. Спинная часть оливковая с крупными темными и мелкими белыми пестринами. Передняя часть тела серая. У самки передняя часть тела охристо-серого цвета, у самца — сизая. Горло, передняя часть шеи и часть «лица» у самки беловатые. В отличие от погоныша имеет полосатое подхвостье, и у него отсутствуют полосы по бокам. Клюв зеленый, основание клюва красное, ноги зеленые. Ведет скрытый образ жизни. Отмечен залет на Малое Море. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

117. Погоныш-крошка — *Porzana pusilla* (Pallas, 1776)

Мелкая птица размером со скворца. Верхняя часть тела оливково-бурая с черными и белыми пестринами. Передняя часть тела аспидно-серая. Бока тела темно-серые или темно-бурые с белым поперечно-полосатым рисунком. Клюв однотонный зеленоватый, ноги телесного цвета. Ведет скрытый ночной образ жизни. Встречается спорадически на заболоченных участках в южной и центральной части Иркутской области. Залет в Витимский заповедник. Редкий гнездящийся вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ, ЭД.

118. Большой погоныш — *Porzana paykullii* (Ljungh, 1813)

Размером крупнее скворца. Спинная сторона однотонная оливково-бурая, без пестрин, бока головы, шея и грудь яркие, каштаново-рыжие. Горло и бровь над глазом светлые. На боках бурые и белые поперечные полосы. Ноги красные, клюв синеватый, радужина глаз красная. Населяет кочкарниковые, заросшие кустарником луга и болота. По поведению напоминает коростеля. Отмечено спорадическое гнездование отдельных пар в долине р. Иркут. Гн.

Природоохранный статус: РКт, Пр. 2 Ирк., МСОП (NT).

ООПТ: ПГ.

119. Коростель — *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее дрозда. Половой диморфизм не выражен. Голова сверху темно-бурая с мелкими охристыми пестринами. Спина охристо-бурая, грудь и зоб серые. Бока тела буровато-рыжие с белыми поперечными полосами. Ноги желтоватые. В полете хорошо видны свисающие ноги. Населяет пойменные биотопы на восток до Байкала и верховий р. Лена (долина р. Тутура). Предпочитает высокотравные влажные луга по берегам рек. Численность обычно низкая, но в отдельные благоприятные периоды коростель на локальных участках может быть многочисленным видом. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. Ирк. (3), МСОП (LC).

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, ПГ.

120. Камышница — *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

Размером с чирка, на воде напоминает небольшую утку. Оперение черное, подхвостье белое. Голова с ярко-красным коротким клювом и продольным красным гребешком. Молодые — светло-бурые без гребешка. Хорошо плавает, поднимая вертикально вверх хвост. Ловко бегает по мелководью, листьям растений, корягам. Населяет водоемы с обильной околоводной растительностью. Зарегистрированы отдельные встречи на территории области в долине Иркута, на Сушинском Калтусе в окрестностях Ангарска и Куйтунском районе. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт.

ООПТ: ПГ.

121. Лысуха — *Fulica atra* (Linnaeus, 1758)

Величиной с утку. Окраска однотонная темно-грифельная, почти черная, на лбу ярко-белая кожистая бляшка, переходящая в короткий конический белый клюв. Пальцы ног длинные с зеленоватыми перепонками. Молодые — буровато-серые без бляшки. Хорошо плавает, посадка на воде глубокая, часто ныряет. Встречается спорадически на большей части территории области, за исключением севера и северо-востока, предпочитая наиболее продуктивные пойменные озера, пруды и протоки рек. Местами обычный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ.

122. Дрофа — *Otis tarda* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная птица. Масса самцов 7–11 кг, самок 4–8 кг. Большая округлая голова, толстая и довольно длинная шея. Ноги относительно длинные, сильные. Окраска пестрая, в ней сочетаются рыжий,

черный, серый и белый цвета. Весной у самцов восточносибирского подвида пучки длинных нитевидных перьев расположены по всему горлу, образуя не только «усы», но и «бороду». Дрофы много ходят, при опасности быстро бегают. В жару они охотнее затаиваются, причем разглядеть их, благодаря покровительственной окраске, бывает очень трудно. В прошлом гнездящийся в степных и лесостепных районах, в настоящее время залетный вид. Залеты отмечены на остров Ольхон, в Тажеранскую степь, Приольхонье, долины рек Ангара, Куда, Ока и Киренга. Не исключена возможность спорадического гнездования отдельных пар. Вым. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, СИТЕС (II), К.к. России (1), К.к. Ирк. (0), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

Отряд Ржанкообразные — Charadriformes

123. Тулес — *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

Кулик размером крупнее дрозда, плотного сложения. В брачном оперении верх серый с густыми белыми пестринами, низ черный. Надхвостье белое, хвост светлее спины, подмышечные перья черные. Самки менее контрастны. Осенью черная окраска может смениться на белую с серыми пестринами. У молодых птиц по низу шеи и груди серые пестрины. Держится на отмелях, мелководье и по урезу воды. Во время пролета встречается на берегах крупных водоемов на большей части территории области, чаще на побережье Байкала и Братского водохранилища. Обычный пролетный вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РЯ, РК, РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

124. Бурокрылая ржанка — *Pluvialis fulva* (J.F. Gmelin, 1789)

Кулик размером с дрозда, плотного телосложения. Немного темнее и мельче золотистой ржанки. Подмышечные перья и испод крыла дымчато-серые. Белая полоса, отделяющая черный низ от пестрого верха, на боках прикрыта крылом и не видна. Весенний пролет проходит в сжатые сроки, и птицы летят большими стаями по несколько сотен особей. Осенний пролет растянут во времени с августа по сентябрь, и птицы преимущественно держатся небольшими стайками. На пролете встречается по берегам водоемов и на влажных лугах на большей части области. Обычный, на отдельных локальных участках многочисленный вид. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

125. Золотистая ржанка — *Pluvialis athricaria* (Linnaeus, 1758)

Кулик размером с дрозда, плотного телосложения. Верхняя часть тела желтовато-серая (густая сетка черных пестрин по желтоватому фону); в брачном наряде низ тела черный, отделенный от верха белой полосой, в осеннем наряде — желтовато-серый с пестринами. Подмышечные перья белые. Молодые похожи на взрослых в брачном наряде. Отмечены единичные залеты на южный Байкал и в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РИ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

126. Галстучник — *Charadrius hiaticula* (Linnaeus, 1758)

Размером со скворца. Плотно сбитая коренастая короткоклювая птица с характерным обликом зуйка. Верхняя часть тела и шапочка на голове буроватые, низ, лоб, горло и полосы на крыле белые, широкий галстук на шее, маска на голове и кончик клюва черные. Ноги и клюв оранжевые. Обычно держится на песчаных и грязевых отмелях. Осенью черный цвет тускнеет и становится буроватым, клюв и ноги бурые. Отмечен на пролете на побережье Братского водохранилища и на озере Байкал. Редкий вид, встречаются в основном единичные особи и небольшие стайки. Пр.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

127. Малый зуёк — *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786)

Немного крупнее воробья. Плотно сбитая коренастая короткоклювая птица. Верхняя часть тела и шапочка на голове буроватая, нижняя часть, горло и шея белые. На груди черный узкий галстук, такого же цвета маска на голове. Клюв черный, ноги и кольцо вокруг глаз желтые. В полете заметна узкая белая полоса вдоль крыла. У молодых птиц галстук разорван посередине. Осенью галстук и маска на голове бурые. Населяет преимущественно галечниковые берега водоемов и косы на большей части территории области. В характерных местообитаниях обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, ЛО, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

128. Монгольский зуёк — *Charadrius mongolus* (Pallas, 1776)

Зуек размером крупнее галстучника, с коротким клювом. Спина серая или буровато-серая, зоб, грудь и бока ржаво-рыжие, горло и брюхо белые, иногда горло ограничено черной полосой. Клюв и ноги черные. У самки лоб всегда белый, черного цвета на темени

нет. Отмечены единичные залеты в Витимский заповедник и на Малое Море. Зал.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

129. Морской зуёк — *Charadrius alexandrinus* (Linnaeus, 1758)

Небольшая птица размером с воробья. У самца окраска верхней стороны тела буровато-серая с рыжеватым зашейком, нижняя сторона тела, лоб и полоса над глазами белые, от клюва через глаза идет черная полоса, темя тоже черное. По бокам груди имеются два темных пятна, ноги и клюв — черного цвета. Расцветка самки почти такая же, только на темени отсутствует черный цвет. Отмечены залеты на Малое Море и на западное побережье Байкала. Зал.

Природоохранный статус: К.к. России (3), РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

130. Хрустан — *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758)

Размером крупнее скворца, напоминает ржанок. Верх тела и голова сизые. В брачном наряде горло, подхвостье и полосы на груди и над глазом белые, низ тела рыжий, брюхо черное. Вне сезона размножения окраска не такая яркая — сверху буроватая, снизу охристая. Молодые похожи на взрослых вне брачного периода. Населяет горные тундры на хребтах вокруг Байкала (Байкальский хребет и Хамар-Дабан) и в северо-восточной части Байкальского региона, а также, возможно, Восточного Саяна. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РЯ, К.к. России (4).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

131. Чибис — *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

Птица размером с голубя контрастной черно-белой окраски. На земле у чибиса хорошо заметен высокий тонкий хохол, а в полете характерны широкие закругленные крылья и каштановое подхвостье. Хвост белый с черной полосой на конце. У самки в отличие от самца белые отметины на горле и подбородке. Во второй половине прошлого века населял открытые увлажненные участки на большей части территории области и был многочисленным видом. В последние годы произошло резкое сокращение численности. На значительной части территории области чибис практически исчез или стал редким, сохранился только на локальных участках на побережье Байкала. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

132. Камнешарка — *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)

Низкий в ногах короткоклювый кулик размером с дрозда. В сезон размножения окраска пестрая: спина и крылья рыжие с черным, голова, шея и грудь со сложным черно-белым узором; в полете видны белые полосы на крыльях и спине и белый хвост с черной полосой по краю. Вне сезона размножения рыжий цвет почти исчезает, голова становится серой с черным рисунком. Молодые похожи на взрослых в зимнем оперении. Встречается на берегах различных водоемов. Редкий пролетный вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

133. Ходулочник — *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

Небольшой кулик. Крылья, спина, а иногда затылок и темя ходулочника черные с синевато-зеленым отливом. Остальное оперение белое. Крылья длинные, острые и узкие. Хвост недлинный, прямо срезанный. Клюв прямой, длинный, тонкий и острый. Ноги красного цвета, очень длинные, трехпалые, между основаниями среднего и наружного пальцев имеется небольшая, но хорошо заметная перепонка. Самка окрашена несколько тусклее, нежели самец. Длина крыла 20–25 см, причем самки немного мельче самцов. Залеты на южный Байкал и в окрестности Тулуна. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. Ирк. (4).

134. Шилоклювка — *Recurvirostra avosetta* (Linnaeus, 1758)

Крупный кулик в основном белого цвета, верх головы, шеи и полосы на крыльях черные. Ноги длинные, синеватые; черный клюв длинный, тонкий, изогнутый вверх. Часто заходит в воду. Хорошо плавает, почти не погружаясь. Отмечен единичный случай гнездования на очистных сооружениях в Усольском районе. Известны залеты на южный Байкал и в Ангарский район. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (3), К.к. Ирк. (4).

135. Кулик-сорока — *Haematopus ostralegus* (Linnaeus, 1758)

Крупный кулик с контрастным черно-белым оперением. Большой оранжевый клюв, уплощенный с боков, довольно изменчив по форме и длине. Ноги невысокие, розовые, трехпалые. Осенью на горле белый полуошейник, конец клюва темноватый. Молодые отличаются от взрослых бурым верхом вместо черного, светлыми каемками на перьях, отсутствием белого горлового пятна, темным с грязно-оранжевым основанием клювом, который короче, чем у взрослых, и более заостренный, бурыми ногами, бурыми глазами

(у взрослых они красные). Отмечены залеты на южный Байкал в окрестности Култука, долину р. Нижняя Тунгуска и в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. России (2).

ООПТ: ВГЗ.

136. Черныш — *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758)

Кулик размером с дрозда, стройный, с длинными ногами и клювом. В окраске сочетаются белые, серые и черные цвета. Отличается темной окраской подкрыльев и контрастным верхом: белая поясница и надхвостье выделяются на фоне темной спины и крыльев. Белая бровь не заходит за глаз. Молодые птицы светлее взрослых, с рыжими пестринами. Осенью взрослые более тусклые, верх более однотонный, без пестрин. Взлетает с резким криком «тлит-тлит-тлит», «ти-ли-ли», при тревоге — «вик-вик», «пик-пик-пик». Часто садится на деревья. Обитает в лесной и лесостепной зонах на большей части территории области. Гнездится по берегам лесных водоемов. В отличие от других куликов может устраивать гнезда на деревьях и кустах. Обычный гнездящийся и пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

137. Фифи — *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758)

Размером и обликом похож на черныша, но более длинноногий и стройный; отличается светлой и пестрой окраской спины, благодаря чему белое надхвостье не так четко выделяется. Подкрылье гораздо светлее. Белая бровь заходит за глаз. У молодых есть охристый налет на верхней стороне тела и груди. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области. Местами обычный на гнездовье и чрезвычайно многочисленный пролетный вид. Гнездится по берегам водоемов и на заболоченных участках. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

138. Большой улит — *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1763)

Крупный длинноногий кулик размером почти что с голубя, светлой окраски. В полете заметно, что белая окраска надхвостья далеко заходит на спину. Мощный клюв с легким изгибом кверху, ноги зеленовато-серые. Молодые светлее взрослых. Населяет лесную зону северной части области. Гнездится на широких заросших ерником и редкими деревьями

заболоченных марях. Во время пролета встречается на берегах водоемов на всей территории области. Малочисленный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КР, ЛО, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

139. Травник — *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)

Размером чуть больше дрозда. В полете отличается широкими белыми полосами на крыльях в сочетании с белым клином, заходящим на спину. Общий фон окраски темнее, чем у поручейника и большого улита. Лапы и клюв ярко-красные. В зимней окраске верх тела серый. Молодые более бурые с охристыми пестринами. Отмечено спорадическое гнездование в долине Иркута и залеты в Витимский и Байкало-Ленский заповедники, на Байкал и в долину Куды. Населяет заболоченные луга по берегам водоемов. Редкий вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

140. Щеголь — *Tringa erythropus* (Pallas, 1763)

Размером немного крупнее дрозда, с длинными клювом, ногами и шеей. В брачном наряде окраска матово-черная с густыми белыми пестринами. Клюв и ноги окрашены в сочетания красного и черного цветов. В осеннем наряде сверху серый, снизу беловатый с серым налетом на шее и груди. Ноги красные. На спине белый клин заходит на спину. Молодые похожи на взрослых в зимнем наряде, но темнее и с пестринами по нижней части туловища. Встречается на заболоченных берегах водоемов на большей части территории области. Обычный пролетный вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

141. Поручейник — *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)

Размером с дрозда, с длинными ногами и длинным тонким клювом. Общая окраска светлая. На спине четко выраженный белый клин. В полете ноги выступают далеко за край хвоста. В зимнем наряде в окраске верха преобладает светло-серый цвет с чешуйчатым рисунком. Молодые — светло-бурые с чешуйчатым рисунком. Населяет бóльшую часть территории области, за исключением горных районов и севера области. Гнездится на заболоченных лугах по берегам различных водоемов. Обычный гнездящийся и пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

142. Сибирский пепельный улит — *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816)

Довольно крупный длинноногий улит. Верх пепельно-серый, низ белый с волнистым бурым поперечным рисунком на груди и боках (в зимнем наряде его нет). Клюв черный, у основания с желтым. Голос — двусложное «ту-пит» (похоже на перевозчика, но громче и глубже). Может плавать. Во время пролета встречается по берегам водоемов на большей части территории области. Гнездится в Витимском заповеднике. Гнездование установлено в широких открытых речных долинах в горах на северо-востоке области. Редкий вид. Пр. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ, МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

143. Перевозчик — *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)

Коротконогий кулик размером со скворца. Пестрины по бокам шеи и верха груди образуют буровато-серые погоны. Отличается короткими ногами, темной спиной и надхвостьем, закругленным хвостом с белыми краями и белой полосой на крыле. У молодых птиц верх с охристым чешуйчатым рисунком, пестрин по бокам шеи нет. Кормится на берегах водоемов, на корягах или камнях у уреза воды. Населяет побережья различных водоемов на большей части территории области. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

144. Мородунка — *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775)

Коротконогий кулик размером с дрозда. Хорошо отличается серой окраской спины с контрастными черными полосками в области лопаток. Клюв слегка изогнут кверху, черный с желтым основанием. В полете заметны белая полоса по заднему краю крыла, светло-серые надхвостье и хвост, продольные темные полоски на спине, у молодых — темнее, с рыжеватым оттенком. На пролете встречается на открытых берегах водоемов на большей части территории области. Редкий вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

145. Плосконосый плавунчик — *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)

Размером крупнее воробья. Весенняя окраска самки кирпично-красная, с белой маской, однотонной темно-бурой шапочкой, пе-

рья спины темно-бурые с охристыми каемками. Клюв плоский и широкий, желтый, с темной вершинкой. Самцы меньше самок, окрашены в общем так же, но имеют желтоватые и белые пестрины на боках и брюшке, более узкую и нечеткую белую маску, на темени охристые пестрины. Сверху вдоль крыла широкая белая полоса. У молодых сверху перья бурые, с рыжими каемками, на шее и груди сильный буровато-охристый налет, клюв темный. Отмечены единичные залеты в Витимский заповедник и на южный Байкал. Зал.

Природоохранный статус: РА, РИ, РЯ.

ООПТ: ВГЗ.

146. Круглоносый плавунчик — *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее воробья с длинным тонким клювом. Хорошо плавает. Окраска весной сероватая, на спине с рыжеватыми полосами, на боках шеи рыжие пятна, горло и брюшко белые. Самки окрашены контрастней и ярче самцов. В зимнем наряде верх спины светло-серый, низ — белый, через глаз проходит черная полоса. Молодые сверху темно-бурые с рыжеватыми пестринами, шея и бока груди буроватые. Во время пролета населяет берега различных водоемов на большей части территории области. Редкий вид, встречаются в основном единичные птицы и небольшие стайки. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

147. Турухтан — *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758)

Размером с крупного дрозда. Самцы в полтора раза больше и вдвое тяжелее самки. В брачном наряде у самца пышный воротник из удлиненных перьев различного цвета (белого, черного, рыжего, пестрого), вокруг глаз желтые или оранжевые кожистые бородавки. Начиная с июля самцы окрашены как самки — серо-бурая спина с пестринами разной яркости, беловатое брюхо. При полете видны белые пятна по бокам темного хвоста. У старых птиц ноги оранжевые или красноватые. Клюв от темно-серого до желтого или оранжевого, у самок темный, иногда с розовым кончиком. Самцы весной устраивают групповое токование — распушают воротники, наскакивают друг на друга, приседают и кланяются. Отмечено спорадическое гнездование на побережье Малого Моря и в долине Иркута. На остальной территории области очень редкий гнездящийся и обычный пролетный вид. Предпочитает заболоченные луга на берегах водоемов. Обычен на пролете на побережье Братского моря. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

148. Кулик-воробей — *Calidris minuta* (Leisler, 1812)

Мелкий песочник размером с воробья, имеет укороченные клюв и ноги. Весной верх рыжий с пестринами, низ светлый, пестрины на груди. Ноги темные. В зимнем пере светлый с V-образным рисунком на спине. Во время пролета населяет берега различных водоемов на большей части территории области. Обычный, местами многочисленный вид, летят стаями от нескольких особей до нескольких сотен птиц, часто совместно с другими видами песочников. Пр.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

149. Песочник-красношейка — *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776)

Мелкий, с воробья, куличок с недлинными ногами и клювом. Верх рябой, рыжеватый, низ белый. Весной горло и зоб ярко-рыжие. Зимой в природе почти неотличим от кулика-воробья. У молодых под ржавым горлом, поперек зоба, бывает ряд бурых пестрин. Во время пролета встречается по берегам различных водоемов на большей части территории области. Обычный вид, летят стайками до нескольких десятков особей, часто совместно с предыдущим видом. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

150. Длиннопалый песочник — *Calidris subminuta* (Middendorff, 1851)

Куличок размером с воробья с довольно короткими ногами и клювом. Отличается от остальных песочников очень длинными пальцами. Спина охристо-бурая с черными центрами перьев, низ белый. Шея и зоб обычно сероватые или слегка охристые с более темной продольной исчерченностью. Ноги желтоватые или буроватые. Гнездится на побережье Малого Моря, в Куйтунском районе и, возможно, на Ангаро-Ленском водоразделе (долина р. Тыпта, Жигаловский район). На остальной территории области редкий пролетный вид. На гнездовье отмечены отдельные пары, во время пролета встречается небольшими стайками. Гн.

Природоохранный статус: РА, РЯ, РК, РКт, РИ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП, ПГ.

151. Белохвостый песочник — *Calidris temminsrii* (Ltisler, 1812)

Мелкий песочник размером с воробья. В брачном наряде на спине серо-буроватые тона, белое брюшко и грудь с буроватыми пестринами. Ноги желтовато-серые. По краям хвоста и надхвостья широкие

белые полосы. Во время пролета населяет берега различных водоемов на большей части территории области. Редкий вид, встречаются, как правило, пары или небольшие стайки, часто летит совместно с другими видами песочников. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

152. Бонапартов песочник — *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819)

Размером со скворца. Спинная сторона черно-бурая с рыжеватыми и охристо-беловатыми пестринами, брюшная сторона белая, передняя часть тела, зоб, грудь и бока с темными пестринами. Зимой спина дымчато-серая с темно-бурыми пестринами, брюшко белое, зоб с охристым налетом и пестринами. Отмечен единичный залет на Малое Море. Зал.

ООПТ: ЗП.

153. Краснозобик — *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)

Плотно сложенный кулик размером со скворца с относительно длинным, заметно загнутым вниз клювом. В брачном наряде отличается каштаново-красной окраской головы, шеи и низа туловища. Ноги длинные, черные, белое надхвостье. В осенне-зимнем оперении окраска светлая, буровато-серая сверху и беловатая снизу. Во время пролета встречается по берегам водоемов на большей части территории области. Редкий вид, летят в основном небольшими стайками, часто среди других видов песочников. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

154. Чернозобик — *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

Размером со скворца. Весной на брюхе большое черное пятно. Клюв удлиненный, немного загнут вниз. Верх тела рыжеватый. Через хвост и надхвостье по белому полю проходит черная полоса. Молодые — рыжевато-серые с черными пестринами на груди и брюхе. В зимнем наряде серый сверху и белый снизу. На пролете встречается по берегам различных водоемов на большей части территории области. Обычный вид, летят стайками до нескольких десятков особей, часто с другими видами песочников. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

155. Острохвостый песочник — *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821)

Похож на дутыша, но мельче, клюв немного короче. В окраске есть золотистые тона, особенно на голове. На боках груди — харак-

терные V-образные пестрины. На пролете отмечен на побережье Байкала и Братского водохранилища. Редкий вид, встречаются как одиночные особи, так и небольшие стайки. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП, ПГ.

156. Дутыш — *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

Довольно крупный и стройный песочник, меньше турухтана и крупнее фифи. Клюв умеренной длины, чуть изогнут книзу, бурый, с оливковым или зеленоватым основанием. Ноги высокие охристо-серые или оливковые. Наиболее примечательное в окраске самца — равномерная белая крапчатость по буровато-серому фону на груди. Перья верха бурые с охристыми каемками, горло и брюхо белые. Самка отличается от самца мелкими размерами, грудь и зоб охристые или буроватые с темными пестринами. В полете сверху темные со слабо заметной крыловой полосой, надхвостье двухцветное — темное посередине и белое по бокам. Низ крыла белый с темными первостепенными маховыми и их большими кроющими. Молодые похожи на самку, но более рыжие сверху. Отмечен во время пролета на побережье Байкала. Редкий вид, известны отдельные встречи. Пр.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

157. Исландский песочник — *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)

Крупный, размером с дрозда, песочник. В брачном оперении верх тела пестрый, низ кирпично-красный или рыжий. Ноги зеленоватые, клюв короткий, прямой. Надхвостье белое с густыми черными пестринами. Молодые птицы сверху серые, с чешуйчатым рисунком. Осенью окраска серая. Отмечен во время пролета на побережье Байкала. Редкий вид, известны отдельные встречи. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2).

ООПТ: ЗП.

158. Перепончатопалый песочник — *Calidris mauri* (Cabanis, 1856)

Размером и окраской напоминает кулика-воробья, но клюв заметно длиннее, на темени иногда заметна рыжая шапочка, грудь в продольных пестринах. Передние пальцы соединены хорошо заметной перепонкой. Отмечен единичный залет в XIX в. на южный Байкал в окрестностях пос. Култук. Зал.

Природоохранный статус: РА.

159. Песчанка — *Calidris alba* (Pallas, 1764)

Размером немного меньше скворца. В брачный сезон верх тела, голова, шея и передняя часть груди рыжеватые или ярко-рыжие с черными пестринами. В осенне-зимний период окраска очень светлая. Светло-серая сверху и белая снизу с темными пятнами на сгибе крыла. Клюв и ноги черные, отсутствует задний палец. Молодые птицы пестрые сверху и белые снизу. Отмечен во время пролета на побережье Байкала и Братского водохранилища. Редкий вид, известны отдельные встречи. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

160. Грязовик — *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763)

Мелкий кулик размером с воробья. В брачном наряде сверху черновато-бурый с пестринами, шея и грудь светлые с бурым крапом. На темени бурая шапочка с двумя продольными полосками. Светлая полоса есть над глазом (двойная бровь). Клюв длинный черный с оливковым отливом, слегка изогнут книзу. Зимой серый сверху, белый снизу. Во время пролета встречается на берегах различных водоемов на большей части территории области. Редкий вид, встречаются, как правило, одиночные птицы и небольшие стайки. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

161. Гаршнеп — *Lymnocryptes minimus* (Brunnich, 1764)

Немного мельче скворца, окраской напоминает бекаса, более коротконогий и короткоклювый. Сверху коричневато-черный, с зеленоватым или фиолетовым отливом на черных участках. На спине продольные желтые пестрины, сливающиеся в полосы. Молодые окрашены как взрослые. Держится скрытно. В полете заметен клиновидный хвост. Встречается на заболоченных берегах водоемов. Редкий пролетный вид, отмечен на Байкале, в Витимском заповеднике и в долинах рек Ангара и Иркут, а также в Присаянье. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

162. Бекас — *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

Длинноклювый кулик размером с дрозда. Окрашен пестро, брюхо белое. На голове светлые полоски и пробор на темени. Нижняя поверхность крыла полосатая с серыми и белыми полосами. При токовании взлетает вверх и бросается вниз с раскрытыми крыльями и хвостом и издает блеющий звук. Встречается на всей территории Иркутской области. Населяет заболоченные луга, травянистые и ку-

старниковые закочкаренные болота. Многочисленный вид во время пролета и обычный на гнездовье. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

163. Лесной дупель — *Gallinago megala* (Swinhoe, 1861)

Очень похож на обыкновенного и еще более — на азиатского бекаса. Отличается от обыкновенного бекаса более широкой светлой бровью, имеет более короткий клюв, более крупную и округлую голову, белых полей на подкрыльях нет, они сплошь покрыты темными пестринами. Хвост у сидящей птицы, в отличие от хвоста азиатского бекаса, далеко выступает за концы крыльев. У летящей птицы кончики пальцев слегка выдаются за обрез хвоста. Молодые осенью очень похожи на взрослых, отличаются охристыми каемками на кроющих крыла. Населяет южную и центральную части области, на север — до Катангского района. Предпочитает для обитания лесные поляны, опушки, мари, старые зарастающие гари и разреженные смешанные березово-сосновые леса с подлеском из ивы. Обычный гнездящийся и пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

164. Азиатский бекас — *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1830)

Очень похож на бекаса внешностью и размерами. С расстояния почти неотличимы, при навыке и благоприятных условиях наблюдений азиатского бекаса можно узнать по более крупной и круглой голове, более короткому клюву, менее рыжей общей окраске, более короткому хвосту (у сидящей птицы слабо выдается за концы крыльев). Светлая бровь у клюва всегда шире черной уздечки, на нижних кроющих крыла сплошное чередование темных и белых пестрин, белых полей нет. Гнездится в горной тайге и тундре, на пролете встречается повсеместно. Населяет заболоченные луга, берега водоемов. Редкий гнездящийся и обычный, а местами многочисленный пролетный вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

165. Горный дупель — *Gallinago solitaria* (Hodgson, 1831)

Самый крупный представитель рода, кроме того, отличается от других бекасов белыми, а не охристыми каемками на перьях спины, образующими продольные полосы, грудь буро-коричневая, с белыми

пестринами. Светлый (белый) «пробор» по верху головы отчетливо виден только на темени, светлые участки на «лице» не рыжие и не охристые, а белесые. Подкрылья пестрые, как у дупеля, азиатского бекаса или лесного дупеля, но с основным участием коричневых тонов. В полете выглядит крупным и напоминает больше вальдшнепа, полет медленный и тяжелый. Населяет широкие заболоченные долины рек и ручьев в горных тундрах на Восточных Саянах, Байкальском хребте и на Северо-Байкальском нагорье и прилегающих хребтах. Отмечен залет на Братское водохранилище. Относительно малочисленный вид. На зимовке отмечен на незамерзающих реках на южном Байкале. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

166. Дупель — *Gallinago media* (Latham, 1787)

Заметно крупнее бекаса. Отличается темным в пестринах низом и ярко-белыми пятнами по бокам хвоста. Токует в темное время суток на земле. Отмечено спорадическое гнездование в долинах рек Иркут и Куда и, возможно, в Присаянье. Населяет заболоченные луга в поймах рек. Редкий вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РЯ, Пр. 2 Ирк., МСОП (NT).

167. Вальдшнеп — *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)

Крупный большеголовый лесной кулик с длинным клювом, чуть больше голубя. Отличается равномерной пестрой окраской верха, широкими поперечными полосами на голове, белой полоской на хвосте и поперечно-полосатой окраской низа тела. Весной совершает токовые полеты, известные под названием «тяга», над полянами, лесными дорогами и прогалинами в лесу. Населяет лесную зону на большей части территории области, вплоть до высокогорий. Гнездится на лесных полянах, старых гарях, опушках. Обычный, местами многочисленный, но очень скрытный в летний и осенний периоды вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

168. Кроншнеп-малютка — *Numenius minutus* (Gould, 1841)

Размером немного меньше голубя. Клюв относительно короткий (чуть больше половины длины головы), слабо изогнутый. Темя черно-бурое с охристой продольной полосой посередине. Перья спинной стороны тела темно-бурые с охристыми краевыми пятнами. Поясница и надхвостье одного тона со спиной, без белого.

Брюшная сторона беловатая с сильным охристым налетом и бурыми пестринами, продольными на зобу и груди, поперечными на боках. Встречается на берегах водоемов и влажных лугах на побережье Байкала, Братском водохранилище, в верховьях Лены и в Присаянье. Редкий вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

169. Тонкоклювый кроншнеп — *Numenius tenuirostris* (Vieillot, 1817)

Похож на большого кроншнепа, но значительно меньше. На нижней части груди хорошо заметны крупные сердцевидные пестрины. В начале XX в. известны залеты в окрестности Иркутска и в долину Витима. Зал.

Природоохранный статус: СИТЕС (I), К.к. России (1), МСОП (CR).

170. Большой кроншнеп — *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из наших куликов, больше вороны. Общий тон окраски буровато-серый с рыжеватым налетом. Грудь и передняя часть брюха с темно-бурыми продольными пестринами. Надхвостье, поясница и задняя часть спины чисто-белые, что отличает его от обитающего к востоку от Байкала дальневосточного кроншнепа, сходного с ним размерами и пропорциями тела. Клюв очень длинный, дугообразно загнут книзу. Населяет луговые сообщества в лесной и лесостепной зонах. Более обычен в лесостепи Верхнего Приангарья и на заболоченных участках в Присаянье. На большей части территории области редкий вид. Отмечена тенденция к росту численности. На пролете встречается по берегам водоемов. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ, МСОП (NT), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЧС, ЭД.

171. Дальневосточный кроншнеп — *Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1758)

Очень похож на большого кроншнепа, но надхвостье темное, подмышечные перья с резкими темными полосами, клюв длиннее. Крыло снизу и брюхо серые. Отмечены единичные залеты на Байкал (на Малое Море), в окрестности поселков Бугульдейка и Култук, в дельту Голоустной и на Братское водохранилище. Возможно, гнездится в Катангском районе. Гн.? Зал.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2), К.к. Ирк. (4), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

172. Средний кроншнеп — *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)

Похож на большого кроншнепа, но заметно меньше и с более коротким клювом. Окраска похожа на окраску большого кроншнепа, но без рыжеватых тонов. На темени светлая полоса, окаймленная с боков темными полосками, хорошо заметна светлая бровь. Молодые похожи на взрослых, но более светлые сверху с охристым налетом на груди. Встречается на берегах водоемов на побережье Байкала, в пойме Иркута и на Братском водохранилище. Редкий пролетный вид. Пр. ОО.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

173. Большой веретенник — *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)

Крупный, размером с голубя, пестро окрашенный кулик. Характерны высокая посадка на ногах и длинный клюв, в полете ноги далеко выступают за конец хвоста. Хорошо отличается широкими продольными белыми полосами на крыльях и контрастным белым хвостом с широкой черной полосой по краю. Весной голова, шея и грудь ярко-рыжие, самки немного тусклее. Осенью рыжий цвет меняется на серый. Молодые птицы рыжевато-охристые. Населяет луговые и болотные сообщества в южной и средней части области и в долине Нижней Тунгуски. Редкий гнездящийся вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3), МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

174. Малый веретенник — *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

Размером мельче голубя. Похож на большого веретенника, но меньше размером, отличается вздернутым вверх клювом, отсутствием белой полосы вдоль крыла и белым хвостом с частыми поперечными темными полосками, поясница и задняя часть спины белые. Зимой серые с продольными пестринами. Молодые напоминают взрослых в зимнем оперении с охристым оттенком на груди. Отмечены единичные залеты в верховья Нижней Тунгуски, на южный Байкал (окрестности пос. Култук) и на Малое Море. Зал.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2).

ООПТ: ЗП.

175. Американский бекасовидный веретенник — *Limnodromus scolopaseus* (Say, 1823)

Спинная сторона черновато-бурая, испещренная беловатыми и ржавыми поперечными пестринами. Нижняя часть спины белая, надхвостье и верхние кроющие перья хвоста с черными поперечными

полосками. Брюшная сторона ржаво-рыжая, испещренная беловатыми каемками перьев и черноватыми пестринами, мелкими на горле и зобу и более крупными, поперечными на боках и подхвостье. У молодых птиц перья спины дымчатые с ржавыми каемками. Брюшная сторона охристо-дымчатая с пестринами. У птиц в зимнем оперении зоб и грудь дымчатые, брюшко белое. Отмечены единичные залеты на Байкал (на Малое Море) и на Братское водохранилище. Зал.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

ООПТ: ЗП.

176. Азиатский бекасовидный веретенник — *Limnodromus semihftmatus* (Blyth, 1848)

Кулик средних размеров (меньше чибиса). Темя черно-бурое с рыжеватыми пестринами. Перья спинной стороны черно-бурые с ржавчато-рыжими каемками, так что общий фон спины буровато-рыжий. Голова, грудь, брюхо ржавчато-рыжие, светлеющие к брюху. Ноги черно-бурые, клюв длинный, прямой, в вершинной части несколько расширен и уплощен. Сходен с большим веретенником, от которого хорошо отличается более коренастым телосложением, чуть меньшими размерами, прямым черным клювом и отсутствием ярких белых пятен на надхвостье и крыльях. Самка заметно бледнее самца, но все-таки ярко-рыжая. В прошлом гнездился в пойме р. Иркут. В настоящее время возможно спорадическое гнездование в долине р. Ока. На пролете отмечен на побережье Братского водохранилища, в Верхнем Приангарье, Баяндаевском районе, на побережье Байкала (на Малом Море) и в Байкало-Ленском заповеднике. Редкий, практически исчезнувший вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (2), К.к. Ирк. (3), МСОП (NT).

ООПТ: ЗП, ПГ.

177. Восточная тиркушка — *Glareola maldivarum* (J.R. Forster, 1795)

Размером немного меньше скворца. Спинная сторона дымчато-бурая с оливковым оттенком, низ шеи и горла бледные, слегка ржавчатые, от глаз вокруг горла идет черная полоска. Грудь дымчато-бурая, брюхо и подхвостье белые, испод крыла черный. Хвост с вилочкой, длинный. Клюв короткий, широкий, ноги черные. Известны единичные залеты на Малое Море и в окрестности Култука. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

178. Короткохвостый поморник — *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)

Размером с сизую чайку. Известно две морфы — светлая и темная. У светлой морфы на голове черновато-бурая шапочка. Горло, грудь и брюхо белые, бока тела и подхвостье серовато-бурые. У птиц темной морфы оперение бурое, голова, крылья и хвост более темные. Клюв и ноги черноватые. У молодых птиц верх тела бурый с охристыми каемками. Низ тела в полосах из белого, бурого и охристого цветов. Отмечен залет на озеро Байкал в окрестности пос. Култук. Зал.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

179. Средний поморник — *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)

Размером крупнее вороны. Похож на чайку, но более темной окраски. Может быть целиком черновато-бурого цвета (темная морфа), но чаще черновато-коричневый сверху и желтовато-белый снизу с темной шапочкой и нередко с темной полосой на груди. Центральная пара хвостовых перьев выдается за край хвоста, выглядит расширенной на конце. Молодые птицы серо-бурые. Полет стремительный, маневренный. Отмечены залеты на средний и южный Байкал, Братское водохранилище и в долину р. Китой. Зал.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

ООПТ: ЗП.

180. Длиннохвостый поморник — *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819)

Заметно мельче и стройнее короткохвостого поморника. Окраска как у его светлой морфы. Центральная пара заостренных хвостовых перьев очень длинная, в полете изгибается от ветра. Молодые птицы пестрые, центральные хвостовые перья слабо выдаются за край хвоста. Полет как у короткохвостого поморника, но более стремительный. Отмечен единичный залет на южный Байкал в окрестности пос. Култук. Зал.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

181. Черноголовый хохотун — *Larus ichthyaetus* (Pallas, 1773)

Крупная чайка (размером больше хохотуньи) с черной головой. От других обитающих в регионе черноголовых чаек отличается размерами, от крупных белоголовых чаек — окраской головы. Отмечен на Сушинском Калтусе недалеко от Ангарска, в окрестностях пос. Усть-Ордынский, в окрестностях Листвянки и в течение нескольких лет на

Осинских островах на Братском водохранилище. В последнем случае не исключена возможность спорадического гнездования. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (5), К.к. Ирк. (4).

ООПТ: ЗП.

182. Реликтовая чайка — *Larus relictus* (Lönnberg, 1931)

Чайка среднего размера с черной головой, спина и верхние кроющие крыла серые, остальное оперение белое. За глазом полукольцом расположено хорошо заметное белое пятно. Клюв и лапы темно-красные. Отмечен залет на Малое Море. Зал.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (I), К.к. России (1), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

183. Черноголовая чайка — *Larus melanocephalus* (Temminck, 1820)

Немного крупнее, коренастее и короткоклювее озерной чайки. Голова и верхняя часть шеи угольно-черные. Над глазом и под ним белые пятна, окаймляющие красные веки. Клюв красный с черным пятном в предвершинной части. Верхняя сторона тела светло-сизая, нижняя (шея, грудь, брюшко, хвост и подкрылья) белые. Лапы красные. Молодые сверху охристо-бурые, снизу белые. Отмечен залет в Витимский заповедник. Зал.

ООПТ: ВГЗ.

184. Малая чайка — *Larus minutus* (Pallas, 1776)

Заметно меньше голубя, крылья относительно короткие и более округлые. В сезон размножения голова черная, концы крыльев белые, испод крыла темный, дымчато-серый. Лапы и клюв красные. Вне сезона размножения голова белая с сероватыми пятнами. Молодая птица сверху с темно-бурыми пестринами, снизу белая. Полет легкий, порхающий. Хорошо плавает, не ныряет. Отмечено спорадическое гнездование в окрестностях Ангарска в бывшем заказнике «Сушинский Калтус». Летние встречи отмечены в Верхнем Приангарье в Аларском районе. На пролете встречается по берегам водоемов на большей части территории области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

185. Озерная чайка — *Larus ridibundus* (Linnaeus, 1766)

Размером мельче вороны, но крупнее голубя. Голова весной и летом темно-коричневая, зимой белая с темными пятнами у глаз. Характерный признак — клиновидная белая полоса от сгиба до конца крыла. Клюв

и ноги красные. Молодые птицы сверху коричнево-бурые с темной полосой вдоль края хвоста и темными пятнами на голове. Полет легкий, маневренный. Гнездится в долинах рек Иркут и Ангара и в Верхнем Приангарье на прудах. Отмечено спорадическое гнездование в окрестностях Ангарска и, возможно, на побережье Братского моря. На пролете встречается на берегах различных водоемов на большей части территории области. Обычный вид. Отмечена тенденция к росту численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

186. Морской голубок — *Larus genei* (Breme, 1840)

Чайка среднего размера. Крылья серые с черной вершиной, все остальное оперение белое с розовым отливом на брюшке и груди. Длинный тонкий клюв и лапы красные. Молодые с сероватым верхом и белым низом, черными концами крыльев и узкой полоской по краю хвоста. Отмечены залеты в окрестности Ангарска (заказник «Сушинский Калтус») и Иркутска (пойма Иркута). Зал.

Природоохранный статус: РИ.

ООПТ: ПГ.

187. Восточносибирская чайка — *Larus vegae* (Palmén, 1887)

Размером с хохотунью, но крылья и спина заметно темнее. Концы крыльев заметно темнее спины. Лапы желтые или серовато-желтые. Зимой на затылке и задней стороне шеи заметные сероватые продольные пестрины. Молодые птицы серовато-бурые с многочисленными пестринами. Отмечен на пролете на Малом Море, южном Байкале, в Витимском заповеднике и в Верхнем Приангарье. Редкий вид. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

188. Монгольская чайка — *Larus (vegae) mongolicus* (Sushkin, 1925)

Крупная чайка. Спина и крылья светло-серые, лапы розовые, клюв желтый с красным пятном на подклювье. Зимой продольные пестрины на голове слабо выражены. Молодые птицы пестрые, клюв темный. Гнездится на побережье озера Байкал (наиболее обычна на островах Малого Моря, кроме этого, на Ольхоне, на мысах на среднем и южном Байкале и на острове Бакланий Камень), в окрестностях Ангарска (заказник «Сушинский Калтус»), на Братском водохранилище (Осинские острова), в нижнем течении Ангары (долина р. Тушама), спорадически в окрестностях Иркутска и Черемхово и в Байкало-Ленском заповеднике. На пролете встречается на большей части

территории области. Обычный, на Малом Море многочисленный вид. В последние годы отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ.

189. Бургомистр — *Larus hyperboreus* (Gunnerus, 1767)

Очень крупная чайка, заметно крупнее хохотуньи. Взрослые птицы очень светлые, светло-сизые, концы крыльев белые. Лапы розовые, клюв желтый с красным пятном на подклювье. В зимнем наряде на голове и шее буроватые продольные пестрины. Молодые птицы светлее, чем у других чаек, однотонной светло-бурой окраски с густым светлым крапом. Отмечены залеты в Катангский район, на средний и южный Байкал, в Витимский заповедник и в Иркутск. Зал.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

190. Морская чайка — *Larus marinus* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная чайка, размером крупнее хохотуньи. Спина и крылья взрослых птиц черно-аспидные, столь же темные, как и концы крыльев. Лапы розовые, клюв мощный желтого цвета с красным пятном у вершины подклювья. Отмечен залет на южный Байкал в окрестности пос. Култук. Зал.

191. Сизая чайка — *Larus canus* (Linnaeus, 1758)

Размером с ворону. Спина и крылья бледно-сизые, концы крыльев черные с белыми пятнами, остальное оперение белое. Клюв и лапы желтые. Молодые птицы пестрые: хвост белый с черной полосой по краю. Отмечена на гнездовании в окрестностях Ангарска (заказник «Сушинский Калтус»), в дельте Голоустной, долине Нижней Тунгуски и, возможно, на Братском водохранилище в Верхнем Приангарье, на пролете встречается на водоемах на большей части территории области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ПГ, ТК.

192. Моевка — *Rissa tridactilla* (Linnaeus, 1758)

Чайка средних размеров, приблизительно с сизую чайку. Анатомической особенностью моевки является отсутствие заднего пальца. В осеннем оперении затылок и зашеек серые, на ушах темно-серые пятна обычно полулунной формы. У молодых на голове похожий темный рисунок, а также черное полукольцо на задней стороне шеи, черная полоса в виде угла вдоль всего крыла. На конце хвоста черная полоса, которая в центре хвоста шире, чем на краях. Ноги черные,

клюв темно-желтый с темной вершиной. Отмечены залеты на озеро Байкал (южная часть озера) и на Иркутское водохранилище. Зал.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

193. Розовая чайка — *Rhodostethia rosea* (MacGillivray, 1842)

Чайка небольшого размера. Спина и верх крыльев серо-сизые, голова, грудь и брюшная часть розовые. На шее узкий черный ошейник. Зимой ошейник отсутствует. Хвост клиновидной формы. Клюв черный, ноги красные. Единичный залет в Катангский район, имеется чучело в местном краеведческом музее. Зал.

Природоохранный статус: РА.

194. Белая чайка — *Pagophila eburnea* (Phipps, 1829)

Немного крупнее сизой чайки. Все оперение взрослых птиц круглый год белое, со слабым желтоватым оттенком (цвета слоновой кости), нет темной мантии. Ноги черные, клюв в основании голубовато-серый с желтой, оранжевой или красной вершинной частью. Оперение молодых птиц в основном белое, по верху крыльев и тела редкие темные пестрины, сгущения темных пестрин на «лице», концах крыльев, концевая полоса на хвосте. Отмечен единичный залет в Байкало-Ленский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РА, МСОП (NT), К.к. России (3).

ООПТ: ЗП.

195. Черная крачка — *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758)

Мелкая крачка легкого сложения размером немного крупнее скворца. Характерен вильчато вырезанный хвост. Окраска темная. Голова, шея и грудь черные, спина и крылья аспидно-серые, подхвостье и нижняя сторона крыльев белые. Лапы и клюв черные. В послегнездовом наряде низ тела и голова белые, шапочка на голове темная, крылья светлые, по бокам зоба темные пятна. Молодые птицы похожи на взрослых в зимнем наряде, но спина и крылья с охристыми и бурыми пестринами. Отмечено спорадическое гнездование в пойме Иркута и в Куйтунском и Зиминском районах. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ.

196. Белокрылая крачка — *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)

Мелкая птица размером с черную крачку. Отличается от нее более контрастной черно-белой окраской: голова, туловище и подкры-

лье черные, верхние кроющие крыла и хвост белые. Лапы ярко-красные, клюв темно-красный или черный. Молодые птицы похожи на молодых у черной крачки, но без темных пятен по бокам. Отмечено спорадическое гнездование в пойме Иркута и, возможно, на прудах в Верхнем Приангарье. На пролете встречается по берегам водоемов на большей части территории области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

197. Белощекая крачка — *Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811)

Немного крупнее черной крачки и более длиннокрылая. В брачном оперении напоминает речную крачку, но более темная. Белые щеки резко контрастируют с черной шапочкой и темно-серой грудью. Клюв и ноги темно-красные, хвост с неглубокой вырезкой. Взрослые птицы в зимнем оперении и молодые похожи на белокрылых крачек. Отмечено спорадическое гнездование в пойме Иркута, залеты в Аларский и Куйтунский районы и на Малое Море. Гн.

Природоохранный статус: РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, ПГ.

198. Чеграва — *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)

Очень крупная крачка размером больше сизой чайки. Характерным признаком является длинный ярко-красный клюв и вильчатый хвост. На голове черная шапочка, зимой с белыми пестринами. У молодых птиц на спине чешуйчатый рисунок. Полет с медленными взмахами крыльев. Во время пролета и кочевок отмечены встречи на побережье Байкала от Байкало-Ленского заповедника до Култука. Спорадическое гнездование на островах Малого Моря и Братского водохранилища (Осинские острова). Редкий вид, встречаются отдельные особи и небольшие стайки. Пр.

Природоохранный статус: РИ, РКт, К.к. России (3), К.к. Ирк. (4).

ООПТ: ЗП.

199. Речная крачка — *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758)

Крачка среднего размера. Отличается глубоко вырезанным вильчатым хвостом и очень длинными узкими крыльями. Спина и крылья сверху сизо-серые, брюшко и грудь сероватые, на голове черная шапочка. Лапы красные, клюв красный с черным кончиком. Молодые птицы сверху пестрые, снизу белые; лоб белый, темя и затылок черные с охристыми пестринами. Спорадически гнездится на побережье Байкала, крупных рек и озер на большей части территории области, известны гнездовья на искусственных водоемах (прудах, золоотвалах и карьерах). Обычный вид.

На гнездовании численность от отдельных пар до колоний в несколько десятков пар, иногда до полутора сотен. На пролете обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, ЛО, ПГ, ТК.

200. Малая крачка — *Sterna albifrons* (Pallas, 1764)

По размеру в два раза меньше речной крачки. В брачном наряде имеет неполную черную шапочку. Лоб и полоски над бровями белые. Клюв желтый с черным кончиком, лапы желтоватые. Сверху окрас светло-серый, снизу белый. В зимнем наряде лоб, уздечка и нижняя часть тела белые, темя белое с темными пестринами. Пятно перед глазом, кроющие уха и затылок черные, последний может быть с белыми пестринами. Отмечен залет в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ, К.к. России (2).

ООПТ: ВГЗ.

201. Полярная крачка — *Sterna paradisaea* (Pontoppidan, 1763)

Очень похожа на речную крачку, низ тела серый, клюв красный. У сидящей птицы конец хвоста заметно выступает за крылья. Зимой лоб белый, клюв черноватый. Имеется информация о встречах этого вида на севере Катангского района в долине р. Нижняя Тунгуска. Зал.

Природоохранный статус: РА.

202. Чистик — *Cepphus grille* (Linnaeus, 1758)

В брачном оперении все оперение черное, с большими белыми пятнами на крыльях сверху, хорошо заметными у плавающих и летящих птиц. Снизу крыла тоже большие белые пятна. Лапы ярко-красные. Клюв черный, прямой, остроконечный, слегка сжатый с боков. Известен единичный залет в долину р. Киренга в окрестности пос. Казачинское. Зал.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

Отряд Голубеобразные — Columbiformes

203. Вяхирь — *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758)

Крупный лесной голубь, заметно больше сизого. Крылья относительно короткие и закругленные, хвост длинный. В полете хорошо заметны крупные белые пятна на крыльях и по бокам шеи. Общий тон окраски буровато-сизый, клюв красноватый, глаза желтые. У молодых буроватые пятна на спине. Отмечены залеты на южный Байкал в окрестностях поселков Култук и Листвянка и в г. Байкальск, в долину

р. Снежной и в Куйтунский район. Населяет преимущественно пойменные леса. Редкий вид. Зал. ОО.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

204. Клинтух — *Columba oenas* (Linnaeus, 1758)

Лесной голубь размером с сизого, но несколько стройнее, с более крупной головой. Отличается отсутствием белого цвета на пояснице. Окраска однотонная голубовато-серая. По краю хвоста проходит темная полоса. Глаза темные, клюв розовый. Молодые с буроватым оттенком оперения. Встречается в западной, центральной и южной части Иркутской области на восток до долины р. Лена и Байкало-Ленского заповедника и на север до Братска. Населяет пойменные и смешанные леса с отдельными старыми дуплистыми деревьями по соседству с полями. Редкий вид, но отмечена тенденция к росту численности. Гн. ОО.

Природоохранный статус: Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП.

205. Сизый голубь — *Columba livia* (J.F. Gmelin, 1789)

Окраска сильно изменчива. Домашние птицы могут быть различной окраски — от белой до рыжей и черной, но большую часть составляют птицы «дикой» окраски — со светло-сизым крылом и двумя темными полосами на нем. От других видов голубей отличается белой поясницей, оранжевыми глазами у взрослых и черным клювом. У молодых птиц глаза коричневые. Населяет большинство населенных пунктов области, за исключением северных и северо-западных районов. Обычный, местами многочисленный вид, в сельской местности отмечена тенденция к снижению численности. В природных биотопах отсутствует. Ос.

206. Скалистый голубь — *Columba rupestris* (Pallas, 1811)

Светло-сизый тон оперения с металлическим блеском на шее, двумя поперечными полосами на крыльях, белой предвершинной и черной вершинной полосами на хвосте. На пояснице ярко-белое пятно. Молодые птицы в целом окрашены темнее взрослых, а предвершинная полоса на хвосте имеет светло-серый цвет. Радужина у молодых птиц темная, у старых — оранжевая или оранжево-красная. Клюв черный с ярко-белой восковицей, ноги красные. Встречается на большей части территории области, включая населенные пункты, кроме северных и западных районов. В природных биотопах населяет предпочтительно участки со скальными обрывами,

часто расположенные по берегам водоемов. На побережье Байкала и в отдельных населенных пунктах обычный вид, на остальной территории области редкий. Отмечена тенденция к резкому снижению численности. Ос. ОО.

Природоохранный статус: Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

207. Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)

Размером меньше сизого голубя. Верх тела и крыльев песочного цвета, голова и грудь серовато-рыжие с розовым оттенком. На шее сзади узкое черное полукольцо с белым ободком. На хвосте белый цвет занимает около трети рулевых перьев. У молодых птиц нет розового оттенка и полукольца и белый цвет на хвосте занимает меньше места. Отмечен залет в г. Слюдянка. Зал. ОО.

208. Большая горлица — *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)

Общий тон верха тела бурый, ближе можно разглядеть чешуйчатый рисунок, образованный рыжими каемками перьев спины и кроющих крыла. Белая полоса по краю хвоста более узкая и тусклая. Зеркальца по бокам шеи состоят из чередования черных и сизых (не белых) полосок. Голова и грудь рыжевато-коричневые. Самка незначительно отличается от самца более тусклой окраской груди. Молодые еще более блеклые, без полосатых пятен на боках шеи. Населяет лесные и лесостепные районы, за исключением крайней северной части области. В прошлом обычный, местами в лесостепных районах многочисленный вид, в настоящее время численность резко сократилась, местами данный вид полностью исчез. Редкий вид. Гн. ОО.

Природоохранный статус: РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

Отряд Кукушкообразные — Cuculiformes

209. Индийская кукушка — *Cuculus micropterus* (Gould, 1838)

Птица средних размеров. У самца голова и шея темно-серые, спина, верхние кроющие хвоста и крыльев буровато-серые с белыми или охристыми поперечными полосами. Рулевые с широкой черной предвершинной полосой и белыми вершинами. Подбородок, горло и передняя часть груди светло-серые, задняя часть груди и брюхо белые, иногда в крапинку. Клюв темнороговой сверху и зеленоватый снизу, веки и ноги желтые. У самки верх головы светлее, горло буро-

вато-серое, на передней части груди больше рыжего. Отмечен залет в окрестности пос. Листвянка. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

210. Обыкновенная кукушка — *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)

Стройная птица размером с голубя с длинным ступенчатым хвостом, острыми крыльями и короткими лапками. Окраска двух типов: серая с полосатым брюхом (самцы и самки) и каштаново-рыжая с темными поперечными полосами (только самки). Полет маневренный. Гнезд не строит, подбрасывает яйца в гнезда других птиц. Населяет лесные и лесостепные районы на большей части территории области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

211. Глухая кукушка — *Cuculus (saturates) optatus* (Gould, 1845)

Внешне сходна с обыкновенной кукушкой, отличить можно по контрасту с более темным верхом тела и более светлым низом. Отличается также по голосу — двухсложное «ду-ду, ду-ду, ду-ду» или быстро повторяющееся «ду-ду-ду-ду-ду». Населяет преимущественно таежные леса на большей части территории области. Редкий, местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

212. Малая кукушка — *Cuculus poliocephalus* (Latham, 1790)

Похожа на глухую кукушку, но значительно меньшего размера. У самца голова, спина и верхние кроющие хвоста темно-серые с голубоватым оттенком и со слабо выраженными пестринами и металлическим блеском, отмечен охристый налет на лбу и иногда на горле. Грудь и живот белые с черными поперечными полосками. Нижние кроющие хвоста белые с охристым оттенком. На нижней стороне маховых белые пятна. Сгиб крыла белый с серыми пятнами. Клюв темно-бурый, цевка и лапы буровато-желтые. Самки бывают серой окраски, похожие на самцов (но на груди и зобу у них пестрины и рыжий налет), и рыжей, похожие на самок глухой кукушки, но с более редкими полосками на нижней части тела. Отмечен залет в окрестности пос. Листвянка. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

Отряд Совообразные — Strigiformes

213. Белая сова — *Nyctea scandiaca* (Linnaeus, 1758)

Крупная, размером немного меньше филина, сова белого цвета с темными пестринами и ярко-желтыми глазами. У самок пестрин больше. С возрастом светлеют, у старых самцов пестрин практически нет. Можно увидеть сидящую на земле или на возвышенностях (столбах, скирдах и т.д.). Летает низко над землей, редко взмахивая крыльями. Активна как в темное, так и в светлое время суток. Зимующий и пролетный вид в южной и центральной части территории области. Отмечена летняя встреча в Куйтунском районе. Редкий вид. Численность в значительной мере зависит от состояния кормовой базы и на зимовке в наиболее благоприятные годы не превышает нескольких сотен особей. Зим.

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

214. Филин — *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

Очень крупная сова. Окрашен в рыжевато-коричневый цвет с крупными темными продольными пестринами и мелким струйчатым рисунком. Характерны хорошо развитые перьевые ушки. Глаза красно-оранжевого цвета. Ведет сумеречный и ночной образ жизни. На земле и деревьях сидит вертикально. Полет бесшумный. Распространен практически повсеместно, за исключением высокогорья. Наибольшая плотность отмечена в лесостепных районах вдоль Братского водохранилища. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

215. Ушастая сова — *Asio otus* (Linnaeus, 1758)

Размером немного больше голубя, рыжевато-бурого цвета с четкими темными продольными пестринами. Имеет четко выраженные лицевой диск и перьевые ушки, которые иногда могут быть прижаты и незаметны. Глаза оранжевые. Самки крупнее самцов. Активна в сумерках. Гнездится на большей части территории области. Населяет преимущественно пойменные и околоводные угодья. Более обычна в лесостепных районах. Численность сильно изменяется по годам в зависимости от состояния кормовой базы. В отдельные годы зимует в лесостепных районах. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт, РИ, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

216. Болотная сова — *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

Размером заметно больше голубя, самка крупнее самца. Окраска рыжеватая светло-охристая, светлее, чем у ушастой совы. Перьевые ушки развиты слабо. Глаза ярко-желтые. Полет мягкий, бесшумный. Активна в сумерки, но может охотиться и в светлое время суток. Населяет околоводные и заболоченные угодья на большей части территории области. Численность сильно изменяется по годам в зависимости от состояния кормовой базы. В отдельные годы зимует. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк., СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

217. Сплюшка — *Otus scops* (Linnaeus, 1758)

Мелкая сова размером с дрозда. Окраска от темно-серой до рыжей с темным рисунком из продольных пестрин. Имеет относительно некрупную голову, украшенную перьевыми ушками, и короткий хвост. Глаза желтые. Активна в темное время суток. Отмечена на побережье Байкала на север до Байкало-Ленского заповедника, в лесостепях Верхнего Приангарья, в долине Лены на север до границы с Якутией, в долине Ангары до окрестностей пгт Балаганск и в долине Чуны. Везде редкая, в последние годы отмечена тенденция к расширению ареала на север. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, СИТЕС (II), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

218. Мохноногий сыч — *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)

Небольшая сова размером крупнее дрозда, самка крупнее самца. Оперение бурое или буровато-серое со светлыми пятнами. Перьевых ушек нет, лицевой диск хорошо выражен, ноги и пальцы оперены. Глаза желтые. У молодых птиц окраска более коричневая. Активность ночная. Населяет преимущественно таежные местообитания в лесной зоне. Редкий вид, ведущий скрытый образ жизни. Ос.

Природоохранный статус: РА, РИ, РЯ, СИТЕС (II), Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

219. Домовой сыч — *Athene noctua* (Scopoli, 1769)

Небольшая сова, немного крупнее дрозда. Окраска бурая, сверху более темная со светлыми пестринами, брюшная сторона светлая с

темными продольными пестринами. Перьевых ушек нет, пальцы покрыты щетинками, глаза ярко-желтые. Лицевой диск выражен слабо. Молодые птицы более темные и однотонные. Активен в сумерках, но может охотиться и днем. Отмечены встречи в Куйтунском и Усть-Удинском районах. Зал.?

Природоохранный статус: РКт, СИТЕС (II).

220. Воробьиный сычик — *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758)

Самая мелкая сова, размером со скворца. Верх бурый или буровато-серый со светлыми пестринами, брюшко светлое с буроватыми пестринами. Хвост короткий, крылья широкие. Лицевой диск выражен слабо, перьевых ушек нет. Глаза желтые. Активен в светлое время. Делает запасы пищи в дуплах. Населяет преимущественно темнохвойные пойменные леса в лесной зоне, встречается в пойменных лесах в лесостепной зоне. Редкий малоизученный вид, ведущий скрытый образ жизни. Ос.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

221. Ястребиная сова — *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758)

Сова средних размеров, примерно с ворону. Нижняя сторона тела окрашена светлее верхней и имеет характерный полосатый рисунок. Спина бурая со светлыми пестринами. Глаза желтые, лицевой диск развит слабо, перьевые ушки отсутствуют. Хвост длинный, ступенчатый. Активна в светлое время суток. Полет быстрый и маневренный, может зависать на месте. Населяет лесную и лесостепную зоны, в зимнее время обычны кочевки за пределы гнездовой области. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РА, РКт, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

222. Длиннохвостая неясыть — *Strix uralensis* (Pallas, 1771)

Крупная сова, самка крупнее самца. Окраска преимущественно светло-серая с темными продольными пестринами. Голова большая, перьевых ушек нет. Лицевой диск хорошо выражен, глаза темные. Хвост длинный с темными полосами. Ведет сумеречный образ жизни. Населяет лесную и лесостепную зоны, обычна в лесостепях Верхнего Приангарья. Обычный вид. Численность зависит от состояния кормовой базы. Ос.

Природоохранный статус: РА, СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

223. Бородатая неясыть — *Strix nebulosa* (Forster, 1772)

Крупная, третья по величине сова. Окраска темно-серая с широкими продольными темными пестринами. Голова большая с хорошо выраженным лицевым диском, на котором хорошо заметны характерные концентрические круги и черная «борода». Перьевых ушек нет, глаза желтые. Активна в сумерках и в дневное время. Хвост и крылья длинные, полет плавный. Обитает в лесной зоне, преимущественно в хвойных и смешанных лесах. В лесостепи редка, обитает только в крупных лесных массивах. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Козодоеобразные — Cahrimulgiformes

224. Большой козодой — *Caprimulgus indicus* (Latham, 1790)

Очень похож на обыкновенного козодоя, но немного крупнее и темнее, на крайних перьях хвоста поперечная белая полоса, не доходящая до конца перьев. Поведением похож на обыкновенного козодоя. Отмечено спорадическое гнездование в долинах рек Ангара и Куда в Верхнем Приангарье, на южном Байкале (окрестности поселков Большие Коты и Большое Голоустное и на мысе Кадильный), возможно, гнездится в Приольхонье, известны залеты в долину р. Киренга. Редкий вид. Ведет ночной образ жизни. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

225. Обыкновенный козодой — *Caprimulgus europaeus* (Linnaeus, 1758)

Размером крупнее дрозда. Длиннохвостая и длиннокрылая птица с большой головой и маленькими лапками. Также характерны большие темные глаза, маленький клювик и широкий разрез рта. Окраска защитная, под цвет древесной коры и подстилки, серо-бурая, неровная. У самцов на конце хвоста и на крыльях белые пятна. В полете от кукушки отличается более широкими крыльями и веерообразным хвостом. Ведет ночной образ жизни. Населяет преимущественно пойменные луга, пастбища, в лесах — гари и вырубки. Распространен в западных, центральных и южных районах области. Редкий, местами обычный вид. Ведет ночной образ жизни. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.
ООПТ: ВГЗ?, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, МГ, ТК.

Отряд Стрижеобразные — Apodiformes

226. Иглохвостый стриж — *Hirundapus caudacutus* (Latham, 1801)

Крупный стриж с прямым хвостом, стержни хвостовых перьев выступают в виде острых иголочек. Коричнево-бурый с белым горлом и подхвостьем, белыми пятнами сверху у основания крыльев. Хвост и крылья темные с сине-зеленым блеском. На лапе три пальца направлены вперед, один — назад. Населяет горно-таежные леса в южной и восточной частях области. На пролете отмечен на побережье Байкала. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.
ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, ТР, ТК, ЭД.

227. Черный стриж — *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

Небольшая птица, крупнее ласточки, вся буро-черная, кроме беловатого горла, хвост слабо вырезан. Летает стремительно и неутомимо с пронзительным резким «стри-и-и...», от которого и происходит русское название. На лету напоминает туго натянутый лук или полумесяц. Держится обычно стаями. На земле беспомощен, ходить не может. Все четыре пальца повернуты вперед, благодаря чему стриж может подвешиваться на вертикальные стенки. Обитает в лесной зоне на большей части области, за исключением северных районов. Населяет преимущественно старовозрастные леса в долинах рек по соседству с открытыми участками. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РКт.
ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

228. Белопоясный стриж — *Apus pacificus* (Latham, 1801)

Темно-бурый стриж, горло и надхвостье белые. Хвост вырезан сильнее, чем у черного стрижа. Обитает на большей части территории области, за исключением северных и западных районов. Населяет скальные участки вдоль побережий водоемов, населенные пункты, в лесостепи — скальные обнажения. Наиболее обычен на побережье Байкала и на островах Малого Моря. Обычный, а на побережье Байкала местами многочисленный вид, в таежной зоне редок. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.
ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ПГ, ТК, ЧС.

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes

229. Сизоворонка — *Coracias garullus* (Linnaeus, 1758)

Размером с галку. Голубая с бурой спиной и плечами, клюв короткий, сильный, черный. Крылья острые, в полете синие. Молодые с бледно-коричневой головой. Полет маневренный, с резкими глубокими взмахами крыльев. По земле передвигаются довольно неуклюже. Резкий скрипучий крик «краше». Отмечен залет в Иркутск. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт, МСОП (NT), К.к. России (2).

230. Обыкновенный зимородок — *Alsedo atthis* (Linnaeus, 1758)

Большеголовая, длинноклювая и короткохвостая птица размером меньше дрозда. Окрашен ярко: верх сине-зеленый с металлическим отливом, низ насыщенный охристо-рыжий. Спина голубого цвета. У самки красное подклювье. У молодых клюв короче. Охотится за мелкой рыбой, ныряя на нее с присады. Встречается в южной части области, гнездование достоверно известно в долине Голоустной, отмечены залеты в Бодайбинский и Братский районы. Имеются зимние встречи в долине р. Снежная на юге Байкала и в Иркутске. Редкий вид, на территории области постоянно обитает ориентировочно не более десяти пар. Гн.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, КЧ.

231. Золотистая щурка — *Merops apiaster* (Linnaeus, 1758)

Контрастная яркая птица размером немного крупнее скворца. Характерны длинный, слегка изогнутый клюв, длинные крылья и хвост с удлиненными средними перьями. Спина и верх каштаново-коричневые, горло желтое, крылья и хвост зеленые, низ тела голубой. Молодые птицы бледнее. Известны единичные залеты в Нукутский район (выводок?) и окрестности Иркутска. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

Отряд Удодообразные — Upupiformes

232. Удод — *Upupa epops* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее скворца. Имеет характерный экзотический облик: яркое оранжево-желтое оперение, удлиненный хохолок и изогнутый длинный клюв. Полет волнообразный порхающий, во время которого хорошо заметна пестрая черно-белая

раскраска крыльев. При возбуждении расправляет пестрый хохолок веером. Населяет степные и лесостепные районы, отмечено спорадическое гнездование в лесной зоне на север до центральной части Катангского района и Витимского заповедника, часто обитает в населенных пунктах. В лесостепи предпочитает старые фермы и заброшенные постройки. Отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РЯ, РК, РКт, РИ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

Отряд Дятлообразные — Piciformes

233. Вертишейка — *Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее воробья. Клюв короткий, прямой. Окраска неброская, верхняя часть тела в серовато-бурых пятнах, пестринах и полосах, нижняя — светлая с густыми пестринами. Молодые птицы более тусклые. Населяет преимущественно пойменные местообитания в лесной и лесостепной зонах на большей части территории области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

234. Седой дятел — *Picus canus* (J.F. Gmelin, 1788)

Размером со скворца. Общая окраска зеленовато-седая. От клюва по щекам тянутся черные полоски «усов». У самца на передней части темени красное пятно. Окраска молодых бледнее, с бурыми пестринами. Населяет лесную зону на большей части территории области. Редкий вид. В зимнее время залетает в населенные пункты. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

235. Желна — *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из дятлов, размером с ворону. Оперение черное с красным теменем у самца и небольшим красным пятном на затылке у самки. Дупла характерной овальной формы. Населяет преимущественно старовозрастные, в основном лиственничные, и пойменные леса на большей части территории области. Редкий, на отдельных участках обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

236. Большой пестрый дятел — *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

Размером с крупного дрозда. Оперение черно-белое с крупным овальным белым пятном на крыле и красным подхвостьем. У взрослых темя черное, за исключением красного пятна на затылке у самца. У молодых оно спереди красное. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, предпочитая сосновые леса. Наиболее обычный вид из дятлов. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

237. Белоспинный дятел — *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803)

Немного крупнее большого пестрого дятла. Отличается от него белой нижней частью спины, окаймленной черно-белой перевязью, черными пестринами на боках тела и более длинным клювом. У самца темя красное, у самки — черное, у молодых красное пятно на темени бледное. Населяет преимущественно мелколиственные вторичные леса на большей части территории области. Редкий вид, встречается спорадически. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ЧС, ЭД.

238. Малый пестрый дятел — *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)

Самый мелкий из дятлов, размером мельче скворца. Оперение пестрое: верх спины черный, низ белый с черными поперечными полосами. У самца верх головы матово-красный, у самки — белый. У молодых красный лоб и брюхо более темное. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, предпочитает пойменные леса. В зимнее время залетает в населенные пункты. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

239. Трехпалый дятел — *Picoides tridactilus* (Linnaeus, 1758)

Размером со скворца. Окраска пестрая: вдоль спины тянется белая полоса, по бокам головы черно-белые полосы. У самца темя желтое, у самки — светло-серое с пестринами. У молодых черный цвет замещен бурым. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает таежные и пойменные леса. Редкий, местами обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes

240. Береговушка — *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

Небольшая птичка размером с воробья с характерным обликом ласточки — стройного сложения с длинными заостренными крыльями, с вырезанным посередине хвостом, короткими лапками, приплюснутой с коротким клювом головой и широким разрезом рта. Верх тела глинисто-бурый без блеска, низ белый, бурая перевязка на горле. Большую часть времени проводит в воздухе, полет легкий, маневренный. Характерно спорадическое гнездование на побережьях водоемов, в карьерах, оврагах, обрывах. Обычный колониальный гнездящийся вид. На пролете обычный, местами многочисленный вид, отмечена на большей части территории области. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЭД.

241. Бледная береговушка — *Riparia dulita* (Sharpt et Wyat, 1893)

Окраской и внешним видом очень похожа на береговушку, но меньше и стройнее, с менее глубокой вырезкой хвоста. Верх более светлый и более серовато-коричневый, чем у береговушки, перевязь на груди светлее и более серо-коричневая. Грудная перевязь не только светлее, но и менее четкая. Голова также значительно светлее, чем у береговушки, особенно сверху и на кроющих ушей, которые очень светлые и заметно контрастируют с темными глазами и более темной уздечкой. Имеется информация о встречах этого вида в долинах рек Лена, Нижняя Тунгуска и Ангара и во время пролета на юге области. Гн.? Пр.

242. Скалистая ласточка — *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)

Взрослые птицы сверху бурые, иногда на крыльях и на голове цвет несколько темнее. Нижняя сторона грязно-белая с буро-охристым оттенком брюшка. Горло светлое, почти белое, с мелкими бурыми пестринами. На рулевых белые пятна. Хвост слабо вырезан. Клюв черный, ноги светло-бурые. У молодых в отличие от взрослых на спине развиты ржавчато-бурые каемки, брюшная сторона более ржавчатого цвета и маховые и рулевые темнее, чем у взрослых. Возможно, обитает в Тофаларии, вблизи границы с которой обнаружена в Красноярском крае.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

243. Деревенская ласточка — *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)

Самая крупная из ласточек, размером немного меньше воробья. Отличается удлиненными крайними рулевыми перьями, особенно у

самца. Окраска черная с синим металлическим отливом сверху и белая снизу. На груди темная перевязь. Лоб и горло темно-красные. На хвосте перевязь из белых пятен. Полет энергичный, быстрый, часто садится на провода или деревья. Обитает в населенных пунктах, на хозяйственных постройках за их пределами (фермы, мосты, заброшенные дома, зимовья и пр.) на большей части территории области, за исключением северных таежных районов. Обычный вид, но отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

244. Рыжепоясничная ласточка — *Hirundo daurica* (Linnaeus, 1771)

Размером немного меньше воробья. Верх головы, спина и хвост сине-черные, верх шеи и надхвостье ржаво-рыжие, низ тела охристо-беловатый с узкими продольными бурыми пестринами. Косицы не очень длинные и широкие. В прошлом обитала в Иркутске. Отмечены единичные залеты в Байкало-Ленский и Витимский заповедники. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

245. Воронок — *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше воробья. Верх головы, спина и хвост сине-черные, верх шеи и надхвостье ржаво-рыжие, низ тела охристо-беловатый с узкими продольными бурыми пестринами. Косицы не очень длинные и широкие. Обитает в населенных пунктах, на хозяйственных постройках (фермы, мосты, заброшенные дома, зимовья и пр.) на большей части территории области, за исключением северных таежных районов. В природных ландшафтах населяет долины рек в горных районах. Обычный вид, но отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, ЛО, ПГ, ТК, ЧС.

246. Восточный воронок — *Delichon dasypus* (Bonaparte, 1850)

Внешне похожа на предыдущий вид. Спинная сторона иссиня-черная, бока бурые, брюхо и надхвостье с буроватым налетом, хвост почти без вырезки. Населяет высокогорья Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Байкальского хребта в верховьях Лены и высокогорья в северо-восточных районах. Гнездится колониями до нескольких десятков особей, как правило, вблизи от водопадов на берегах горных рек. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

247. Малый жаворонок — *Calandrella brachydactyla* (Leister, 1814)

Мелкий жаворонок, с воробья. Верх буроватый с темными продольными пестринами, низ, полоски по бокам хвоста и бровь охристо-белые, грудь без пестрин, на боках груди бурые пятна. Поет обычно в воздухе, рывками поднимаясь вверх. Отмечен единичный залет на Малое Море в окрестности пос. Сахюрта. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

248. Монгольский жаворонок — *Melanocorypha mongolica* (Pallas, 1776)

Размером немного крупнее полевого жаворонка. Окраска верха тела монгольского жаворонка рыжевато-бурая, шапочка на голове рыжая, низ тела и широкая полоса на крыле белые. По бокам шеи большие черные пятна. Самка сходна с самцом. Отмечен залет в окрестности Култука. Зал.

Природоохранный статус: РКт, К.к. России (3).

249. Рогатый жаворонок — *Eremophyla alpestris* (Linnaeus, 1758)

Наземная птица размером немного меньше скворца. Отличается контрастной черно-желтой или черно-белой окраской головы с черными перьями — «рожками» по бокам темени. Общий фон верхней части тела серовато-бурый с небольшим количеством пестрин, низ тела белый. Имеются темные «усы» и пятно на груди. Хорошо бегают. На территории области обитает два подвида: белогорлый рогатый жаворонок *E. a. brandti* — обычный гнездящийся вид на острове Ольхон, в Приольхонье и Тажеранской степи, гнездится в высокогорьях на хребте Хамар-Дабан, в прошлом, возможно, населял долину р. Куда и Верхнее Приангарье, где в настоящее время практически исчез, изредка зимует в Приольхонье (Гн., Пр. 2 Ирк.); желтогорлый, или тундряной, рогатый жаворонок *E. a. flava* — обычный пролетный и зимующий на большей части степных и лесостепных районов, возможно спорадическое гнездование в высокогорье Байкальского хребта. Пр. Зим. Гн.?

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ТК.

250. Полевой жаворонок — *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее воробья, с более длинными крыльями и хвостом. Верх тела серовато-коричневый с черноватыми пестринами, низ белесый, грудь рыжеватая с мелкими пестринами. Хвост коричневый с белыми крайними рулевыми. На голове небольшой хо-

холок. Населяет луговые сообщества и агроценозы на большей части территории области. В отдельные годы отмечены случаи зимовки на Южном Байкале и в Верхнем Приангарье. Обычный, местами многочисленный вид, но в последние годы наметилась тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ПГ, ТК.

251. Степной конек — *Anthus richardi* (Vieillot, 1818)

Самый крупный из коньков. Верх рыжевато-бурый с темными пестринами, низ белый, на зобу и груди охристый налет и редкие бурые пестрины, бровь беловатая. Высоко держится на ногах и всем телом вытягивается вверх. Окрашен светлее других коньков, с которыми может встречаться вместе. Населяет луговые и степные сообщества в центральной и южной части области, а в высокогорьях Восточного Саяна и Хамар-Дабана — горные луга. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ПГ, ТК.

252. Конек Годлевского — *Anthus godlewskii* (Taczanowskii, 1876)

Похож на лесного конька, но окраска с рыжим налетом, особенно на груди, коготь заднего пальца почти прямой. Ноги светлые. Голос и токовой полет как у лесного конька. Отмечено спорадическое гнездование в Куйтунском районе и в дельте Голоустной и залеты в Иркутск, на южный Байкал и в Витимский заповедник. Численность в области в настоящее время не превышает нескольких десятков пар, скорее всего, проходит расширение ареала этого вида на север или его флуктуация. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

253. Полевой конек — *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

Внешним образом похож на лесного конька, но немного крупнее. Верх тела светлой однотонной песочно-палевой окраски практически без пестрин. Молодые темнее взрослых с пестринами на груди. Отмечен единичный залет на западное побережье Байкала. Не исключено, что эта информация может относиться к предыдущему виду, так как ранее их объединяли в один вид. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

254. Лесной конек — *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше и стройнее воробья. Верх буровато-серый с черновато-бурыми пестринами, низ тела светло-охристый. На груди

и боках темные пестрины, крайние рулевые белые. Ноги и подклювье телесно-розовые. У молодых птиц более четкие пестрины на верху тела. Много времени проводит на деревьях. Населяет лесные и лесостепные районы на большей части территории области, предпочитая участки с открытыми пространствами (агроценозами, гарями, вырубками) и опушки лесов. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

255. Пятнистый конек — *Anthus hodgsoni* (Richmond, 1907)

Размером меньше и стройнее воробья. Верх зеленоватый с черновато-бурыми пестринами, низ тела светло-охристый. На брюшке больше темных пятен, они крупнее, особенно в верхней его части. Населяет преимущественно таежные и горные леса на большей части территории области. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

256. Сибирский конек — *Anthus gustavi* (Swinhoe, 1863)

Похож на лугового конька, немного крупнее его, более короткохвостый, большеголовый и длинноклювый, более бурый сверху, брюшко более светлое. На спине каемки, образующие продольные полосы в чередовании с черными, на крыле две белых или палевых полоски. В осеннем пере и взрослые, и молодые птицы более охристые. Отмечены залеты в Иркутск, на южный Байкал и в Байкало-Ленский заповедник. Имеются указания на летние встречи на Байкальском хребте и на севере Катангского района. Пролет в Витимском заповеднике. Пр. Гн.?

Природоохранный статус: РА, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

257. Луговой конек — *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)

Похож на лесного конька, но более короткохвостый. Верх тела оливково-серый с черновато-бурыми пестринами. Низ беловатый или желтовато-беловатый. На груди и боках четкие черные пестрины. Ноги темнее, чем у лесного конька, подклювье желтое. Отмечены залеты (пролет?) в верховья р. Лена, в окрестности Иркутска и на южный Байкал. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

258. Краснозобый конек — *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)

Размером и внешним видом похож на лесного конька. Весной верх оливково-охристый с темными пестринами. Низ светло-охри-

стый с резкими черными пестринами на боках. На горле, груди и боках головы розовато-рыжий оттенок. Крайние рулевые беловатые, надхвостье с черными продольными пестринами. Ноги буроватые. Отмечен на пролете на побережье Байкала в Приольхонье, Байкало-Ленском заповеднике и в Верхнем Приангарье. Редкий вид, на пролете встречается небольшими стайками до нескольких десятков особей. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ТК.

259. Гольцовый конек — *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771)

Похож на горного конька, но сверху очень темный, буроватый, снизу охристый, грудь в крупных черных пестринах. Населяет гольцовый пояс гор южной части области (Хамар-Дабан, возможно Восточные Саяны и южную часть Байкальского хребта). Встречен в Витимском заповеднике. В характерных местообитаниях обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

260. Горный конек — *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)

Верх головы и надхвостье серые, спина буро-серая, крылья и хвост бурые, брюшко и полосы по бокам хвоста белые, горло, зоб, грудь охристо-розовые, на груди и голове иногда резкие пестрины. Клюв черно-бурый, ноги черноватые. Населяет гольцовый пояс гор на большей части области. Обычный вид. На пролете отмечен в Верхнем Приангарье и на побережье Байкала. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

261. Желтая трясогузка — *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758)

Чуть меньше воробья, но заметно стройнее. Хвост относительно длинный. У самцов темя и бока головы серые, над глазом иногда белая бровь. Спина оливково-зеленая или коричнево-оливковая. У самок темя такого же цвета, как спина. Низ тела желтый. На крайних рулевых широкие белые полосы. Молодые сверху коричневые с черноватыми пятнами, снизу беловато-охристые, на груди ожерелье из темных пестринок, осенью неотличимы от самок. Отмечена на гнездовье в Чунском районе. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

262. Черноголовая трясогузка — *Motacilla feldegg* (Michahelles, 1830)

Похожа на желтую трясогузку, окраска головы, шеи и верхней части спины угольно-черная. Голову иногда украшает белая или желтая бровь.

Верхняя часть тела серо-желтовато-зеленая, брюшко ярко-желтое или белое. Крылья бурые с отдельными белыми и желтыми перьями. Ноги и клюв черные. Самка окрашена в зеленовато-бурый цвет с серым надхвостьем. У молодых птиц в оперении преобладает бурый цвет с черными пестринами. Отмечен единичный залет в г. Иркутск в пойму р. Иркут. Зал.

263. Желтолобая трясогузка — *Motacilla (flava) lutea* (S.G. Gmelin, 1774)

Размером немного меньше воробья с длинным хвостом. У самца спина зеленовато-желтая, крылья и хвост бурые, голова и весь низ тела желтые. Самки и молодые окрашены тусклее, на спине, голове и груди буроватый налет. Зарегистрированы залеты (пролет?) на западном побережье Байкала. Зал.

ООПТ: ЗП.

264. Беринги́йская желтая трясогузка — *Motacilla tschutschensis* (J.F. Gmelin, 1789)

Верх тела оливково-зеленый, низ желтый, горло иногда белое. На голове темно-серая шапочка и более темная маска. У части птиц голова светлой голубовато-серой окраски с белой бровью. Маховые и верхние кроющие хвоста темно-бурые. Самки окрашены заметно бледнее самцов. Отмечена на пролете в долине рек Нижняя Тунгуска и Киренга, в Витимском заповеднике, в Иркутске, на Малом Море и на южном Байкале. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ, ТК.

265. Зеленоголовая трясогузка — *Motacilla (tschutschensis) taivana* (Swinhoe, 1863)

Похожа на желтолобую трясогузку, отличается оливково-зеленой головой и желтой бровью. Возможно гнездование в Бодайбинском районе. В Витимском заповеднике гнездится. На пролете встречена в Приольхонье, Куйтунском районе, в Иркутске в пойме Иркута и в долине Ангары. Редкий вид. Гн.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

266. Китайская желтая трясогузка — *Motacilla (tschutschensis) macronix* (Stresemann, 1920)

Похожа на желтую трясогузку. У самца голова до щек темно-серая. Белая бровь отсутствует. Подбородок обычно желтый, реже белый. У самок, как правило, шапочка более светлая, полоса над глазом отсутствует. Отмечена в окрестностях пос. Листвянка. Гн.?

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

267. Желтоголовая трясогузка — *Motacilla citreola* (Pallas, 1776)

Немного меньше воробья, с длинным хвостом. У самца бóльшая часть головы, горло, шея, грудь и низ тела желтые, зашеек черный, спина серая. Самки бледнее, без черного зашейка и с серовато-бурым верхом головы и зашейком. Хвост черный с белыми рулевыми. Молодые сверху коричневые, снизу беловато-охристые, на груди ожерелье из черных пятен. Населяет влажные луга на побережьях различных водоемов на большей части территории области. В характерных местообитаниях обычный вид. На пролете часто летит совместно с другими видами трясогузок. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ПГ, ТР, ТК.

268. Малая желтоголовая трясогузка — *Motacilla (citreola) werae* (Buturlin, 1908)

Похожа на желтоголовую трясогузку. У самцов нижняя сторона тела и голова желтые, подхвостье беловатое. Спина, поясница и надхвостье серые. Бока живота со слабым сероватым оттенком. Крылья темно-серые с широкими белыми каемками на третьестепенных маховых и кроющих крыла. Самки окрашены бледнее самцов. Уздечка и кроющие перья уха темные, в центральной части желтоватые. Серая окраска спины распространяется на затылок и темя. Хорошо выражены широкие брови. Белая кайма на крыльях уже, чем у самцов. Молодые птицы лишены желтой окраски. Населяет западную часть Иркутской области до Тулунского и Братского районов на восток. Гн.

Природоохранный статус: РИ.

ООПТ: ББ, ЭД.

269. Горная трясогузка — *Motacilla cinerea* (Tunstall, 1771)

Размером чуть меньше воробья. Хвост длиннее тела. Верх серый, крылья буро-черные, горло и брюшко беловатые, остальной низ и надхвостье желтые. Хорошо отличается зеленовато-желтым надхвостьем, у самцов весной черное горло. Населяет побережья горных таежных рек, ручьев и озер и населенные пункты в таежной зоне области и на побережье Байкала. Обычный вид. На пролете часто летит совместно с другими видами трясогузок. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

270. Белая трясогузка — *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья, но более стройная, с длинным хвостом. У взрослых спина серая, грудь, горло, темя, затылок, зашеек и полоса

через глаза черные, низ тела, лоб и бока головы белые. Хвост черный, крайние рулевые белые. У молодых серая голова, беловатое горло и широкое сероватое ожерелье на груди. Населяет побережья водоемов и населенные пункты на большей части территории области. Часто за пределами населенных пунктов селится в постройках человека (зимовья, мосты, хозяйственные сооружения). Обычный вид, на пролете многочисленный, часто летит совместно с другими видами трясогузок. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

271. Маскированная трясогузка — *Motacilla personata* (Gould, 1861)

Похожа на белую трясогузку, но почти вся голова, шея и верх груди черные, только на лбу и глазах белая маска. Белые каемки на крыле очень широкие, сливаются в белое поле, спина серая, постепенно серый переходит в черный цвет на шее. Самка похожа на самца, отличается от него наличием серых тонов на черных участках головы, спина светлее. Осенью черного на голове остается много, появляются белые перья на подбородке и горле, спина серая. У молодых горло и подбородок серые, есть грязновато-белое поле на крыле. Нередки случаи гибридизации с белой трясогузкой, встречаются птицы с промежуточными признаками. Гнездится на западе области в Тайшетском, Братском, Чунском и Нижнеудинском районах. Известны залеты на южный Байкал, в г. Иркутск, в Байкало-Ленский заповедник и Куйтунский район. В местах гнездования обычный вид. Гн.

ООПТ: ЗП.

272. Сибирский жулан — *Lanius cristatus* (Linnaeus, 1758)

Мелкий сорокопут с относительно короткими крыльями и довольно длинным ступенчатым хвостом. Как и у всех сорокопутов, клюв сильный, на конце крючкообразно загнутый, у конца надклювья зубцеобразный выступ, ноги с острыми загнутыми когтями. У самца верх серовато-бурый, голова рыжеватая, хвост желтовато-бурый. Низ охристый, лоб, бровь и горло белые. Самка тусклее, молодые темнее. Населяет кустарниковые и пойменные биотопы на большей части территории области, за исключением высокогорных районов. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

273. Буланый сорокопут — *Lanius isabellinus* (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

У самца верх головы, зашеек и спина серовато-глинистые, лоб желтовато-охристый, кроющие уха, полоска над глазом и пятно перед глазом черные. Маховые бурые с охристыми каемками. На крыле небольшое зеркальце. Надхвостье рыжеватое; хвост рыжеватый с бурым налетом к концу. Горло, грудь, брюшко и бока светло-охристые. Самка очень похожа на самца, немного бледнее. Темные пятна по бокам головы бурые. Клюв буровато-роговой, ноги бурые. Залет в низовья долины Иркута. Зал.

ООПТ: ПГ.

274. Рыжехвостый жулан — *Lanius phoenicuroides* (Schalow, 1875)

У самца окраска верха песочного цвета или бурая, шапочка рыжая, бурая или буровато-серая, хвост и поясница ярко-рыжие. Самка тусклее самца, маска на глазах бурая, снизу бурый чешуйчатый рисунок, как у самки обыкновенного жулана. Основания первостепенных маховых белые, это хорошо видно как на сложенном крыле, так и на раскрытом, в полете — в виде белой скобы, отличающей птиц этого вида как от обыкновенных, так и от сибирских жуланов. Залет в окрестности пос. Листвянка. Зал.

ООПТ: ЗП.

275. Обыкновенный жулан — *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее воробья. У самца каштановая спина, серые надхвостье и голова с черной полосой через глаз и черный хвост с белыми пятнами по бокам. Самка охристо-коричневая сверху, грязно-белая с темным чешуйчатым рисунком снизу. Молодые похожи на самку, но чешуйчатый рисунок заходит на спину. Возможно, гнездится в западных районах области. На пролете отмечен в Верхнем Приангарье, Иркутске и на Южном Байкале. Гн.?

Природоохранный статус: РКт.

276. Северный сорокопут — *Lanius borealis* (Vieillot, 1807)

Размером заметно крупнее скворца. У взрослых птиц спина пепельно-серая, низ белый, характерны довольно длинный ступенчатый хвост, черная полоса от клюва через глаз, сильный клюв, крючкообразно загнутый на конце. На крыльях хорошо заметны белые пятна. У молодых птиц клюв и хвост короче, окраска верха с буроватым оттенком, низ с неясным волнистым рисунком. Гнездится в высокогорье на хребте Хамар-Дабан и, возможно, в Катангском районе, на остальной территории области редкий пролетный и зимующий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ТК.

277. Клинохвостый сорокопут — *Lanius sphenocercus* (Cabanis, 1873)

Размером крупнее скворца. Окраска как у серого сорокопута, но на плечах и на крыльях широкие белые полосы, брюшная сторона и боковые перья на хвосте белые. Молодые птицы буроватые сверху без поперечного рисунка. Хвост длинный клиновидный и резко ступенчатый. Известны залеты, в том числе и в зимний период, на южный Байкал в окрестности пос. Листвянка и в долину р. Куда. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ЗП.

278. Обыкновенная иволга — *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

Размером крупнее скворца. Самец отличается ярко-желтой окраской туловища с черными крыльями и полосой через глаз, хвост черный с желтыми пятнами. У самки желтый цвет заменен желтовато-зеленым с темно-бурыми продольными пестринами на груди и брюшке, старые самки похожи на самца. Молодые птицы похожи на самок. Клюв красный, у молодых розоватый. Спорадическое гнездование в лесах западной и южной части области до долины р. Иркут и верховий р. Голоустная. Залет в Байкало-Ленский заповедник. Населяет высокоствольные лиственные и сосновые леса. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

279. Китайская иволга — *Oriolus chinensis* (Linnaeus, 1766)

Похожа на обыкновенную иволгу, отличается широкой черной замкнутой полосой, проходящей через глаз и затылок. Молодые сверху оливково-зеленые, снизу беловатые с темными пестринами. Отмечены залеты в окрестности Байкальска и в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РЯ, РКт, РИ.

ООПТ: ВГЗ.

280. Серый скворец — *Spodiopsar cineraseus* (Temminck, 1836)

Размером с обыкновенного скворца. Дымчато-серый с белым брюшком и надхвостьем, шея и затылок черные, у самцов голова белая или черная в густых белых пестринах, у самок черно-бурая; клюв и ноги оранжево-желтые. Молодые птицы серовато-бурые. Регулярные залеты на юг области в Приольхонье и Верхнее Приангарье до Иркутска, отмечено единичное гнездование в окрестностях пос. Большое Голоустное и залеты в Витимский и Байкало-Ленский заповедники. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

281. Обыкновенный скворец — *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758)

Взрослая птица весной отличается черным с пурпурным и зеленым отливом оперением и охристыми пестринами на спине и задней части брюшка, клюв желтый. В осеннем наряде охристые и белые пестрины густо покрывают все тело, клюв темный. Молодые — темно-бурые с грязно-белым горлом. Населяет западные и южные районы области, на остальной территории — спорадическое гнездование и пролет. В прошлом обычный вид, в настоящее время произошло резкое сокращение численности, на многих участках прежнего обитания практически исчез. В последнее время наметилась тенденция к восстановлению численности. Обитает как в населенных пунктах, так и в естественных биотопах, преимущественно в старовозрастных пойменных лесах. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, ПГ.

282. Розовый скворец — *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758)

Внешне похож на обыкновенного скворца. Голова, шея, крылья и хвост черные с металлическим блеском, остальное оперение розовое. На голове хохол. Молодые — серовато-бурые со светлым брюхом. Отмечены залеты в окрестности пос. Большая Речка, Качуг и в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

283. Кукша — *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758)

Самая мелкая из врановых птиц. Оперение пышное рыхлое. Общий фон окраски серовато-бурый с участками рыжего цвета на крыльях и надхвостье, хвост рыжий с продольной рыжей полосой посередине. Молодые похожи на взрослых. Полет тихий и тяжелый, в полете раскрыт хвост. Населяет таежные леса на большей части территории области, преимущественно елово-пихтовую и кедрово-лиственничную тайгу, в зимнее время совершает кочевки. Редкий, местами обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

284. Сойка — *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

Величиной с галку. В окраске туловища и головы преобладает рыжий цвет. На черном крыле хорошо заметно голубое зеркальце, в полете заметны белые надхвостье и пятна на крыльях. Населяет лесную зону на большей части территории области, за исключением се-

вера, в зимнее время во время кочевок посещает населенные пункты. Редкий, местами обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

285. Голубая сорока — *Cyanopica cyanus* (Pallas, 1776)

Размером меньше сороки. Красивая птица с голубыми крыльями и длинным голубым хвостом, буро-серым верхом и черной шапочкой. Горло, щеки, грудь и конец хвоста белые с буроватым налетом. Населяет юго-западную часть области до долины р. Голоустная на восток и Зиминского района на север, отмечены залеты в Витимский и Байкало-Ленский заповедники. Обитает преимущественно в пойменных лесах, гнездится небольшими колониями, вне гнездового периода кочует стаями по несколько десятков особей. Ареал имеет тенденцию к расширению. Редкий, местами обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

286. Сорока — *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

Хорошо известная птица с длинным ступенчатым хвостом. Окраска черно-белая, черные участки имеют заметный металлический отлив. У молодых черный цвет с бурым отливом. Полет прямой, довольно тяжелый. Спорадическое гнездование на большей части территории области, за исключением северных и высокогорных районов и острова Ольхон. Предпочитает пойменные леса и окрестности населенных пунктов, в лесостепи населяет лесополосы. Обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ПГ.

287. Кедровка — *Nucifraga cariocatactes* (Linnaeus, 1758)

Большеголовая и длинноклювая птица размером с галку. Оперение каштаново-бурое с густым белым крапом, подхвостье и полоса по краю хвоста белые. У молодых крапинки охристые. Полет тяжелый. Населяет темнохвойные кедровые леса и заросли кедрового стланика, находки гнезд известны на Хамар-Дабане, отмечено спорадическое гнездование в окрестностях Иркутска. Во время периодических кочевок можно встретить на большей части территории области. Численность сильно меняется по годам в зависимости от урожая кедрового ореха в диапазоне от очень небольшой до значительной. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

288. Клушица — *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)

Размером примерно с галку. Черная с синим блеском птица. Клюв довольно длинный, изогнутый вниз, кораллово-красный. Ноги красные, хвост короткий. У молодых оперение матово-черное, клюв и ноги грязно-оранжевые. Полет быстрый и легкий. Отмечены регулярные залеты на южный Байкал от окрестностей пос. Култук на север до мыса Кадильного. Зал.

Природоохранный статус: Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП.

289. Альпийская галка — *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766)

Значительно крупнее обыкновенной галки. Внешним видом и образом жизни очень похожа на клушицу, но имеет более короткий желтый клюв, красные лапы. Хвост относительно длинный. Отмечен залет в долину Иркута. Зал.

290. Обыкновенная галка — *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758)

Размером в полтора раза меньше вороны. Окраска черная с металлическим блеском на спине и плечах. Голова и шея серые, на голове черная маска, радужина глаз светлая. Молодые птицы более тусклые. Полет легкий. Отмечены регулярные залеты вдоль железнодорожной магистрали до Иркутска и лесостепей Верхнего Приангарья и в Витимский заповедник, не исключена возможность спорадического гнездования. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ.

291. Даурская галка — *Corvus dauuricus* (Pallas, 1776)

Похожа на обыкновенную галку. Взрослые птицы серые или почти белые с черными головой, крыльями и хвостом. Молодые — черные с темно-серой шеей и белым зашейком, иногда почти неотличимые от обыкновенной галки. Более осторожна, чем последняя. Населяет степные и лесостепные районы на юге области. Наиболее обычна на побережье Байкала в Приольхонье и на острове Ольхон. В прошлом обитала в Верхнем Приангарье, в настоящее время отмечена тенденция к снижению численности, и на большей части Верхнего Приангарья практически исчезла, отмечен залет в Витимский заповедник. На побережье Байкала в настоящее время обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, МГ, ПГ.

292. Грач — *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758)

Размером с ворону. Черный с металлическим отливом, основание клюва грязно-белое. Молодые птицы без металлического отлива и с

черным основанием клюва. Населяет лесостепные и сельскохозяйственные ландшафты на юге области. Гнездится большими колониями от нескольких десятков до нескольких сот пар. Обычен в лесостепях Верхнего Приангарья, но в последние годы наметилась тенденция к сокращению численности. Отмечен залет в Витимский заповедник. Часть птиц остается на зимовку. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, МГ, ПГ.

293. Большеклювая ворона — *Corvus macrorhynchos* (Wagler, 1827)

Крупная ворона с сильным и резко выпуклым по гребню надклювья клювом. От черной вороны отличается голосом, большими размерами и крупным, массивным клювом. В полете — относительно длинным и резко клиновидным хвостом. Отмечен залет в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РЯ.

ООПТ: ВГЗ.

294. Восточная черная ворона — *Corvus (corone) orientalis* (Eversmann, 1841)

Хорошо знакомая всем довольно крупная птица полностью черного цвета с металлическим блеском (от ворона отличается меньшими размерами и прямым концом хвоста, от молодого грача неотличима). Населяет бóльшую часть территории области, но предпочитает освоенные человеком районы, обычна в населенных пунктах, в природных биотопах редка. Птицы из северных районов зимой совершают кочевки. Ос.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

295. Серая ворона — *Corvus (corone) cornix* (Linnaeus, 1758)

Размером в полтора раза больше голубя. Окраска двухцветная: голова, горло, крылья и хвост черные, остальное оперение серое. Молодые птицы похожи на взрослых, но у них серый цвет с буроватым оттенком. Отмечены регулярные залеты вдоль железнодорожной магистрали от западной границы до г. Иркутска и в Катангский район. Отмечено спорадическое гнездование отдельных пар и случаи гибридизации с черной вороной. Гн.

296. Ворон — *Corvus corax* (Linnaeus, 1758)

Размером значительно больше вороны. Окраска черная с металлическим блеском. Клюв мощный, под клювом имеются удлиненные

перья — «борода». Хвост длинный, в полете заметна его клиновидная форма. Молодые стройнее взрослых с более тусклой окраской. Полет прямой, мощный. Населяет преимущественно таежные лесные районы на большей части территории области. Зимой совершает кочевки, в том числе и в окрестности населенных пунктов. Редкий, местами обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РА, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

297. Свиристель — *Bombicilla garulus* (Linnaeus, 1758)

Большеголовая серовато-коричневая птица размером со скворца с большим хорошо заметным хохлом. Короткий черный хвост с желтой полосой по краю. Крылья черные с белыми, желтыми и красными полосками. Подхвостье каштаново-красное. Горло и полоса через глаз черные. Полет прямой. Населяет горные и таежные леса северной и северо-восточной части области на юг до Усть-Удинского района. В зимнее время встречается в населенных пунктах. Обычный, местами и в отдельные годы многочисленный вид. Численность зависит от состояния кормовой базы. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

298. Амурский свиристель — *Bombicilla japonica* (Siebold, 1826)

Очень похожа на свиристеля, но в отличие от него на конце хвоста красная полоса, подхвостье у самца красное, у самок коричневое. Отмечены залеты в г. Иркутск и его окрестности, в г. Слюдянка и в Куйтунский район. Зал.

Природоохранный статус: РКт, РК, РЯ, МСОП (NT).

299. Серый личинкоед — *Pericrocotus divaricatus* (Raffles, 1822)

Похож на белую трясогузку, но клюв чуть крючковатый, хвост ступенчатый. Верх головы и шеи у самца черный, у самки серый; через глаз проходит черная полоска, лоб и брюхо белые. Полет ныряющий, заметны белые полоски на черной нижней стороне крыла. Отмечен залет в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ.

300. Оляпка — *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)

Коренастая короткохвостая птица размером с дрозда. Окрашена в темно-бурый цвет с белыми грудью и горлом, причем размер бело-

го пятна сильно варьирует. Молодые птицы с чешуйчатым рисунком верха тела и пестринами на груди. Околоводная птица. Полет быстрый, летает низко над водой, хорошо ныряет и даже бегает по дну, собирая корм. Населяет побережья быстрых горных речек на большей части территории области, гнездится, как правило, вблизи водопадов и порогов. В зимнее время концентрируется на незамерзающих участках рек, в том числе на р. Ангара и ее притоках в городах Ангарске и Иркутске. Редкий вид. Гн. Зим.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ТК, ЧС.

301. Крапивник — *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)

Размером вдвое меньше воробья, мелкая очень подвижная птичка. Короткий хвост обычно держит поднятым вверх или наклоненным вперед. Окраска темно-коричневая со слабо заметными пестринами. Держится на земле в гуще кустов или бурелома. Отмечено спорадическое гнездование в захламленных зарослях кустарников в поймах ручьев на северо-востоке области (Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы) и на побережье Байкала в Байкало-Ленском заповеднике, возможно гнездование в долине р. Голоустная, зарегистрированы залеты в Верхнее Приангарье. Редкий вид, отмечена тенденция к расширению ареала. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

302. Альпийская завирушка — *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

Размером с воробья. У взрослой птицы верх серовато-бурый с темно-бурыми пестринами на спине и пояснице. На плече у крыла небольшой рыжеватый участок. Подбородок и горло грязно-белые с черно-бурыми пестринами. Зоб, середина груди и брюшко серовато-бурые, бока груди и туловища яркие, ржаво-коричневые. Подхвостье коричневато-бурое. Ноги телесно-желтые. Надклювье черно-бурое, подклювье желтое с темной вершиной. Молодая птица сверху буровато-серая с пестринами на спине, низ охристо-буроватый с грязно-белыми основаниями перьев на зобу. Населяет каменистые участки со скудной растительностью в альпийском и субальпийском поясе горных хребтов Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Байкальского хребта и Северо-Байкальского нагорья. Редкий, местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЧС.

303. Гималайская завирушка — *Prunella himalajana* (Blyth, 1842)

Размером меньше альпийской. Верх тела буро-серый с продольными темно-бурыми пестринами. Хвост и крылья черно-бурые, на конце

хвоста белые пятна. Горло белое в верхней части с черно-бурыми пятнышками. Низ беловатый с крупными ржаво-коричневыми пестринами, почти сливающимися на груди. Молодые более тусклые с большим количеством темных пестрин на голове. Населяет склоны гор с лужайками и россыпями из крупных камней в альпийском и субальпийском поясах горных хребтов Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Байкальского хребта и Северо-Байкальского нагорья, редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

304. Бледная завирушка — *Prunella fulvescens* (Severtzov, 1873)

Птица размером с воробья. Верх шеи, спина и надхвостье буровато-серые, на спине бурые продольные пестрины. Верх и бока головы темные, через глаз идет широкая черноватая полоса, над глазом к шее — широкая белая полоса. Горло беловатое, низ беловато-охристый. Населяет субальпийские и альпийские лужайки на горных хребтах Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Байкальского хребта и Северо-Байкальского нагорья на север до Витимского заповедника. Зимой отмечена в окрестностях Култука. Редкий вид, известны отдельные встречи. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

305. Сибирская завирушка — *Prunella montanella* (Pallas, 1776)

Птица размером с воробья. Верх коричневый с бурыми наствольными пятнами. Верх головы темный, через глаз идет широкая черноватая полоса, над глазом к шее — широкая охристая бровь. Горло светлое. Низ желтовато-охристый. Гнездится в горных лесах на верхнем пределе лесной растительности и в древесно-кустарниковых насаждениях преимущественно хвойных пород на Байкальском хребте, на пролете отмечена на большей части территории области. Редкий, во время пролета местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

306. Малая пестрогрудка — *Tribura (thoracica) davidi* (La Touche, 1923)

Очень мелкая птичка с темно-бурым верхом, на спине красно-бурый оттенок, голова буро-серая, низ беловатый, подхвостье рыжевато-бурое с беловатыми пятнами, на зобу и груди темно-бурые пестрины. Населяет кустарниковые с обильным травостоем опушки тайги и прилежащее травянистое лиственное мелколесье, а также открытые

травянистые луга с отдельными деревьями и кустарниками по окраинам леса в южной части области и на Орлингском плато, более обычна на хребте Хамар-Дабан. Залет в Байкало-Ленский заповедник. Возможно, встречена в Витимском заповеднике. Редкий вид, ведущий скрытый образ жизни.

Природоохранный статус: РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ?, ЗП, КЧ.

307. Сибирская пестрогрудка — *Tribura tacsanowskia* (Swinhoe, 1871)

Очень похожа на малую пестрогрудку, но крупнее, с более светлой оливково-буроватой спинкой с неясными полосами; зоб, бока груди темные, низ беловатый, на груди бурые пятна, неясная палевая бровь. Населяет высокоствольные прирусловые леса с хорошо развитым подлеском и травянистой растительностью, обширные травянистые поляны и сухие травянистые горные долины с редкими кустарниками в южной части области. Редкий вид, ведущий скрытый образ жизни. Гн.

Природоохранный статус: РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ЗП, КД, КР, КЧ.

308. Таежный сверчок — *Locustella fasciolana* (G.R. Gray, 1860)

Сравнительно крупный сверчок, темный оливково-бурый сверху и беловато-серый снизу. Хвост и надхвостье с рыжеватым оттенком. Зоб, грудь и бока оливково-буроватые. Чрезвычайно осторожен. Населяет густые травянистые заросли лугов, речных долин, горных склонов, травянистые вырубки, поляны и лесные опушки в лесной зоне западной, центральной и южной части территории области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТР, ТК, ЭД.

309. Певчий сверчок — *Locustella certhiola* (Pallas, 1811)

Размером меньше воробья. Верх бурый с рыжеватым надхвостьем, затылок сероватый. На голове, спине и плечах темные бурые пестрины, хвост рыжеватый с темными пятнами. Низ охристо-беловатый, бровь охристо-серая. Менее осторожен, чем другие сверчки. Населяет разнообразные влажные или заболоченные места от низин до альпийских лугов как на открытых пространствах, так и в разреженных хвойных и лиственных лесах на большей части территории области. Обычный, на пролете вдоль побережья Байкала многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

310. Обыкновенный сверчок — *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)

Размером меньше воробья. Верх бежевый или оливковый с темными пестринами, низ сероватый, на шее иногда темные пестрины. Под хвостом и на боках тела тонкие темные пестрины. Ноги розоватые. У молодых желтовато-песчаный оттенок оперения. Отмечен в окрестностях пос. Листвянка. Возможно спорадическое гнездование в западных районах области. Редкий вид. Гн.?

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

311. Речной сверчок — *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810)

Сверчок среднего размера, сверху буровато-оливковый, снизу светлый с размытыми продольными пестринами на груди. Охристые со светлыми каемками перья подхвостья образуют чешуйчатый рисунок. Радужина темная, клюв и ноги тусклые. У молодых птиц развит желтоватый оттенок. Отмечен в окрестностях пос. Листвянка. Зал.

ООПТ: ЗП.

312. Пятнистый сверчок — *Locustella laceolata* (Temminck, 1840)

Птичка серого цвета с глинистым желтовато-бурым оттенком, с черноватыми наствольями сверху. Низ беловатый, бока охристые с продольными бурыми пестринами. Населяет влажные травянистые и кустарниковые луга вдоль опушек тайги и травянистый ярус разреженных лесов на большей части территории области. Обычный, во время пролета местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ТР, ЭД.

313. Камы́шевка-барсучок — *Acrochephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше воробья. Ноги длинные, клюв тонкий. Буроватый с темными пестринами на спине, крыльях и темени верх и светлый, почти белый низ. Характерны широкие белые полосы с черными полосками над ними. Надхвостье рыжевато-охристое. Молодые желтее взрослых. Ротовая полость красно-розовая. Спорадическое гнездование в пойме Иркута в Иркутске, в Тайшетском районе и, возможно, на отдельных участках в Присаянье. Добыт в районе мыса Заворотный на северо-западном побережье Байкала. Редкий вид, в области обитает не более нескольких десятков пар. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ПГ.

314. Чернобровая камышевка — *Acrochephalus bistrigiceps* (Swinhoe, 1860)

Похожа на садовую камышевку. Верх тела рыжевато-бурый, на голове и спине черные и бурые продольные пестрины, над глазом светло-охристая широкая бровь, низ беловатый с охристым налетом на боках. Спорадическое гнездование установлено для верховий Лены. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

315. Индийская камышевка — *Acrochephalus agricola* (Jerdon, 1845)

Размером меньше воробья. Ноги длинные, клюв тонкий. Буроватый с темными пестринами на спине, крыльях и темени верх и светлый, почти белый низ. Характерны широкие белые полосы с черными полосками над ними. Надхвостье рыжевато-охристое. Молодые желтее взрослых. Ротовая полость красно-розовая. Возможно, гнездится в бывшем заказнике «Сушинский Калтус» в окрестностях г. Ангарска, где встречена в летнее время. Редкий вид. Гн.?

Природоохранный статус: РИ.

316. Садовая камышевка — *Acrochephalus dumetorum* (Blyth, 1849)

Размером немного меньше воробья. Верх окрашен в ровный буроватый цвет, низ светлый, почти белый. Ротовая полость розовая, над глазом слабо выражена светлая бровь, оливковое надхвостье, крылья короткие и окрашены ровно. Спорадически встречается в южной и центральной части области до долины р. Лена на восток и на север до Катангского района. Редкий малоизученный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ПГ, ТК.

317. Болотная камышевка — *Acrochephalus palustris* (Bechstein, 1797)

Мелкая птичка. Окраска однотонная, оливково-бурая сверху, более светлая снизу, над глазом светлая бровь. В свежем пере развит охристый оттенок, особенно на пояснице. Радужина темная, надклювье буроватое, подклювье желтоватое, ноги имеют тусклую окраску, подошвы желтые. Отмечена в пойме р. Бирюса у с. Шипицыно и в долине р. Кирейская Тагна. Зал.

318. Дроздовидная камышевка — *Acrochephalus arundinactus* (Linnaeus, 1758)

Самая крупная камышевка. Длина тела достигает 19 см, крылья длиной 9 см, масса тела составляет от 25 до 36 г. Верх коричнево-бежевый с небольшим посветлением на надхвостье; низ светлый со слабым бежеватым налетом на боках. На шее спереди иногда проступают мелкие размытые темноватые пестринки. Клюв относительно длинный, несколько утолщенный, мощный, коричневый с розоватым основанием подклювья. Радужина коричневая, ноги коричневые. У поющего самца ротовая полость красная. Молодые птицы, как и у других камышевок, имеют более рыжеватое и рыхлое оперение. Отмечен залет в Тайшетский район. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

319. Восточная дроздовидная камышевка — *Acrochephalus orientalis* (Temminck et Schlegel, 1847)

Размером крупнее воробья. Окраска верха однотонная буроватая, низ светлый с охристым оттенком по бокам. Над глазом неясная светлая бровь. Клюв мощный, утолщенный, ротовая полость ярко-розовая. Отмечено спорадическое нерегулярное гнездование в долинах рек Иркут и Ока. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ. К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ПГ.

320. Толстоклювая камышевка — *Phragmaticula aedon* (Pallas, 1776)

Довольно крупная птичка, немного мельче скворца. Верх рыжевато-бурый, низ грязно-белый. Хвост довольно длинный, ступенчатый. Скрытна, но в гнездовое время самец поет довольно открыто на вершинах деревьев и кустов, хотя и не подпускает близко. Населяет кустарники и мелколесья среди влажных травянистых пространств, кустарниковые луга речных долин, лесные опушки на юге лесной и лесостепной зоны. Редкий, местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЭД.

321. Северная бормотушка — *Iduna caligata* (M.N.K. Lichtenstein, 1823)

Мелкая оливково-сероватая птичка, похожа на камышевку. Верх тела однотонный буровато-серый, низ светлый. Над глазом неяркая светлая бровь и светлое кольцо вокруг глаза. Кончик клюва темный.

Малозаметна, держится у земли. Спорадически гнездится в западных районах области на восток до Братска. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

322. Садовая славка — *Silvia borin* (Boddaert, 1783)

Размером немного меньше воробья. Верх однотонный серо-бурый без отметин, низ сероватый, бока охристые. Ноги и клюв светло-серые. На шее выделяется серое пятно. Гнездится в западных районах области. На юге области в гнездовой период обнаружены в г. Иркутске, пос. Култук и в устье р. Тойсук (приток р. Китой). Редкий вид. Гн.

ООПТ: ЗП.

323. Серая славка — *Silvia communis* (Latham, 1787)

Размером меньше воробья. Верх буровато-коричневый, крылья ржаво-коричневые, контрастируют со спиной. Низ беловатый с рыжеватым налетом на груди. Верх головы и щеки у самцов серые, горло ярко-белое у самцов и грязно-белое у самок и молодых. Вокруг глаза белое кольцо. Ноги желто-коричневые. Молодые похожи на взрослых, но более охристые. Гнездится в южной и западной части области и в долине р. Нижняя Тунгуска. Населяет заросли кустарника или высокого бурьяна на открытых местах или на опушках леса. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

324. Славка-мельничек — *Silvia curruca* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше воробья. Спина буровато-серая, низ тела белый, серая голова и темно-серые щеки. Ноги темно-серые. Держится в основном в кустах и подлеске, малозаметна. Населяет заросли кустарников по опушкам леса, лугам, вдоль водоемов в лесной и лесостепной зонах на большей части территории области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

325. Пеночка-весничка — *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)

Изящная птичка размером меньше воробья. Верх зеленовато-серый с более ярким надхвостьем, горло и грудь желтоватые, брюхо беловатое, бровь беловатая или желтая. Клюв прямой, тонкий, ноги светло-коричневые или желтоватые. Гнездится в долине р. Нижняя Тунгуска в северной части области. Населяет заросли кустарников близ водоемов, подлесок в лесу. На юге области единичные встречи во время пролета. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ОЗ, ТР, ЧС.

326. Пеночка-теньковка — *Phylloscopus collubita* (Vieillot, 1817)

Небольшая тускло окрашенная, буровато-серая сверху, беловатая снизу пеночка с неясной желтой бровью и без полосок на крыльях. Ноги черные или темно-коричневые, на груди мало желтого, по бокам брюшка светло-коричневый налет, клюв темный. Населяет высокоствольные хвойные и смешанные леса, в горах — заросли кустарников в субальпийской зоне, на большей части территории области. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

327. Пеночка-трещотка — *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)

Пеночка средних размеров. Спинная сторона тела пеночки-трещотки яркая, желтовато-зеленая, над глазом ярко-желтая бровь, хорошо различимая даже на расстоянии (из-за нее этот вид часто называют пеночкой-желтобровкой). Брюшная сторона белая с желтым налетом на передней стороне шеи и боках. Населяет леса различных типов. Клюв бурый, ноги светло-бурые. Залеты в Катангский район в долину р. Тетея, в Иркутск, в окрестности Листвянки и на Олхинское плато. Зал.

ООПТ: ЗП.

328. Пеночка-таловка — *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858)

Пеночка средних размеров. Верх зеленовато-бурый, на крыле две светлые поперечные полосы, одна из них неясная; над глазом желтовато-белая бровь, низ грязно-белый с беловатым оттенком на груди. Населяет хвойные и смешанные леса от равнин до высокогорий и заросли кустарников на большей части территории области, но более обычна в зарослях кустарников и стланика в горных районах. Обычный, местами, особенно во время пролета, многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

329. Зеленая пеночка — *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837)

Размером гораздо меньше воробья. Верх зеленовато-серый, низ грязно-белый с желтоватым налетом на груди и горле. Бровь беловатая, ноги сероватые. Населяет светлые смешанные и лиственные леса в лесной и лесостепной зонах на большей части территории области,

в горах обитает в субальпийском поясе в зарослях высоких кустарников. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

330. Бледноногая пеночка — *Phylloscopus (tenellipes) tenellipes* (Swinhoe, 1860)

Размером гораздо меньше воробья. Спинная сторона бурая с рыжеватой поясницей и надхвостьем, несколько отличающимися от тона спины. Крыло и хвост бурые. На крыле две поперечные полосы, бровь желтовато-белая. Подмышечные перья желтые. Брюшко беловатое с желтыми пестринами, на боках буроватый оттенок. Клюв бурый, ноги серовато-желто-зеленые. Населяет долины рек. Гнездится в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РЯ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ.

331. Пеночка-зарничка — *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)

Очень мелкая пеночка. Верх буровато-зеленый, над глазом, а иногда и посреди головы светлые полосы, поперек крыла две светлые зеленоватые полоски, низ беловатый. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, предпочитает хвойные леса, пойменные тополевники, заросли кедрового стланика. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

332. Тусклая зарничка — *Phylloscopus humei* (Brooks, 1878)

Похожа на пеночку-зарничку, но несколько крупнее нее и гораздо более тускло окрашена. Верхняя сторона тела серовато-зеленоватого цвета, светлая надглазничная полоска более охристая и менее белесая. Маховые перья серого цвета. Третьестепенные маховые не имеют светлых окончаний. Крыловая полоска образуется средними кроющими крыла и слабо выражена, вершины данных перьев обладают светлыми серо-зелеными или желтовато-зелеными окончаниями. Обитает на хребте Хамар-Дабан. Гн.

333. Корольковая пеночка — *Phylloscopus (proregulus) proregulus* (Pallas, 1811)

Самая мелкая пеночка. Верх тела оливково-зеленый, голова буроватая, крылья и хвост бурые, поперек крыла две широкие желтоватые

полоски. Низ тела серовато-белый с желтым налетом на боках и брюшке. Отличается ярким желтым надхвостьем, широкой полосой на темени и бровями. Один из лучших певцов тайги. Населяет лесную зону на большей части территории области, наиболее обычна в темнохвойной тайге, высокоствольных пойменных лесах, в редколесье и криволесье горной тундры. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

334. Бурая пеночка — *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842)

Самая темная из пеночек, без желтоватых и зеленоватых тонов. Сверху бурая с рыжеватой поясницей, снизу беловато-коричневая, бровь охристо-беловатая. Населяет пойменные кустарниковые биотопы и зарастающие гари и вырубки на большей части территории области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

335. Индийская пеночка — *Phylloscopus griseolus* (Blyth, 1847)

Пеночка среднего размера. Верх буровато-серый, брюхо желтоватое с бурым налетом на боках, бровь ярко-желтая. Крыло без полос. Обитает в субвысокогорьях хребта Хамар-Дабан в узкой полосе кедровых парков и разреженных зарослей кедрового стланика. Немногочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

336. Толстоклювая пеночка — *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863)

Довольно крупная пеночка, скрытна и осторожна. Верх оливково-бурый, крылья и хвост бурые со светлыми продольными каемками на перьях, низ беловатый, на боках и подхвостье оливково-охристый налет, надхвостье желтовато-оливковое, бровь светло-охристая. Населяет светлые лиственные и смешанные леса, разреженные заросли по склонам холмов. Селится в разреженных увлажненных лесах, в высокогорных кустарниках и зарослях ивняка, по берегам рек в южной и центральной частях области. Редкий, местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ОЗ, ПГ, ТК.

337. Желтоголовый королек — *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)

Крошечная птичка с тоненьким клювом, самая маленькая в фауне России. Верх тела зеленоватый, низ светлый. На сложенном крыле

черно-белый узор, на голове на темени ярко-контрастный рисунок — оранжевый у самцов, желтый у самок — пробор, обведенный по краям черными продольными полосами. У молодых верх головы однотонный. Голос — тонкое негромкое «ци-ци», песня — серия свистов из очень высоких нот. Населяет равнинные и горные хвойные и хвойно-лиственные, преимущественно пихтово-еловые леса на большей части области, распространение спорадическое. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

338. Мухоловка-пеструшка — *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1864)

Окраска взрослого самца черно-белая, контрастная. Спина и темя черные, на лбу белое пятно, поясница серая, хвост буровато-черный с белой каемкой по краям, брюхо белое, крылья темно-бурого, почти черного цвета с большим белым пятном. Самки и молодые самцы окрашены более тускло: черные тона в оперении заменены серовато-бурыми, белые — грязно-белыми. Гнездится в смешанных и лиственных лесах, предпочитая светлые и редкие рощи, лесные опушки, сады со старыми дуплистыми деревьями, а также богатые дуплами участки леса. Встречена в Чунском районе, в окрестностях Братска, в Иркутске и на Южном Байкале в долине р. Снежная. Гн.

339. Мухоловка-белошейка — *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815)

Размером меньше воробья. Самец темный сверху с белыми зашейком, пятном на крыле и поясницей, белый снизу, на лбу белое пятно. Самка серо-бурая с белым пятном на крыле. Известен единичный залет в Южное Предбайкалье. Зал.

340. Желтоспинная мухоловка — *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845)

Самец ярко-желтый снизу и черный сверху, выделяется ярко-желтая поясница, белые продольные полосы на крыльях, белые брови. Самка сверху оливковая с лимонной поясницей и белыми полосами на крыльях, снизу желтоватая с сернистым оттенком. Молодая птица расцветкой сходна с самкой. Отличается чешуйчатым рисунком. Обитатели смешанных и лиственных лесов. Залет в Байкало-Ленский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ЗП.

341. Таежная мухоловка — *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1835)

Птица размером немного меньше воробья. Отличается ржаво-рыжей грудью. У самца верх и хвост черные, широкая полоса

на плечах, полоса за глазом и брюшко белые, горло, зоб и грудь, бока ржаво-рыжие. У самок и молодых вместо черного цвета буровато-серый, вместо рыжего — грязный желтовато-рыжеватый. Населяет темнохвойные, преимущественно пойменные леса на большей части территории области. Более обычна в северных районах. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС.

342. Восточная малая мухоловка — *Ficedula (parva) albicilla* (Pallas, 1811)

Заметно мельче других мухоловок. Верх тела однотонный светловато-бурый, низ белый. Горло у старых самцов светло-рыжее, у годовалых и самок белесое. Самка буро-серая сверху и грязно-серая снизу. Хвост с белыми пятнами по бокам. Населяет лиственные, смешанные и хвойные леса, вырубки и гари, кустарниковые заросли вдоль водоемов в лесной и лесостепной зонах. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЭД.

343. Серая мухоловка — *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)

Размером с воробья, верхняя часть тела серая, темнее нижней. Верх головы с четкими, а грудь с размытыми пестринами. Крылья темно-бурые. У молодых охристые пестрины на спине. Голос — негромкое цвирканье и приглушенные свисты. Населяет разреженные древостои, просеки, вырубки в лесной зоне в западной и южной частях области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ЭД.

344. Сибирская мухоловка — *Muscicapa sibirica* (J.F. Gmelin, 1789)

Очень похожа на серую мухоловку, но на лбу нет беловатых пестрин, горло белое, грудь буроватая, на крыле узкая светлая полоска. Населяет светлые хвойные и лиственные леса в лесной зоне на большей части территории области. Редкий, местами обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК, ЭД.

345. Пестрогрудая мухоловка — *Muscicapa griseisticta* (Swinhoe, 1861)

Размером с воробья, верхняя часть тела сероватая и темнее нижней. Верх головы с четкими пестринами. Крылья темно-бурые. На

брюшной стороне и груди темный рисунок, состоящий из широких продольных пестрин. Клюв у́же, чем у сибирской мухоловки. Известны единичные залеты в верховья Лены и окрестности Иркутска. Зал.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.

346. Ширококлювая мухоловка — *Muscicapa dauurica* (Pallas, 1811)

Похожа на серую мухоловку, но вокруг глаза светлое кольцо, низ белый с серовато-бурым налетом на груди (без пестрин). Позывка — звонкое «сиит-сит», похожее на голос серой мухоловки. Населяет пойменные заросли и смешанные и лиственные леса в лесной зоне в центральной и восточной частях территории области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ЭД.

347. Луговой чекан — *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)

Размером меньше воробья. Верх светло-бурый, на спине темные продольные пестрины. На голове выделяется широкая белая бровь, на крыльях — белые зеркальца, на крайних рулевых — белые основания. Низ светлый без пестрин с рыжеватым оттенком на горле и груди. Самцы окрашены контрастнее и ярче самок и молодых. Хвост короткий, при тревоге птица резко им подергивает. Возможно, гнездится в западных районах области. Редкий вид. Гн.

348. Азиатский черноголовый чекан — *Saxicola maurus* (Pallas, 1773)

Размером меньше воробья. Верх светло-бурый, на спине темные продольные пестрины, на крыльях белые зеркальца. У самца темная голова, белые ошейник и поясница и ярко-рыжая грудь. У самки светлая поясница, верх пестрый. Молодые похожи на самок, но у них верх со светлыми и низ с темными пестринами. Населяет лесные вырубки, луга с большетравьем или кустарниками, болота, а также бывшие пашни и залежи. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

349. Обыкновенная каменка — *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья, относительно короткохвостая. Самец сверху пепельно-серый, через глаз проходит черная полоса. Крылья темные, надхвостье белое, низ светлый желтоватый. Самки и молодые — ох-

ристо-бурые с рыжеватой грудью и белым брюшком. На хвосте при полете виден перевернутый Т-образный рисунок на белом фоне. Населяет открытые ландшафты (сухая каменистая тундра, субальпийские и альпийские луга, степи, выгоны, пустыри) и населенные пункты на большей части территории области. Обычный вид, в последнее время отмечена тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК.

350. Каменка-плешанка — *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770)

Похожа на обыкновенную каменку, но хорошо отличается пегой окраской: у самца верх головы, поясница, надхвостье и весь низ белые, остальное оперение черное. У самки спина бурая. Обитает в степях на побережье Байкала, известны залеты в лесостепные районы в долине р. Куда (возможно спорадическое гнездование) и на побережье Братского водохранилища. Предпочитает скалистые участки. Обычный, местами редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

351. Пустынная каменка — *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825)

Самец сверху охристо-сероватый, горло, бока головы, крылья и хвост до половины длины черные, брюхо и надхвостье белые. Самка и молодые птицы окрашены светлее, чем другие каменки, хвост бурый. Гнездится в полупустынях. Залеты на Малое Море, в Иркутск и в Витимский заповедник. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

352. Каменка-плясунья — *Oenanthe isabelina* (Temminck, 1829)

Размером с воробья. Общая окраска буровато-серая с охристым оттенком, крылья бурые, надхвостье и основание хвоста белые. Хвост черный. Населяет степные и лесостепные районы Приольхонья, Ольхона и Верхнего Приангарья, в распространении тесно связана с длиннохвостым сусликом, в норах которого гнездится. В последние годы наметилась тенденция к сокращению ареала и численности, наиболее сильно численность снизилась в левобережном Приангарье, на остальной территории Приангарья редка. В Приольхонье, Тажеранской степи и на острове Ольхон местами обычна. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

353. Пестрый каменный дрозд — *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1776)

Мелкий дрозд. У самца голова и шея серо-голубые, спина и крылья темно-бурые, надхвостье белое, грудь, брюшко и хвост ржаво-рыжие. Самка сверху преимущественно бурая с посветлением на пояснице, снизу охристо-рыжая с темным чешуйчатым рисунком. Самец осенью похож на самку, но местами среди пестрин проглядывают цвета брачного наряда. Молодые в гнездовом оперении похожи на самку, в целом более охристо-рыжие, особенно спина. Гнездится в Восточном Саяне и на побережье Байкала по Байкальскому хребту на север до верховий р. Окунайка, известен залет на Братское водохранилище. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ЗП.

354. Белогорлый дрозд — *Petrophyla gularis* (Swinhoe, 1863)

У самца верх головы голубой, спина, бока головы, крылья и хвост буро-черные, надхвостье и низ тела ржаво-коричневые, горло и пятна на крыльях белые. У самки и молодых спина, крылья и хвост буровато-серые, на спине поперечные темные пестрины, верх головы серый, низ беловатый с поперечными темно-бурыми пестринами. Населяет горные леса хребта Хамар-Дабана и южного Байкала (долина Ушаковки, падь Кадильная и окрестности пос. Листвянка) и север Байкальского хребта. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ЗП.

355. Обыкновенная горихвостка — *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше воробья. У самца яркая и контрастная окраска — белый лоб, серые верх головы и спина, черные бока головы и горло, бурые крылья, оранжево-красная нижняя часть тела, рыжий хвост. Самки светло-бурые, верх темнее, низ светлее, с бурыми крыльями, светлым горлом и рыжим хвостом. Молодые — бурые с пестринами и рыжим хвостом. Населяет смешанные, лиственные и реже сосновые леса, сады, парки в населенных пунктах в западной и южной частях области, отмечена на гнездовании в Катангском районе. Залет в Витимский заповедник. Обычный вид, отмечена тенденция к увеличению численности и к расширению ареала в северном и восточном направлениях. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

356. Горихвостка-чернушка — *Phoenicurus ochruros* (S.G. Gmelin, 1774)

Размером немного меньше воробья. У самца в верхней части тела и на груди преобладают черные тона с более светлым пепельно-серым верхом головы и темно-серой спиной, брюшко рыжее. Характерно ярко-рыжее надхвостье и рыжий с темной полосой посередине хвост. Самки серовато-бурые, более монотонные по сравнению с самцами. Залет на южный Байкал в окрестности Култука и в Витимский заповедник. Молодые птицы похожи на самок. Зал.

Природоохранный статус: РИ, РКТ.

ООПТ: ВГЗ.

357. Красноспинная горихвостка — *Phoenicurus erythronotus* (Eversmann, 1841)

Мелкая горихвостка. У самца верх головы и шеи серый, лоб и широкая полоса от клюва через глаз к крылу черные, крылья бурые, широкая полоса на плечах и брюшке белые, спина, горло, грудь и хвост красновато-рыжие. Самка буровато-серая с беловатым брюшком и рыжим хвостом. Молодые — буро-серые со светлыми пятнами и рыжим хвостом. Населяет кустарниковые заросли у верхней границы леса на горных хребтах Восточного Саяна, Хамар-Дабана и Байкальского хребта. Известен залет в Витимский заповедник. На пролете встречается в районе Кругобайкальской железной дороги. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

358. Сибирская горихвостка — *Phoenicurus auroreus* (Pallas, 1776)

Похожа на обыкновенную горихвостку. У самца лоб, бока головы, спина и крылья черные, а верх головы и зашеек серые, хвост рыжий. У самки окраска буро-серая, светлая снизу. Молодые — темно-бурые со светлыми пестринами. У самца, самки и молодых на крыле белое пятно. Населяет таежные леса на большей части территории области, за исключением северных и северо-восточных районов. Обычный, местами многочисленный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

359. Краснобрюхая горихвостка — *Phoenicurus erythrogaster* (Guldenstadt, 1775)

Крупная горихвостка. Самцы окрашены очень ярко, в их оперении резко выражены три цвета: черный, ярко-рыжий и белый. Бóль-

шая часть спины, бока головы и шеи, горло, зоб и передняя часть груди черные. Крылья двухцветные — черные с большими белыми пятнами. Верх головы и зашеек белые. Надхвостье, хвост, брюшко и бока тела ярко-рыжие. Ноги и клюв черные. Самки и молодые — буровато-серые, светлые снизу и с ржаво-рыжим хвостом. У молодых на темном оперении светлые пестрины. Населяет альпийский и субальпийский пояс гор по россыпям и ущельям на горных хребтах на большей части горных районов области. На пролете отмечена на юге Иркутской области и в долине р. Куда. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

360. Сизая горихвостка — *Rhyacornis fuliginosus* (Vigors, 1841)

Оперение самца в основном голубоватого цвета. Оперение самки светло-серое. Брюхо и грудь белые с серыми пестринами. Хвост черный. Молодые птицы похожи на самок. Места обитания — быстрые горные потоки воды, водопады и подножия гор на высоте до 2 400 м над уровнем моря. Отмечен единичный залет в Байкало-Ленский заповедник. Зал.

ООПТ: ЗП.

361. Зарянка — *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше воробья, плотного сложения. Передняя часть головы и грудь однотонные кирпично-рыжие, верх буро-зеленоватый, брюхо белое. Молодые птицы пестрые. Держится на земле или у земли. Отмечен залет в долину р. Китой в Ангарском районе и в окрестности г. Усолье-Сибирское в XIX в. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

362. Обыкновенный соловей — *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758)

Размером немного крупнее воробья. Верх однотонный оливково-коричневый, низ светлый, на груди пестрины. Голова большая с крупными темными глазами. Надхвостье и длинный хвост рыжеватого цвета. Молодые темнее взрослых, со светлыми пестринами и однотонными крыльями и хвостом. Во второй половине XIX в. отмечен залет в г. Усолье-Сибирское. Зал.

363. Красношейка — *Luscinia calliope* (Pallas, 1776)

Размером с воробья. У самца верхняя сторона тела, крылья и хвост буровато-оливковые, от клюва к глазу и по бокам горла черные полоски, брюшко, бровь и полоски на боках шеи белые, грудь, бока тела и шеи серые, горло блестяще-красное. У самок горло белое, а окраска более тусклая. Молодые птицы буро-серые со светлыми и темными пестри-

нами. Населяет различные типы лесов на большей части территории области и ерниковые заросли в высокогорьях. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

364. Варакушка — *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья. Сверху однотонные буро-коричневые, низ белый, на голове белая бровь. Хвост ярко-рыжий с темной полосой по краю. У самца горло синее, отороченное черной и рыжей полосами, посреди горла красное пятно. У самки горло белое, окаймленное воротничком из черных пестрин. Молодые — темно-бурые со светлыми пестринами, хвост с рыжими пятнами. Населяет пойменные биотопы, заросли кустарников по берегам рек, озер и в окрестностях водоемов, в том числе и искусственных, распространение в области спорадическое. Редкий вид, на локальных участках обычный. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЭД.

365. Синий соловей — *Luscinia cyane* (Pallas, 1776)

Небольшой соловей с темно-синей спиной и белым брюхом, через глаз проходит черная полоса. Спинная сторона самки буроватая с синим оттенком, хвост и надхвостье синие. Молодые сверху черно-бурые с охристыми пестринами, снизу буроватые. Населяет кустарниковые заросли в пойменных биотопах, долинах таежных ручьев на большей части территории области. Ведет скрытый образ жизни. В характерных местообитаниях обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

366. Соловей-свистун — *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863)

Небольшой соловей, оливково-бурый сверху, с белым брюхом, бурым чешуйчатым рисунком на груди и боках и неясной светлой бровью. Населяет сырую низинную тайгу и пойменные леса с густым подлеском на большей части территории области. Ведет скрытый образ жизни. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

367. Синехвостка — *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)

Небольшая птичка размером с воробья. У старых самцов верх головы, спина, надхвостье и хвост ярко-синие с буроватым налетом,

крылья буроватые, бровь, горло и брюшко белые, бока рыжеватые. Самка и молодые сверху буро-серые, надхвостье и хвост синеватые, остальное оперение как у самца, но тусклее. Населяет леса на большей части территории области, при этом предпочитает высокоствольные смешанные и хвойные леса с буреломом, на пролете может встречаться в несвойственных биотопах. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

368. Бледный дрозд — *Turdus pallidus* (J.F. Gmelin, 1789)

Мелкий дрозд. Спина, голова, крылья и хвост темные, пепельно-серые, горло белое с охристым оттенком, бока и грудь с рыжеватым оттенком, брюшко белое. Самка отличается большим развитием пестрин на брюшной стороне. Отмечены единичные залеты на Олхинское плато, в Байкало-Ленский заповедник и в окрестности Листвянки. Зал.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

369. Сизый дрозд — *Turdus hortulorum* (Sclater, 1863)

Размером с певчего дрозда. У самца голова, зоб, верх груди, верх тела и крыльев сизо-серые, низ груди и бока ярко-рыжие, брюшко и подхвостье белые. Годовалые самцы бледнее, у них беловатые горло и зоб с темными пестринами. Самка окрашена примерно как годовалый самец, еще менее ярко. Молодые в гнездовом наряде пестры, похожи на молодых певчих дроздов, но с рыжиной на боках. Отмечен залет в окрестности Листвянки. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

370. Оливковый дрозд — *Turdus obscurus* (J.F. Gmelin, 1789)

Мелкий дрозд с тусклым оперением, взрослые без пестрин. Верх оливково-бурый, слегка рыжеватый, низ сероватый, передняя часть груди и бока желтовато-рыжие. Над глазом белая бровь. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает смешанные вторичные и пойменные леса. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

371. Краснозобый дрозд — *Turdus ruficollis* (Pallas, 1776)

Крупный дрозд. Верх тела буровато-серый, низ светлый. У самца горло и грудь рыжего цвета. У самки и молодых много рыжих пестрин

на груди. Важные отличительные признаки во всех нарядах — отчетливый рыжий цвет крайних рулевых. Испод крыла всегда рыжий. Населяет светлые хвойные, реже лиственные леса, субальпийское редколесье в горах северной и северо-восточной части территории области и леса на горных хребтах на севере Байкала, предпочитает лиственничные леса. В незначительном количестве остается на зимовку в Южном Предбайкалье. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС.

372. Чернозобый дрозд — *Turdus atrogularis* (Jarocki, 1819)

Внешне похож на краснозобого дрозда, отличается только черным цветом горла и груди и отсутствием рыжего цвета на хвосте. Населяет западную часть области на восток до Братска, отмечен в долинах рек Катанга и Нижняя Тунгуска и в долине Киренги. На юге области и в Витимском заповеднике встречается на пролете. В незначительном количестве на юге области остается на зимовку. Относительно редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

373. Дрозд Науманна — *Turdus naumanni* (Temminck, 1820)

Дрозд среднего размера. Спина, крылья и хвост серовато-бурые. Горло, щеки, зоб, бока и подхвостье ржаво-рыжие с беловатыми поперечными пестринами, брюшко белое. Над глазом беловато-охристая бровь. Самки светлее и менее ярко окрашены, молодые на спине с черноватыми пятнами и рыжеватыми пестринами, снизу рыжеватые с черными пестринами. Пролетный вид, возможно спорадическое гнездование на севере области. В незначительном количестве на юге области остается на зимовку. На пролете обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ОЗ, ТР.

374. Бурый дрозд — *Turdus eunomus* (Temminck, 1831)

Небольшой дрозд. У самца окраска верха головы и спины темно-бурая с рыжеватыми каемками на перьях, более яркими в свежем, осеннем наряде. На груди и боках темно-бурые пестрины, на щеке, ухе и за глазом большое темное пятно. Верх крыла ржавчато-рыжий. Бока не рыжие. Самка похожа на самца, но бурый цвет бледнее, брюшная сторона более светлая, на груди, боках и хвосте есть рыжий цвет, испод крыла ржавчато-рыжий. Возможно, гнездится в верховьях р. Нижняя Тунгуска. Отмечен на пролете на западном побережье Байкала и в Верхнем Приангарье. Редкий вид. Пр.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

375. Рябинник — *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)

Крупный дрозд пестрой окраски. Верх тела трехцветный: голова и надхвостье серые, спина рыжевато-коричневая, крылья и хвост черные. Горло и грудь рыжеватые с черными пестринами, брюхо белое, подкрылья белые. У молодых светлые штрихи на спине. Населяет преимущественно пойменные биотопы лесной и лесостепной зон. Селится, как правило, колониями от нескольких десятков до нескольких сотен особей. В небольшом количестве на юге области остается на зимовку. По годам вид характеризуется от редкого до многочисленного. Гн.

Природоохранный статус: РА, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

376. Белобровик — *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766)

Мелкий дрозд размером со скворца. Верх буро-коричневый, низ беловатый с крупными буро-коричневыми пестринами. Характерны заметная белая бровь и рыжие бока и испод крыла. У молодых птиц пестрая спина и неяркие подкрылья. Корм собирает на земле. Населяет леса на Южном Байкале и в Катангском и Бодайбинском районах. На пролете отмечен на побережье Байкала и в Верхнем Приангарье. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЧС.

377. Певчий дрозд — *Turdus philomelos* (C.L. Brehm, 1831)

Размером немного крупнее скворца. Верх однотонный буровато-коричневый, низ беловатый с бурыми каплевидными пестринами, подкрылья и бока желтые. Молодые снизу желтоватые с пестринами на спине. Населяет леса различных типов в лесной и лесостепной зонах в Прибайкалье на восток до Байкала, избегает сплошных лесных массивов. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

378. Деряба — *Turdus viscivorus* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный из дроздов, заметно крупнее скворца. Верхняя часть тела однотонная бурая с сероватым оттенком. На нижней стороне тела крупные каплевидные пестрины. Подкрылья белые. У моло-

дых пестрый верх тела. Населяет высокоствольные, преимущественно хвойные леса в западных и южных районах области, проникая на восток до среднего Байкала, отмечен залет в Витимский заповедник. Гнездование спорадическое. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, МГ.

379. Сибирский дрозд — *Zoothera sibirica* (Pallas, 1776)

Среднего размера дрозд, черно-сизый с яркой широкой белой бровью и белым брюшком. Самка и молодые сверху оливково-бурые, снизу белые с широкими поперечными бурыми пестринами. Очень осторожен. Населяет сырые приречные ельники с густым подлеском, в горах центральных и южных районов области — березняки. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

380. Пестрый дрозд — *Zoothera varia* (Pallas, 1811)

Крупный дрозд плотного сложения с коротким хвостом. Верх тела золотисто-оливковый с широкими черными поперечные пестринами. Низ белый с черно-бурыми пятнами, по бокам хвоста белые полоски. Держится в основном на земле, по которой бегает, подергивая хвостом, но не прыгает. Осторожен. Населяет лесную зону в центральных и южных районах области, предпочитает темнохвойные пойменные леса, спорадически по темнохвойным лесам проникает на север до средней части Катангского района. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

381. Усатая синица — *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758)

Мелкая длиннохвостая птичка характерной внешности рыжевато-охристой окраски. У самца светло-серая голова с хорошо заметными черными «усами», которые у самок и молодых отсутствуют. У молодых птиц бурая голова и черное пятно на голове. Голос — звенящее «чвинь» или «дзье-е-дзье-е». Обитатель густых тростниковых зарослей. Периодически гнездится на территории водно-болотного комплекса в пойме Иркута и в Сушинском Калтусе в окрестностях Ангарска. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ПГ.

382. Ополовник — *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)

Маленькая, размером меньше воробья, почти шарообразная птица с коротким утолщенным клювиком и длинным ступенчатым хвостом. Взрослые с белой головой и низом, с черно-розовато-коричневыми крыльями и верхом, черным с белыми крайними рулевыми хвостом. У молодых темноватая полоса через глаз, на груди буровато-серый налет. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает пойменные биотопы. Во внегнездовое время совершает кочевки, часто в составе синичьих стай. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

383. Венценосный ремез — *Remiz coronatus* (Severtzov, 1873)

Размером заметно меньше воробья, с коротким острым клювиком. Голова серая, спина каштановая, горло светлое, грудь охристая. У взрослых птиц через глаз идет характерная черная полоса, самка бледнее самца. У молодых черная полоса отсутствует, голова бурая, окраска верха и крыльев бледнее. Характерное гнездо в форме рукавички. Спорадическое гнездование в долине Оки и в устье Иркута. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт, Пр. 2 Ирк.

ООПТ: ПГ.

384. Черноголовая гаичка — *Parus palustris* (Linnaeus, 1758)

Мелкая синица, внешне похожа на пухляка. Отличается более аккуратной, почти не заходящей на затылок блестящей черной шапочкой и отсутствием светлого поля на сложенном крыле. Молодые тусклее, шапочка и горло бурые. Населяет лесную, за исключением севера и северо-востока области, и лесостепную зону, предпочитая пойменные леса. Распространена спорадически, во время внегнездового периода совершает кочевки, часто в составе синичьих стай. Редкий вид, на локальных участках может быть обычным видом. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ПГ.

385. Пухляк — *Parus montanus* (Baldenstein, 1827)

Относительно крупноголовая птичка размером меньше воробья с коротким острым клювом и укороченным хвостом. На серо-белом фоне щек и груди выделяются черные шапочка и подбородок. У молодых шапочка бурая. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, отдает предпочтение сосновым и смешанным лесам. Во время внегнездового периода совершает кочевки, часто в составе синичьих стай, составляя их основу. Являет-

ся одним из наиболее обычных лесных видов, местами относится к многочисленным видам. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

386. Сероголовая гаичка — *Parus cinctus* (Boddaert, 1783)

Внешне похожа на пухляка, но немного крупнее. Верх серовато-бурый, шапочка серовато-бурая с рыжеватым оттенком. Под клювом черно-бурое пятно, щеки и низ тела грязно-белые с рыжеватым налетом на боках. Несколько менее подвижна, чем другие гаички. Населяет горные темнохвойные леса южной части области и долину Нижней Тунгуски. Во время сезонных кочевок встречается на равнинных участках, в том числе и в населенных пунктах. Редкий вид. Ос.

ООПТ: ЗП.

387. Московка — *Parus ater* (Linnaeus, 1758)

Маленькая относительно большеголовая синица. Окраска контрастная без желтого цвета, на черном фоне шапочки и галстука выделяются белые щеки, на черном затылке — белое пятно. Низ тела светлый с охристыми боками. У молодых черный цвет с буроватым, а светлый — с желтоватым оттенком. Населяет лесную зону на большей части области, предпочитает хвойные, преимущественно елово-пихтовые, реже смешанные леса. Во время внегнездового периода совершает кочевки, часто в составе синичьих стай. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

388. Лазоревка — *Parus caeruleus* (Linnaeus, 1758)

Мелкая синица величиной с гаичку. Отличается желто-зелено-синей окраской и рисунком на голове. Крылья, хвост, зашеек и шапочка на голове голубые, брюхо желтое, щеки белые, подбородок и полоса через глаз черные. Молодые — тусклые зеленовато-серые без голубого цвета. Отмечен единичный залет в Черемховский район. Зал.

389. Князек — *Parus cyanus* (Pallas, 1790)

Размером немного меньше большой синицы. Спина серо-голубоватая, крылья, хвост и полоска от клюва к глазу голубые, полосы по бокам хвоста и на плечах, брюшко и шапочка грязновато-белые, грудь белая. Хвост довольно длинный. Молодые птицы более тусклые, голубой цвет в оперении заменен на сероватый и черноватый, шапочка на темени серая. Очень скрытная птичка. Населяет поймен-

ные кустарниковые биотопы в южной части области, распространение спорадическое, известен залет в Витимский заповедник. Во время внегнездового периода совершает кочевки, иногда в составе синичьих стай. Редкий вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, МГ, ПГ.

390. Большая синица — *Parus major* (Linnaeus, 1758)

Крупная синица размером с воробья. Отличается яркой желто-синей с черным окраской. У взрослой птицы черная шапочка, желтое брюшко и белые щеки. На груди и животе черная полоса, широкая у самца и узкая у самки. Молодые — тусклые, щеки и брюхо желтоватого цвета, черное заменено серым. Населяет преимущественно пойменные биотопы в лесной и лесостепной зонах и населенные пункты на большей части территории области. В зимнее время совершает кочевки в населенные пункты, в том числе и в города. Часто входит в состав синичьих стай. Обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

381. Обыкновенный поползень — *Sitta europaea* (Linnaeus, 1758)

Птица размером с воробья, лапы короткие, пальцы и когти крупные, клюв удлинен. Верх тела серо-голубоватый, низ светлый, на голове через глаз проходит черная полоса. У самок рыжевато-охристый цвет под хвостом и на боках, у самцов он коричневый и не выходит на бока. Лазает (ползает) по ветвям и стволам деревьев, часто головой вниз. Собирает насекомых в трещинах коры и небольших укрытиях. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области, за исключением северной части Катангского района, зимой посещает населенные пункты. Часто входит в состав синичьих стай. Обычный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

392. Якутский поползень — *Sitta arctica* (Buturlin, 1907)

Похож на обыкновенного поползня, но крупнее размером, с белым лбом и более короткой глазной линией. В хвостовом оперении и на крыльях есть больше белых отметин. Обитает на севере Катангского района. Ос.

393. Обыкновенная пищуха — *Certhia familiaris* (Linnaeus, 1758)

Пестрая бежево-белесая птичка мельче воробья с длинным изогнутым клювиком и короткими лапками с длинными пальцами и когтями. Светлый низ и рябой верх маскируют пищуху на коре, по которой она передвигается только сверху вниз обычно по спирали.

Малозаметна и молчалива. Населяет преимущественно темнохвойные пойменные леса на большей части территории области. Редкий вид, распространение спорадическое. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

394. Домовой воробей — *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

Самец с серой шапочкой, окаймленной шоколадной полоской, черным пятном на горле, светлыми щеками и сероватым низом. Верх коричневый с V-образными рядами темных пестрин, надхвостье буровато-серое без пестрин, хвост бурый, на сложенном крыле заметна белая полоса. Осенью менее контрастен. Самка буровато-охристая с однотонной головой, более темной шапочкой и неяркой охристой бровью. Молодые похожи на самок, сразу после вылета — с желтыми углами рта. Обитает в населенных пунктах на большей части территории области, за исключением северных и северо-восточных районов. Обычный, местами многочисленный вид. Ос.

Природоохранный статус: РИ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

395. Полевой воробей — *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше домового воробья. Отличается коричневой шапочкой, узким белым ошейником, черными пятнами на белых щеках и маленьким черным пятном на горле. На крыле две светлые полоски. Самцы и самки сходны. Молодые тусклее взрослых, черный цвет заменен на буровато-серый. Обитает в населенных пунктах на большей части территории области, за исключением крайнего севера и северо-востока. В южной части области обитает в природных биотопах, во время внегнездового периода совершает кочевки. Обычный, местами многочисленный вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, МГ, ПГ, ТК.

396. Снежный воробей — *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766)

Размером немного крупнее воробья. Серовато-бурая сверху и белая снизу птица с черно-белыми крыльями, в полете кажется белой с черными пятнами. Горло у взрослых самцов черное. От пуночки отличается серой головой и довольно длинным хвостом, белым с черной продольной полосой. Клюв летом черный, зимой желтый. Отмечен единичный залет на Малое Море в долине р. Сарма. По опросным данным, обитает на Хамар-Дабане. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

397. Зяблик — *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья, но более изящного сложения. У самца довольно яркая раскраска — каштановый верх тела, серовато-голубой верх головы, зеленое надхвостье, красноватый низ тела, на крыльях две белые полосы, на хвосте крайние рулевые белые. В осеннем пере яркие тона приглушены. Самка буровато-серая с охристой грудью, молодые похожи на самку. Населяет лесную и лесостепную зоны на восток до Байкала, известны залеты на восток до Витимского заповедника. Отмечена тенденция к расширению ареала на восток и север. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ПГ.

398. Юрок — *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья. У самца черная голова, спина и хвост, рыжие горло и грудь, белое пятно на пояснице, темные пестрины на боках, голубовато-блестящий клюв. У самок рыжая грудь, темные пестрины на боках и по сторонам затылка, молодые похожи на самок. Населяет таежные леса на большей части территории области, наиболее обычен в хвойных и смешанных лесах. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

399. Обыкновенная зеленушка — *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758)

Птица плотного сложения размером с воробья с толстым розоватым клювом и характерной желто-зеленой окраской. Сверху оливково-зеленая, на животе, боках и пояснице желтовато-зеленая. На боках хвоста и на крыльях желтые пятна. Самка окрашена тусклее, верх тела бурый с размытыми пестринами, брюхо серое, молодые бледнее с размытыми серыми пестринами. Встречается вдоль Транссибирской магистрали до Иркутска, отмечена в Верхнем Приангарье в долинах рек Куда и Ида. Гнездование отмечено в окрестностях Листвянки. Отмечена тенденция к расширению ареала и увеличению численности, редкий вид. Гн. Зим.

ООПТ: ЗП.

400. Китайская зеленушка — *Chloris sinica* (Linnaeus, 1766)

Похожа на обыкновенную зеленушку. Спина, крылья, а также грудь и бока коричневого цвета. Голова серая. Лоб, щеки и надхвостье желтовато-зеленые. На крыльях имеется широкая желтая полоска и белые конечные кромки. Характерен половой диморфизм. В целом самки окрашены несколько более тускло, голова и надхвостье

коричневого, а нижняя сторона песочного цвета. Нижние хвостовые перья белесого цвета. Молодые птицы еще более тусклые и бурые с многочисленными пестринами. Залет в г. Бодайбо. Зал.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

401. Чиж — *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758)

Птица плотного сложения размером с воробья с толстым розоватым клювом и характерной желто-зеленой окраской. Сверху оливково-зеленая, на животе, боках и пояснице желтовато-зеленая. На боках хвоста и на крыльях желтые пятна. Самка окрашена тусклее, верх тела бурый с размытыми пестринами, брюхо серое, молодые беднее с размытыми серыми пестринами. Населяет хвойные, преимущественно еловые леса в лесной зоне в центральной и южной частях области. Численность и область распространения меняется по годам. Во внегнездовое время совершает кочевки. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК.

402. Щегол — *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше воробья. Спина коричневая, верх головы, крылья и хвост черные, на крылья широкая желтая полоса. Вокруг клюва широкая красная полоса, щеки, низ тела и надхвостье белые. Клюв светлый, удлиненный. Молодые птицы без черного, красного и белого цвета на голове, оперение с сернисто-желтоватым оттенком и продольными темными пестринами. Обитает на юге в лесной и лесостепной зонах. Населяет древесные насаждения культурного ландшафта, заросли кустарников, разреженные леса, вырубки, пойменные леса. Отмечена тенденция к росту численности и расширению ареала. Во внегнездовое время совершает кочевки. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РИ.

ООПТ: ЗП, ИГ, ПГ.

403. Седоголовый щегол — *Carduelis caniseps* (Vigors, 1831)

Похож на черноголового щегла. В отличие от него верх тела и грудь светло-серые, а на голове и темени нет черного цвета. Молодые птицы без красной маски, с мелкими пестринами на спине и груди. Населяет заросли кустарников, разреженные леса, вырубки, пойменные леса на юге лесной и лесостепной зон. Встречается спорадически. Отмечена тенденция к росту численности и расширению ареала. Во внегнездовое время совершает кочевки. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

404. Коноплянка — *Acanthis cannabina* (Linnaeus, 1758)

Размером немного меньше воробья. Верх коричневый, голова и надхвостье серые, бока охристые, низ светлый. У самца весной и летом розово-красные лоб и бока груди, осенью на груди бурые пестрины. Самки и молодые птицы более тусклые, бурые с темными пестринами на спине, боках и груди. Хвост вилочкой, клюв короткий. Периодически встречается вдоль Транссибирской магистрали от западных границ до Байкала, гнездование установлено в окрестностях Иркутска и Усолья-Сибирского. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РКт.

405. Обыкновенная чечетка — *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758)

Размером значительно меньше воробья. Окраска сероватая, низ светлый, шапочка, верх тела и бока с рядами темных пестрин, надхвостье у самца розоватое, у самки буровато-серое с пестринами. Клюв короткий острый, вокруг клюва черное обрамление. На лбу красно-малиновое пятно. У самцов грудь и щеки розовые или красные. На крыле две белые полоски. Молодые без красного, с большим количеством пестрин. Спорадическое гнездование отдельных пар на юг до Байкала. Зимой и во время пролета встречается на большей части территории области, в том числе и в населенных пунктах. На гнездовании редкий вид. Численность в зимнее время сильно меняется по годам от небольшой до значительной. Гн.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

406. Пепельная чечетка — *Acanthis hornemanni* (Holboell, 1843)

Размером меньше воробья. Похожа на обыкновенную чечетку, но гораздо светлее, в полете кажется белой. Надхвостье белое или светло-розовое без пестрин. Небольшое количество пестрин имеется по бокам тела. Горло, грудь и зоб у самцов нежно-розовые, у самок белые. На лбу красное пятно. Зимующий вид на большей части территории области. Часто встречается в совместных стаях с обыкновенной чечеткой. Имеется информация о гнездовании в высокогорье хребта Хамар-Дабан. Редкий вид, численность меняется по годам. Гн.? Зим.

Природоохранный статус: РА, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, МГ, ТК.

407. Гималайский вьюрок — *Leucosticte nemoricola* (Hodgson, 1836)

Немного крупнее воробья. Буровато-серая птица с широкими продольными пестринами на спине; на крыле неясные светлые поло-

ски. У молодых рыжеватая голова. Населяет каменистые склоны гор с зарослями кустарников и лужайками в субальпийском и альпийском поясах в высокогорье хребта Хамар-Дабан и, возможно, Восточного Саяна. Отмечены залеты на средний Байкал в падь Крестовскую и на Малое Море (зимой) и в Байкало-Ленский заповедник (летом). Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

408. Сибирский горный вьюрок — *Leucosticte arctoa* (Pallas, 1811)

Размером с воробья. Окраска буро-коричневая, на крыльях, надхвостье и брюхе участки малиново-розового цвета. Верх головы серый или охристо-серый. Крылья и хвост серовато-белые. Самка бледнее самца. Гнездятся группами, держатся стайками. Населяет верхнюю часть альпийского пояса гор, подножья ледников, каменистые осыпи и скалы, перемежающиеся с участками альпийских лугов в высокогорьях горных хребтов на большей части территории области. В зимнее время при кочевках может встречаться на побережье Байкала, отмечены залеты в Верхнее Приангарье. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

409. Обыкновенная чечевица — *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)

Размерами и сложением сходна с воробьем, клюв буроватый, крупный, вздутый. У старого самца голова, грудь и надхвостье красно-малиновые; низ светлый; бурые спина, крылья и хвост с красноватым налетом. Самка серо-бурая с продольными рядами темных пестрин. Молодые и самцы-первогодки похожи на самку. Населяет лесные и лесостепные районы на большей части территории области за исключением высокогорий и степей, предпочитает заросли кустарника по опушкам леса, в поймах рек, на влажных лугах, сады, рощи. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

410. Сибирская чечевица — *Carpodacus roseus* (Pallas, 1776)

Самая мелкая чечевица (с воробья). Самец малиново-розового оттенка, спина бурая с темными пестринами, крылья и хвост черно-бурые, брюхо и широкие полосы на плечах белые, голова и горло серебристо-белые. Самка и молодые — красновато-серые с продоль-

ными пестринами. Населяет верхнюю границу высокогорной тайги, преимущественно высокоствольные кедровники и субальпийские луга, перемежающиеся с отдельными лиственничниками. Во внегнездовой период совершает кочевки, во время которых может посещать населенные пункты. Редкий вид. Ос.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК.

411. Большая чечевица — *Carpodacus rubicilla* (Guldentadt, 1775)

Птица размером со скворца, у самца спина красно-серая, хвост и крылья бурые, остальное оперение малиново-красное в белых точках. Самка и молодые птицы серые с темно-бурыми пестринами. В зимнее время регулярно встречается на Южном Байкале. Возможно гнездование на Хамар-Дабане. Редкий вид. Зим.

ООПТ: ЗП.

412. Урагус — *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773)

Птичка меньше воробья. Клюв короткий, вздутый, хвост длинный. У самца верх серый и красновато-бурый с продольными темными пестринами, хвост и крылья черные, брюхо, полосы на крыльях и по бокам хвоста белые, на голове и горле серебристые перья, остальное — малиново-розовое. Самка и молодые — серые с продольными темными пестринами на спине и груди. Населяет кустарниковые заросли речных долин, болот и лесистые склоны предгорий в западной и южной частях области за исключением высокогорных районов. Залет в Витимский заповедник. Редкий, на локальных участках обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЭД.

413. Щур — *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)

Крупная коренастая птица размером со скворца. Хвост относительно длинный, клюв короткий и мощный. Самцы красные, самки желто-оливковые, наиболее ярко окрашены голова и грудь. Крылья и хвост бурые, подхвостье серое. Молодые — серые с желтоватым налетом, в первую осень зеленовато-желтые, самцы с оранжевым оттенком. На крыльях две узкие светлые полосы. Населяет темнохвойные и горные леса на севере области и в горах вокруг Байкала. В зимнее время совершает кочевки, в том числе и в населенные пункты. Редкий вид. Численность зимующих птиц меняется по годам и зависит от состояния кормовой базы. Ос.

Природоохранный статус: РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

414. Клест-еловик — *Loxia curvirostra* (Linnaeus, 1758)

Большеголовая плотного сложения птица размером крупнее воробья. Характерным признаком клестов является мощный клюв, концы которого перекрещиваются. Окраска самца от малиново-красной до красно-оранжевой, крылья и хвост бурые. Самка зеленовато-серая. Молодые птицы оливково-бурые с многочисленными пестринами. Полет быстрый, волнообразный. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает хвойные, смешанные и горные елово-пихтовые леса, реже лиственные. Во время внегнездового периода совершает кочевки. Численность зависит от состояния кормовой базы и сильно меняется по годам. Ос.

Природоохранный статус: РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

415. Белокрылый клест — *Loxia leucoptera* (J.F. Gmelin, 1789)

Внешне похож на клеста-еловика, но отличается менее мощным клювом и двумя белыми полосами на крыльях. Населяет лесную зону на большей части территории области, предпочитает хвойные леса таежного типа, преимущественно еловые и лиственничные. Во время внегнездового периода совершает кочевки. Численность зависит от состояния кормовой базы и сильно меняется по годам. Ос.

Природоохранный статус: РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

416. Обыкновенный снегирь — *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)

Немного крупнее воробья, плотного телосложения. У самца ярко-розовая грудь, голубовато-серая спина и черная шапочка. В полете заметны белые полосы на крыльях и белое надхвостье. У самки розовый цвет замещен розовато-бурым, молодые похожи на самок. Полет быстрый, волнообразный. Населяет лесную зону на большей части территории области. Во время внегнездового периода совершает кочевки. В зимнее время встречается в населенных пунктах. Обычный вид. Ос.

Природоохранный статус: РА, РК, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

417. Серый снегирь — *Pyrrhula cineracea* (Cabanis, 1872)

Похож на обыкновенного снегиря, но у самцов грудь, горло и бока головы серые, а спина — чисто-серая, полоса на крыле светло-серая. Населяет темнохвойную, преимущественно горную тайгу в южных и центральных районах области, предпочитает темнохвойные пойменные леса. Во время внегнездового периода совершает кочевки. Редкий вид. Ос.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

418. Обыкновенный дубонос — *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

Размером со скворца. Коренастая большеголовая птица с коротким хвостом. Клюв толстый, массивный. Взрослый самец окрашен довольно ярко, характерны коричнево-охристая голова и каштановая спина, крылья черные с белыми полосами, белое подхвостье и серая задняя часть шеи. Самки окрашены тусклее. У молодых птиц пестрины на шее. Населяет лесную и лесостепную зоны юго-западной и южной части области и Витимский заповедник, залеты в Байкало-Ленский заповедник. Во время внегнездового периода совершает кочевки. В зимнее время встречается в населенных пунктах. Численность зависит от состояния кормовой базы и сильно меняется по годам. Ос.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, МГ.

419. Обыкновенная овсянка — *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья, но с более длинным хвостом с узкими белыми полосками по краям. У взрослых птиц голова и низ тела желтые, спина коричневая с продольными темными пестринами, поясница и надхвостье каштаново-рыжие. У самца горло, щеки, шапочка и центр брюха ярко-желтые, у самок и самцов-первогодков желтый цвет блеклый с буроватым оттенком, молодые птицы буровато-оливковые, практически без желтого оттенка. Клюв конический. Кормятся на земле, передвигаясь небольшими прыжками. Населяет лесную и лесостепную зоны в западной, центральной и южной частях области. Залет в Витимский заповедник. Предпочитает разреженные леса, лесные опушки и поляны, окраины садов, горные степи с кустарниками и бурьяном. Отмечена тенденция к расширению ареала и увеличению численности. Часть птиц остается на зимовку в окрестностях населенных пунктов в лесостепной зоне. Обычный вид. Гн. Зим.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК.

420. Белошапочная овсянка — *Emberiza leucochephala* (S.G. Gmelin, 1771)

Крупная овсянка. У самца спина, грудь и бока головы коричневые, хвост, крылья и пестрины на боках бурые, горло, верх головы и брюшко белые. Самка и молодые окрашены более тускло. Клюв конический. Кормятся на земле, передвигаясь небольшими прыжками. Населяет лесостепную и юг лесной зоны на территории области, предпочитает светлые, разреженные леса, преимущественно хвойные

и в меньшей степени смешанные, зарастающие молодыми соснами опушки, гари, старые вырубки. Отмечены случаи зимовок в южной части области и в лесостепи Верхнего Приангарья. Обычный вид, но в последние годы наметилась тенденция к снижению численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

421. Овсянка Годлевского — *Emberiza godlewskii* (Taczanowski, 1874)

Овсянка средних размеров. Для самца характерен продольно-полосатый рисунок на голове: над глазом светло-серая и каштановая полосы, от клюва через глаз, окаймляя щеки и кончаясь у клюва, еще каштановая полоса. Спина и низ рыжевато-коричневые, голова и зоб серые, крылья и хвост бурые. Самка и молодые более тусклые. Населяет каменистые сухие склоны гор, поросшие кустарником, в южной части области (на Кругобайкальской железной дороге) и, возможно, на Байкальском хребте (в Байкало-Ленском заповеднике). Во время кочевок встречаются в южной части области на север до Братского водохранилища и долины Киренги. Редкий вид.

Природоохранный статус: РКт, К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

422. Красноухая овсянка — *Emberiza cioides* (J.F. Brandt, 1843)

Крупная длиннохвостая овсянка. У самца шапочка, полоса от клюва через глаз, пятно за глазом, «усы» и широкая поперечная полоса на груди каштаново-рыжие, верх и бока коричневые, горло, бровь и низ белые, крылья, хвост и пестрины на спине бурые. Самка и молодые окрашены более тускло. Населяет степные и горно-степные участки в южной части области на север до верхней части Братского водохранилища (Балаганский район) и Байкало-Ленского заповедника. Предпочитает склоны, заросшие мелким кустарником. Распространена спорадически. Отмечены случаи зимовок в южной части области. Редкий, на локальных участках обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РКт, РЯ, Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ЗП, МГ.

423. Ошейниковая овсянка — *Emberiza fucata* (Pallas, 1776)

Размером примерно с воробья. Голова и шея серые с бурыми пятнами, спина коричневая с черными пестринами, горло, грудь и брюшко охристо-беловатые, поперек груди рыжая полоска и полоса из черных пятен. Крылья и хвост бурые. Клюв бурый, ноги светло-бу-

рые. Самки и молодые похожи на самца, только окрашены бледнее. Населяют открытый ландшафт. Отмечены периодические встречи в южной части области на север по побережью Байкала до Байкало-Ленского заповедника и верхней части Братского водохранилища (Нукутский район). Не исключена возможность спорадического гнездования. Редкий вид. Гн.? Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ЗП.

424. Садовая овсянка — *Emberiza hortulana* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья, относительно короткохвостая. Характерны розовый клюв, светло-желтое кольцо около глаза и желтые «усы». У самца оливково-серые голова и грудь, желтое горло и рыжее брюхо. У самки на них проступают продольные пестрины, серого цвета меньше и окраска более тусклая. Молодые с коричневой в пестринах головой и грудью, светлым горлом и бледным низом. Залет в долину Иркута в окрестностях Иркутска, в Иркутск и в Листвянку. Возможно обитание в Тайшетском районе. Зал.

Природоохранный статус: РКт.

ООПТ: ЗП.

425. Желтогорлая овсянка — *Cristemberiza elegans* (Temminck, 1836)

Единственная овсянка фауны России, у которой имеется хохолок. Окраска яркая и красивая. У самца верх головы, полоса через глаз и большое пятно на груди черные, бровь и горло ярко-желтые, крылья и хвост бурые, спина коричневая с темными пестринами, надхвостье серое, грудь, брюшко и полоски по бокам хвоста белые. У самок черный цвет заменен буровато-черным, а общая окраска оперения более тусклая. Населяет высокотравные луга и светлые лиственные леса. Отмечен залет в долину р. Тетея (приток Нижней Тунгуски в Катангском районе). Зал.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ.

426. Камышовая овсянка — *Schoeniclus schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

Размером примерно с воробья. У самца черные голова и горло, разделенные белой полосой, клюв черный. Самцы в осеннем пере, самки и молодые — буровато-пестрые со светлым низом, голова буроватая со светлыми бровями, темными «усами», на светлом горле темное ожерелье из пестрин. На крыльях рыжеватые участки, надхвостье серое. Встречается спорадически, гнездо-

вание установлено для долины Иркута и Ангары в г. Иркутске и Ангарского района, возможно, гнездится в Катангском районе. На пролете встречается на большей части территории области. Предпочитает тростниковые и камышовые болота. Редкий вид, численность гнездящихся на территории области птиц не превышает сотни пар. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, ЛО, ПГ.

427. Полярная овсянка — *Schoeniclus pallasi* (Cabanis, 1851)

Мелкая овсянка. Похожа на камышовую овсянку, но много мельче. У самца голова и горло черные, спина рыжевато-серая, крылья, хвост и пестрины на спине бурые, низ тела и полоски от клюва к зобу белые. У самки и молодых черного на голове нет (белой брови, как у самки камышовой овсянки, тоже нет), на груди тоже пестрины. Населяет ерниковые заросли на горных хребтах на севере Байкала. На пролете встречается на большей части территории области. Редкий вид. Гн.

Природоохранный статус: РА, РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ПГ.

428. Рыжешейная овсянка — *Schoeniclus yessoensis* (Swinhoe, 1874)

Размером с воробья. У самца голова и горло черные, спина черная с охристыми пестринами, верх шеи и надхвостье каштаново-рыжие, крылья и хвост бурые, грудь, брюшко и полоски по бокам хвоста белые. Самки и молодые птицы окрашены тусклее, и черный цвет у них заменен на бурый. Клюв черный, ноги красновато-бурые. Населяет болотистые пространства с зарослями травы и кустарников. Отмечен единичный залет в долину Ангары. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт, МСОП (NT).

429. Желтобровая овсянка — *Ocyris chrysophrys* (Pallas, 1776)

Крупная овсянка размером с воробья. Спина коричневатая с темными продольными пестринами, надхвостье рыжевато-бурое, крылья и хвост бурые, полоска по темени и весь низ белые, на груди продольные пестрины. Верх и бока головы у самца черные. Над глазом ярко выраженная желтая бровь. Самка и молодые — бледнее и тусклее. Населяет таежные, преимущественно пойменные темнохвойные леса на юг до Хамар-Дабана. Распространена спорадически. Редкий вид.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ИР, КЧ, ЛО, ОЗ, ТР, ТК, ЧС.

430. Таежная овсянка — *Ocyris tristrami* (Swinhoe, 1870)

Овсянка размером с воробья. Голова и горло черные, общая окраска тела охристо-рыжевато-бурая, на спине темные пестрины. Посреди головы сверху, над глазом и от угла клюва к зобу белые полоски. Молодые более тусклые с бурыми пестринами на груди. Обитатель елово-пихтовой тайги. Отмечены залеты в Катангский район и в окрестности пос. Усть-Балей в Иркутском районе. Зал.

Природоохранный статус: РК, РКт.

431. Овсянка-ремез — *Ocyris rustica* (Pallas, 1776)

Размером с обыкновенную овсянку или немного меньше. Спина буровато-пестрая, низ тела белый. У самца верх головы и щеки черные, горло и бровь белые, на груди каштаново-коричневое ожерелье, надхвостье ярко-каштановое. Самки и молодые — буровато-пестрые со светлым низом и каштановым надхвостьем. Пролетный вид на большей части территории области, возможно гнездование в Катангском районе. На гнездовании редкий вид, на пролете обычный, местами массовый вид, но в последние годы наметилась тенденция к сокращению численности. Гн.? Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ, К.к. России (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

432. Овсянка-крошка — *Ocyris pusilla* (Pallas, 1776)

Мелкая птица. Характерный признак — рыжая с черными полосками окраска головы, вокруг глаза тонкое белое кольцо. Надхвостье — буро-серое с черными пестринами. Самки и молодые окрашены тусклее, их оперение более охристое. Гнездится в северной части области в Катангском районе и спорадически на хребте Хамар-Дабан. Населяет заросли кустарников на болотах, берегах рек и ручьев и на опушках леса. Во время пролета встречается на большей части территории области. На гнездовании обычный вид, на пролете местами многочисленный, но в последние годы наметилась тенденция к сокращению численности. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ОЗ, ПГ, ТК, ЭД.

433. Седоголовая овсянка — *Ocyris spodocephala* (Pallas, 1776)

Мелкая овсянка. У самца голова, шея, зоб и грудь темно-серые, спина бурая с продольными темными пестринами, крылья и хвост бурые, низ белый, чуть желтоватый со слабыми охристо-бурыми пестринами на боках. У самки и молодых верх тела буровато-серый с темными пестринами, низ желтоватый с продольными бурыми пестринами.

Поющий самец сидит на вершине куста или в середине его. Населяет заросли кустарников на заливных лугах или по опушкам леса, вырубки на сырых местах, долины рек, поросшие кустарником, на большей части области. Обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ЭД.

434. Дубровник — *Ocyris aureola* (Pallas, 1773)

Размером немного меньше воробья. В брачном наряде у самца каштановый верх тела и головы, черная маска, желтые низ тела и шея и темная перевязь на шее, на крыле заметен белый клин. У самки верх тела буровато-пестрый, низ желтоватый, на голове светлые брови и пробор на темени. Молодые более охристые сверху и более желтые снизу, белый клин на крыле у́же. Населял кустарниковые, луговые и пойменные биотопы на большей части области. В прошлом обычный, местами многочисленный вид, но за последние годы произошло резкое сокращение численности, и на многих участках практически исчез. В настоящее время редкий вид, но в последние годы наметилась тенденция к восстановлению численности. Гн.

Природоохранный статус: РИ, РК, РКт, РЯ, МСОП (EN), К.к. России (2), Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ПГ, ТК, ЭД.

435. Рыжая овсянка — *Ocyris rutila* (Pallas, 1776)

Мелкая овсянка. У самца голова, горло и спина каштаново-рыжие, хвост и крылья бурые, грудь и брюшко бледно-зеленые. У самки и молодых верх головы, крылья, хвост и спина рыжевато-бурые, горло, грудь и брюшко желтовато-белые, на голове, груди и боках продольные бурые пестрины. Населяет участки сырой лиственничной тайги, разреженные высокоствольные лиственные леса и лесостепи центральной и южной частей области. Редкий, на отдельных участках обычный вид. Гн.

Природоохранный статус: РК, РКт.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК, ЭД.

436. Лапландский подорожник — *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758)

Размером с воробья. Самец в брачном наряде отличается характерным черно-белым рисунком головы, шеи и груди. Зашеек каштаново-рыжий. У самки в брачном наряде черный цвет заменен пестринами. В осеннее и зимнее время самец похож на самку в брачном

наряде, самка становится более охристой. У самцов и самок осенью крылья рыжие. Молодые похожи на самок. Пролетный вид, встречается на открытых ландшафтах. Отмечены единичные случаи зимовки. В прошлом на пролете многочисленный вид, в настоящее время произошло сокращение численности. Пр.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

437. Пуночка — *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)

Коренастая птица размером немного крупнее воробья. У взрослых птиц в оперении преобладают белые тона. Весной и летом самец чисто-белый, спина, центральная часть хвоста, концы крыльев и клюв черные, у самки черный цвет заменен темно-бурым, на груди и шапочке буроватый оттенок. Зимой и осенью белый цвет с сильным охристым оттенком, черный с ржавыми каемками, птицы выглядят рыжевато-бурыми. У молодых и самок меньше белого цвета. Пролетный и зимующий вид открытых ландшафтов области, более часто встречается в Приольхонье и в бассейне Верхней Лены. Обычный вид. Зим.

Природоохранный статус: РА, РИ, РК, РКт, РЯ.

ООПТ: ВГЗ, ЗП.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA

Отряд Насекомоядные — Eulipotyphla

1. Алтайский крот — *Talpa altaica* (Nikolsky, 1883)

Крупный крот. Длина тела 13,0–19,5 см, масса 70–225 г. Глаза открыты и снабжены подвижными веками. Мех довольно длинный и пушистый с шелковистым блеском. Окраска однотонная — от серой до черной с коричневыми оттенками; брюхо с матовым отливом. Встречаются белые, желтые и пятнистые особи. Тело массивное, округлое на относительно коротких ногах. Передние конечности приспособлены к роющей деятельности. Мордочка заканчивается хоботком. Ушные раковины отсутствуют. Обитает в западной, южной и центральной частях территории области до верховий Лены на восток и Катангского района на север. Отсутствует в северо-восточных районах. Населяет преимущественно пойменные луга, иногда сельскохозяйственные угодья. Встречается спорадически, численность невысокая. Практически не добывается, как объект охоты промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

2. Обыкновенная бурозубка — *Sorex araneus* (Linnaeus, 1758)

Относительно крупный зверек массивного телосложения с умеренно длинным хвостом. Длина тела с головой у сибирских зверьков 60–82 мм, длина хвоста 33–49 мм. Тело коренастое, морда удлиненная. Голова широкая в лобной области. Хоботок умеренной длины. В окраске меха выражена трехцветность, отчетливо заметная у перезимовавших зверьков. Верхняя сторона тела покрыта темно-бурым мехом, образующим хорошо ограниченный чепрак. Мех на боках окрашен светлее, с примесью рыжеватых или буровато-палевых оттенков. Мех брюшка светлой окраски — от сероватой до свинцово-серой. Зимний мех длиннее, пушистее и окрашен контрастней. Молодые зверьки бледнее. Обитает на большей части лесной и лесостепной зон на территории области. Населяет различные типы местообитаний — луговые и кустарниковые, горно-таежные леса всех высотных поясов,

горные тундры. Оптимальными являются долинные леса, заросли кустарников на зарастающих гарях и вторичные хвойно-мелколиственные леса. Обычный вид на юге области и более редкий на севере.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

3. Крупнозубая бурозубка — *Sorex daphaenodon* (Thomas, 1907)

Землеройка средних размеров. Длина тела с головой 48–70 мм, в среднем 60 мм; длина хвоста 26–39 мм; вес 4,5–10,7 г. Во внешнем облике характерен короткий тупой хоботок. Края ушей густо покрыты волосами. Характерны массивные темноокрашенные зубы со сглаженными вершинами. Окраска меха трехцветная. Между темной насыщенно-бурой спиной и более светлым брюшком примесь ржавых тонов, заметная у перезимовавших зверьков. Окраска меха спины темная — от коричнево-буро-серой до еще более темной землисто-бурой с кофейно-коричневым оттенком. Брюшная сторона темно-серая, светлее спины. Хвост коричневого цвета и только у корня снизу серого. Встречается в западном, центральном и южном районах области. При достаточно широком спектре местообитаний предпочтение отдает луговым и кустарниковым биотопам. Редкий, местами обычный вид.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

4. Тундряная бурозубка — *Sorex tundrensis* (Merriam, 1900)

Бурозубка средних размеров, более массивного, грубого телосложения, чем средняя бурозубка. Длина тела с головой 48–72 мм; длина хвоста 20–40 мм, вес 3–9 г. Широкая лобная часть головы без резкого сужения в области глаз переходит в широкий относительно короткий хоботок. Длина хвоста и окраска меха варьируют в широких пределах. В северных частях ареала окраска резко двухцветная, в южных приближается к однотонной. Отличаются по окраске перезимовавшие и молодые зверьки. Окраска чепрака летнего меха варьирует от бледной палево-ржавой до интенсивной кофейно-бурой. Чаще встречаются особи с темной окраской чепрака. Окраска боков и брюшной области меняется от белой до серебристо-серовато-белой. Хвост резко двухцветный: сверху темный в тон спины, снизу серовато-белый. Окраска чепрака варьирует от светло-буроватой с ржаво-палевыми оттенками разной интенсивности до блестяще-черно-бурой. Нижняя сторона окрашена в более светлые тона. На территории области обитает практически повсеместно. Встречается в самых различных биотопах — от луговых до горно-тундрового пояса, при этом оптимальными местообитаниями можно считать влажные луга и заросли кустарников. Обычный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

5. Средняя бурозубка — *Sorex caecutiens* (Laxmann, 1788)

Землеройка средних размеров. Длина тела с головой 51–70 мм, длина хвоста 29–44 мм; вес 3,5–10,7 г. Голова с заметным перехватом в области глаз и тонким длинным хоботком. Из внешних признаков следует отметить хорошо заметные, особенно на свежих и живых экземплярах, крупные уши, выступающие в стороны. Перезимовавшие самцы обладают особенно резким мускусным запахом. Средняя бурозубка окрашена не контрастно: коричневая с разными оттенками спина постепенно переходит в более светлые бока и серовато-белесое с примесью буроватых или рыжеватых тонов брюшко. Обитает на большей части территории лесной и лесостепной зон области. Населяет различные типы местообитаний — от луговых и лесостепных до альпийских и горно-тундровых, но оптимальными являются таежные местообитания, особенно нижние части долин горных рек. Обычный, местами многочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

6. Равнозубая бурозубка — *Sorex isodon* (Turov, 1924)

Крупная бурозубка. Длина тела с головой 60–90 мм, длина хвоста 39–50 мм. Вес 9,9–23,0 г. Во внешнем облике обращает на себя внимание очень темная, почти одинаковая на всем теле окраска меха. Верхняя сторона тела окрашена так же, как бока. Нижняя сторона сохраняет общий тон темно-бурой окраски и лишь немного светлее спины. Заметной границы перехода между окраской спины, боков и брюшка не улавливается. У молодых окраска бледнее, а различия в расцветке спины и брюшка резче. Хоботок на голове относительно короткий, притупленный. Голова без резкого сужения в области глаз. Хвост слабо-двухцветный в тон соответствующей окраски спины и брюшка, в поперечном сечении четырехугольный с овальными ребрами. Обитает в лесной зоне на большей части территории области, за исключением высокогорий и предгорий Восточного Саяна. Встречается в различных типах местообитаний — от лугово-болотных до подгольцовых зарослей кедрового стланика, предпочтение отдает долинам горных речек. Обычный, местами многочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

7. Плоскочерепная (бурая) бурозубка — *Sorex roboratus* (Hollister, 1913)

Длина тела с головой 54–86 мм; длина хвоста 30–50 мм. Вес 7–15 г. Хвост короткий и толстый длиной 35–43 мм. Хоботок длинный, толстый. Плоскочерепная бурозубка относится к числу видов, наиболее четко очерченных и легко распознаваемых среди других представителей рода. Окраска двухцветная, постепенно переходящая от светло-коричневой или темно-коричневой на спине через более светлую на боках к серовато-белой на брюшке. Хвост хорошо опушен, сверху темно-коричневый, снизу светло-коричневый или серо-буроватый. На территории области встречается практически повсеместно. Обитает в различных биотопах — от луговых до горно-тундрового пояса, наибольшей численности достигает на влажных лугах и в зарослях кустарников. Обычный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

8. Малая бурозубка — *Sorex minutus* (Linnaeus, 1766)

Мелкая, относящаяся к числу самых мелких землероек, сравнительно длиннохвостая бурозубка. Только крошечная бурозубка меньше ее. Длина тела с головой 40–64 мм; длина хвоста 31–42 мм; вес 2,4–5,0 г. Хоботок узкий и длинный, что особенно бросается в глаза при рассмотрении головы сбоку. Голова в области глаз имеет хорошо выраженное сужение. Хвост сильно опушен, покрыт длинными, снизу очень светлыми волосами; он резко утончен у основания и имеет хорошо заметную кисточку на конце. Окраска меха двухцветная: разных оттенков коричневого спина постепенно переходит в брюшко буровато-серого или серого цвета. Окраска хвоста двухцветная: верхняя сторона в тон окраски спины, нижняя соответствует брюшной стороне тела. Встречается на большей части территории области. Населяет различные типы местообитаний, наиболее оптимальными являются луговые и кустарниковые незаболоченные биотопы в долинах рек. Редкий вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

9. Крошечная бурозубка — *Sorex minutissimus* (Zimmermann, 1780)

Самая мелкая бурозубка с хорошими отличительными признаками. Размеры тела, хвоста и окраска меха колеблются в широких масштабах в зависимости от географической локализации. Длина тела с головой 30–53 мм; длина хвоста 17–33 мм; вес 1,4–4,5 г. Голова с укороченным широким хоботком. Окраска меха двухцветная: спина

коричневая разной интенсивности и локализации (у некоторых подвидов четко выражена в виде чепрака, у других постепенно переходит в светлое брюшко). Окраска хвоста сверху сходна с окраской верхней стороны тела, снизу серо-беловатая. Обитает на большей части территории области. Населяет различные типы местообитаний — таежные, луговые и кустарниковые. Избегает затапливаемых пойм рек, горных тундр и сухих степей. Наиболее оптимальные местообитания — коренные темнохвойные и лиственничные леса и мелколиственные леса с развитым травяным покровом. Обычный, местами редкий вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

10. Обыкновенная кутора — *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)

Размеры сравнительно крупные. Длина тела с головой 69–94 мм; длина хвоста 44–80 мм; длина ступни 17–21 мм; вес 8,0–26,2 г. Ноги далеко отставлены назад с удлиненными, слегка вывернутыми наружу ступнями. Глаза хорошо заметны в негустой шерсти, окружающей их. Плавательные оторочки из щетинистых волос на ступнях, киль из удлиненных волос вдоль нижней стороны хвоста и наличие клапанов, закрывающих слуховой проход при нырянии, являются характерными признаками приспособления куторы к жизни в воде. Мех густой, бархатистый. Окраска меха на спине колеблется от буро-черной до аспидно-черной. Брюшная сторона серебристо-белая, часто со слабым желтоватым или ржаво-палевым налетом. Граница между темной окраской спины и светлой брюшка резко выражена. Темная окраска спины образует резко очерченный чепрак. Молодые зверьки имеют более тусклый мех со значительной примесью серого цвета в окраске брюшка. Хвост одноцветный бурый или черно-бурый. Окраска кожи кистей и ступней бурая сверху и снизу. Волосы густо покрывают ступни и кисти сверху, плавательные оторочки из длинных щетинистых волос хорошо развиты. Населяет побережья небольших ручьев и речек, озер с чистой водой в лесной зоне на большей части территории области, хорошо плавает. Редкий, на локальных участках обычный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Рукокрылые — Chiroptera

11. Степная ночница — *Myotis davidii* (Peters, 1869)

Масса 4,5–7,0 г, длина тела 45–52 мм, длина хвоста 34–46 мм, длина предплечья 32–37 мм, размах крыльев около 20 см. Ухо средней

длины, сужающееся к концу, с небольшой вырезкой на заднем крае, целиком темное (кроме самого основания). Маска покрыта темными волосами. Ступня с когтями короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Эпиблема неразвита. Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Волосы с темными основаниями. Окрас спины от сероватого с желтым отливом до золотисто-рыжего, брюха — от светло-серого до чисто-белого. Крыловые перепонки — от темно-коричневого до почти черного цвета. Населяет различные, главным образом аридные, ландшафты от юга лесной зоны до полупустынь, обычно связана с открытыми местообитаниями, включая антропогенные. Убежища — щелевидные укрытия в постройках, скальные трещины и пещеры, а в пределах лесной зоны и дупла деревьев. Полет довольно быстрый, маневренный. Оседлая, зимует в различных подземных убежищах. Населяет Предсаянье, южное и северо-западное побережье Байкала. Редкий вид, встречается спорадически, известна по нескольким находкам.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

12. Ночница Иконникова — *Myotis ikonnikovi* (Ognev, 1912)

Мелкая темноокрашенная летучая мышь. Вершины волос на спине блестящие, золотисто-бурые, а основания черные. Брюхо белесо-серое с коричневым оттенком. Длина тела 37–43 мм, хвоста 30–42 мм, предплечья 30–33 мм, размах крыльев 19–22 см. Край кожистой перепонки прикрепляется к внешнему пальцу ступни. Эпиблемы нет. Уши большие, крылья широкие, тупые. Уши прикрыты специальными вкладышами — козелками. Козелок прямой, длинный, узкий, заостренный. Населяет горную тайгу. Строит гнезда в дуплах деревьев, трещинах скал. На территории Иркутской области убежища не известны. Держатся поодиночке, на кормежку вылетают в темноте. Полет медленный, слабый, без резких поворотов. Населяет Предсаянье, южную часть области, побережье Байкала и долину Лены (Качугский, Усть-Кутский и Жигаловский районы), встречается спорадически. Редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (4).

ООПТ: ЗП, ЗЛ, ИР, ЛО, КР, КЧ, ТК.

13. Сибирская ночница — *Myotis sibirica* (Kastschenko, 1905)

Масса 5,5–10,0 г, длина тела 38–55 мм, длина хвоста 31–45 мм, длина предплечья 33–39 мм, размах крыльев 19–24 см. Ухо средней длины, сужающееся к концу, с вырезкой на заднем крае. Маска покрыта темными волосами. Ступня с когтями примерно равна поло-

вине голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Эпиблема неразвита. Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Волосы с темными основаниями. Окрас спины от рыжевато- до темно-бурого, брюха — от серовато- до палево-белесого. Привязана к смешанным лесам, но по поймам рек проникает в тайгу и степь. Убежища — дупла деревьев, дуплянки, скальные щели, реже постройки. Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Полет плавный, неторопливый, маневренный. Оседла, зимует в различных подземных убежищах. Спаривание после окончания лактации или на зимовках. Населяет Предсаянье, южную часть области, побережье Байкала и долину Лены. Редкий вид, встречается спорадически.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ЗП, ТК.

14. Восточная ночница — *Myotis petax* (Hollister, 1912)

Мелкая сравнительно короткоухая летучая мышь, двухцветно окрашенная: нижняя часть тела — грязновато-белесая, а верхняя — серовато- или коричнево-бурая. Предплечье размером 35–41 мм. Наиболее распространенный вид летучих мышей в нашем регионе. Убежищами служат дупла деревьев и чердаки деревянных строений, самцы и самки обитают совместно. На охоту вылетают в поздних сумерках и на рассвете. Охотятся в основном у водоемов, над водой порхают на высоте от 5 до 50 см. Полет ровный и спокойный. Обитает на большей части территории области. Населяет побережья водоемов, селится в дуплах, каменистых осыпях, гротах, пещерах и в постройках человека. Наиболее обычный вид летучих мышей.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

15. Длиннохвостая ночница — *Myotis frater* (G. Allen, 1923)

Мелкая двухцветная летучая мышь. Предплечье 37–43 мм. Окраска верхней стороны тела варьирует от темной коричнево-бурой до палево-буроватой, нижняя сторона серо-белесая. Ухо короткое, довольно широкое, у основания его внутреннего края четко выраженная выемка. Наружный край крыловой перепонки прикрепляется к основанию внешнего пальца ступни. Имеется эпиблема, иногда слабо выраженная. Зимует в пещерах и скальных трещинах. Охотится, вероятно, в воздухе за различными некрупными насекомыми. Биология почти не изучена. Известны единичные находки в долине Ангары и в Тажеранской степи (пещера Мечта). Редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

16. Амурская ночница — *Myotis bombinus* (Thomas, 1905)

Масса 4,5–8,5 г, длина тела 40–50 мм, длина хвоста 36–47 мм, длина предплечья 36–42 мм, размах крыльев 24–31 см. Ухо длинное, узкое, морда длинная, маска голая, розоватая. Ступня с когтями равна примерно половине голени. Козелок (кожистый вырост в основании ушного отверстия) длинный, превышает половину высоты ушной раковины. Эпиблемы (кожный вырост на шпоре) нет. Крыло широкое, крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Задний край межбедренной перепонки усажен ресничками. Мех густой, длинный, неровный, волосы на спине буро-коричневые с более темными основаниями, на брюхе — палево-белесые. Летом и на зимовках найдена в пещерах. Летними убежищами служат дупла деревьев, полости между камнями. Летает медленно и плавно, без внезапных поворотов. На зимовках обнаружена только в подземных полостях. Известны отдельные находки костных остатков в пещерах на побережье Байкала в Тажеранской степи и на Приморском хребте. Не исключено, что обитание возможно и в настоящее время. Имеются фотографии из пещеры Оргалейская (Аларский район), которые, однако, не позволяют надежно определить вид. Редкий вид.

Природоохранный статус: МСОП (NT), К.к. Ирк. (0).

ООПТ: ЗП.

17. Сибирский ушан — *Plecotus ognevi* (Kishida, 1927)

Летучая мышь среднего размера с огромными ушами, длина предплечья 37–46 мм. Окраска верхней части тела от палево-желтой до темной буро-коричневой, низ тела светлый. Крылья короткие и широкие, уши внутренними краями соприкасаются на лбу. Дневные убежища расположены в дуплах деревьев, пещерах, на чердаках и за обшивкой домов. Обитают поодиночке или небольшими группами. На кормежку вылетают поздно, иногда второй раз перед рассветом. Кормятся обычно вблизи от убежища на высоте 4–8 м между деревьями или над дорогами, могут собирать насекомых с поверхности. Полет порхающий с редкими взмахами крыльев. Самка приносит одного-двух детенышей в июле. Обитает на большей части территории области, за исключением крайнего севера Катангского района. Распространение спорадическое. Редкий вид.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, МГ, ОЗ, ТК.

18. Северный кожанок — *Eptesicus nilssonii* (Keyserling et Blasins, 1839)

Летучая мышь среднего размера. Крыло сравнительно узкое, заостренное. Мех густой и высокий. Низ светлее верха; верх буроватый с золотистым налетом, образованным светлыми концами шерстинок. Полет быстрый с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. День проводят в дуплах с узким входом, на чердаках, в трещинах скал. Самки образуют колонии до 30 особей, самцы селятся поодиночке. Охотятся часто вечером и даже днем на разной высоте (поднимаются иногда до 20–30 м) обычно в разреженном лесу, на опушках и деревенских улицах, над водой. Обитают на большей части территории области, за исключением северных и северо-восточных районов. Распространение спорадическое. Редкий вид.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

19. Гобийский кожанок — *Eptesicus gobiensis* (Bobrinskoy, 1926)

Небольшая летучая мышь. В длину взрослая особь достигает 4,6–5,9 см, длина хвоста составляет 3,4–4,6 см, предплечья — 3,2–4,3 см, размах крыльев — 22–25 см, а масса тела равна 5–13 г. Ухо полого округленное; козелок короткий с закругленной вершиной. Эпиблема почти неразвита. Волосы длинные, почти одноцветные. Уши и мордочка гобийского кожанка окрашены в темный бурый или черный цвет. Две фотографии возможно этого вида сделаны в Аргалейской пещере в Аларском районе и в окрестностях пос. Сарма.

ООПТ: ЗП.

20. Двухцветный кожан — *Vespertilio murinus* (Linnaeus, 1758)

Среднего размера летучая мышь. Масса 8–20 г, длина тела 54–64 мм, длина хвоста 36–47 мм, длина предплечья 40–48 мм, размах крыльев 27–31 см. Мех густой, недлинный, волосы отчетливо двухцветные: на спине от темно- до рыжевато-бурого с почти белыми вершинками, создающими «морозную» рябь, на брюхе белесые или ярко-белые с буроватыми основаниями, резко контрастируют с окраской спины. За ушами и на горле участки желтовато- или ярко-рыжей шерсти. Горло белое, маска черная. Конец хвоста выступает из межбедренной перепонки. У самок обычно две пары сосков. Живет в самых разнообразных ландшафтах, включая антропогенные, в горах до 3 000 м над уровнем моря. Убежища — постройки человека и дупла

деревьев. Вылетает на охоту в ранних сумерках, охотится на летающих насекомых на большой высоте обычно над открытыми пространствами, реже над лесом или водоемами. Зимует обычно постройках человека, реже в подземных укрытиях. Отмечен на территории области несколько раз в осенне-зимнее время, в основном в Иркутске и в долине Голоустной.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.).

ООПТ: ЗП.

21. Большой (сибирский) трубконос — *Murina hilgendorfi* (Gray, 1842)

Размеры небольшие: длина тела 50–60 мм, предплечья 35–43 мм, длина хвоста около 35–40 мм, масса 6–12 г. На конце морды имеются кожистые трубки, на которых открываются ноздри. Уши правильной эллипсовидной формы с длинным заостренным козелком, вершина которого отклонена наружу. Крылья широкие, тупоконечные. Свободный край летательной перепонки прикреплен близ основания внешнего пальца задней ноги. Мех густой, мягкий, серый или серо-бурый; спина и бока немного темнее. Охотничий полет небыстрый и очень маневренный. Способны хорошо бегать по субстрату. Убежища — разнообразные полости в деревьях, кроны и другие естественные укрытия. Держатся поодиночке или группами в несколько особей. Оседлы, на севере ареала зимой впадают в оцепенение. Обитание установлено в Тофаларии, предгорьях Восточного Саяна, в долинах рек Китой, Онот, Иркут, Ушаковка, Голоустная, в Приольхонье и на Верхнеленском плато. Известны зимовки в пещерах. На территории области редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП, ИР, КЧ.

Отряд Хищные — Carnivora

22. Волк — *Canis lupus* (Linnaeus, 1758)

Крупный пропорционально сложенный зверь со сравнительно высокими и сильными конечностями и пушистым хвостом. Длина тела 105–160 см, хвоста 35–50 см. Шея короткая, морда широкая и вытянутая, уши остроконечные. Окраска обычно серая с рыжеватым или черноватым оттенком, в передней части спины потемнение. Брюхо и лапы светлые. Питается различными, в том числе и копытными, животными, нанося некоторый ущерб охотничьему и сельскому хозяй-

ству. Активен в ночное время. Очень осторожен. Логово устраивает в наиболее глухих местах. В помете от трех до восьми волчат. Обитает в самых разнообразных ландшафтах. Населяет практически всю территорию области, за исключением высокогорий, избегает сплошные лесные массивы. Наибольшая плотность населения вида регистрируется на территории Катангского и Качугского районов. Численность в области в последние годы колеблется от 2,1 до 4,1 тыс. особей. Местами наносит существенный урон запасам копытных животных. ОО.

Природоохранный статус: СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

23. Обыкновенная лисица — *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

Среднего размера зверь с вытянутым телом, стройными короткими конечностями и длинным пушистым хвостом. Длина тела 60–90 см, хвоста 40–60 см. Морда узкая, заостренная, уши высокие и остроконечные. Окраска от красновато-рыжей до желтовато-серой, чаще всего ярко-рыжая с неясным темным узором. Грудь белая, брюхо белое или черное, кончик хвоста белый. Роет неглубокие простые норы. Встречается практически на всей территории области. Наиболее обычна в лесостепных районах Верхнего Приангарья и Верхоленья и редка в северных районах. Тяготеет к лесостепным участкам с полями, сенокосами и небольшими участками леса. В тайге избегает сплошных массивов и предпочитает держаться в долинах рек, по гарям и вырубкам. Численность может меняться по годам и зависит от состояния кормовой базы. Объект любительской и промысловой охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

24. Песец — *Vulpes lagopus* (Linnaeus, 1758)

Зверь среднего размера, несколько приземистый, с относительно короткими ногами и пушистым хвостом. Длина тела 50–75 см, хвоста 35–30 см. Морда слабо заостренная и короткая, уши небольшие. Окраска зимой чисто-белая, значительно реже светло-серая или темно-бурая. Летом окраска бурая, брюхо грязно-белое. Периодические заходы (раз в несколько лет) в долину Нижней Тунгуски, иногда могут проникать на юг вплоть до Братска. Промысловое значение невелико. Зах. ОО.

25. Красный волк — *Cuon alpinus* (Pallas, 1811)

Довольно крупный зверь с длиной тела 76–110 см, хвоста 45–50 см и массой 17–21 кг. В его облике сочетаются черты волка, лисицы и шакала. От обычного волка красный волк отличается окраской,

пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Характерна укороченная заостренная морда. Уши большие, стоячие, с закругленными вершинами, высоко посажены на голове. Общий тон окраски рыжий, сильно изменчивый у отдельных особей и в разных частях ареала. Конец хвоста черный. Волчата до трех месяцев темно-коричневые. Волосяной покров зимой очень высокий, густой и мягкий; летом заметно короче, грубее и темнее. Хвост пушистый, как у лисицы. Типичный обитатель гор, поднимается до 4 000 м над уровнем моря. Большую часть года он держится в субальпийском и альпийском поясах. Живет и охотится красный волк стаями по 5–12 особей (иногда больше), очевидно объединяющими животных нескольких поколений. Убежищами красным волкам обычно служат расщелины скал, пещеры и ниши в склонах. Известны встречи в Восточном Саяне, в прошлом регистрировались заходы на Байкальский хребет. Зах.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (0), К.к. Ирк. (0), МСОП (VU).

ООПТ: ЗП.

26. Бурый медведь — *Ursus arctos* (Linnaeus, 1758)

Очень крупный зверь тяжелого телосложения с массивными толстыми конечностями. Длина тела до 2 м и более. Голова широкая с короткой мордой, уши небольшие, округлые. Окраска меха от буровато-палевой до темно-бурой и почти черной. На груди иногда небольшое белое пятно. Питание очень разнообразное — от ягод и орехов до крупных копытных. Активен в любое время суток. Зимой впадает в спячку. Берлогу устраивает в наиболее глухих участках леса. В феврале приносит от одного до трех детенышей. Встречается в лесной зоне на большей части территории области, информация о его встречах отсутствует только в Аларском и Нукутском районах. В последние годы отмечен рост численности медведя. Численность может меняться по годам и сильно зависит от состояния кормовой базы. ОО.

Природоохранный статус: СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

27. Байкальский тюлень — *Phoca sibirica* (Gmelin, 1778)

Мелкий тюлень, длина тела 1,2–1,6 м, вес от 65 до 100 кг. Волосяной покров относительно длинный и густой. Окраска спины однотонная оливково-буроватая или буровато-серебристо-серая, бока и брюхо светлые. Новорожденные — желтовато-белые, после первой линьки серебристо-серые. Питаются рыбой (голомянка, бычки). Роды

на льду в специальных логовах, обычно один-два детеныша. Акватория озера Байкал. ОО.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.), МСОП (NT).

ООПТ: ЗП.

28. Горностай — *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758)

Мелкий зверек с удлиненным тонким и гибким телом, короткими конечностями и длинным непушистым хвостом. Длина тела 16–38 см, хвоста 6–11 см. Голова небольшая с короткой мордой и невысокими овально закругленными ушами. Окраска зимнего меха белая, задняя половина хвоста черная или темно-бурая. Летняя окраска двухцветная: голова, верхняя часть шеи, спина, бока, конечности и половина хвоста буровато-коричневые, горло, грудь и живот белые, задняя половина хвоста черная. Питается мелкими млекопитающими (грызунами, бурозубками, пищухами), птицами, насекомыми. Для убежища использует естественные углубления или чужие норы. Населяет большую часть территории области, за исключением высокогорий, сухих степей и темнохвойных массивов. Численность сильно меняется по годам и зависит от состояния кормовой базы. Наиболее обычен в северных районах, редок в лесостепных. Объект промысловой и любительской охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

29. Степной (светлый) хорь — *Mustela eversmanii* (Lesson, 1827)

Мелкий зверек, длина тела 29–52 см, хвоста 7–18 см. Окраска верха головы, шеи, туловища и половины хвоста палево-песчаная с легким коричневым оттенком. Конечности, грудь, низ шеи, пах и задняя половина хвоста темно-бурые, вокруг глаз и на лбу буроватое пятно, уши и конец морды белые. Питается мелкими млекопитающими, птицами, пресмыкающимися и крупными насекомыми. Норы роет редко, чаще использует норы других животных. Населяет степные и лесостепные районы Приольхонья и Верхнего Приангарья на север до Тулунского района, а также Качугский район. Отмечены единичные встречи в Братском, Жигаловском, Нижнеудинском, Казачинско-Ленском и Усть-Удинском районах. Численность незначительна.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП, МГ.

30. Колонок — *Mustela sibirica* (Pallas, 1773)

Среднего размера зверек, зимой рыжевато-желтого, летом рыжевато-красноватого цвета, лапы сероватые, брюхо светлее, верхняя сторона рыла и усы бурые, конец морды, губы, подбородок и одно —

три пятна под шеей белого цвета; длина от конца рыла до основания хвоста 28–30 см, длина хвоста 16,5 см; хвост зимой пушистый. Питается грызунами, пищухами, а также птицами, их яйцами, лягушками, насекомыми, падалью, изредка ловит зайцев. Населяет лесную и лесостепную зоны на большей части территории области. В настоящее время более обычен в лесостепных районах, а в северной группе районов практически исчез. Это связано с тем, что колонок является антагонистом соболя, и более сильный соболь при высокой численности полностью вытесняет колонка. Объект любительской охоты. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК, ЭД.

31. Солонгой — *Mustela altaica* (Pallas, 1811)

По строению и размерам тела очень напоминает средних размеров горностая. Тело у него длинное, гибкое, с овальной, не сильно вытянутой, заостренной мордочкой. Уши небольшие, закругленные. Лапки средних размеров, сильные, с острыми когтями. Хвост немного длиннее, чем у горностая. У основания хвоста имеются пахучие железы, как у всех хорьков. Тело покрыто относительно коротким однотонным мехом. Для вида характерны весенние и осенние линьки. Общая окраска зимнего меха красивого бледного серо-палево-охристого цвета. Бока и брюхо немного светлее спины. Губы, подбородок и верхняя часть горла белые. Ступни серебристо-белые. Летний мех темнее: спина буровато-землисто-серая с легким оливковым оттенком; голова заметно темнее спины; бока и брюхо светлее спины. Самцы отличаются от самок только размерами. На территорию области заходит краем ареала, населяет гольцовую зону Хамар-Дабана и, вероятно, Восточного Саяна. Численность крайне мала. Информация о достоверных встречах в последние годы отсутствует. ОО.

32. Ласка — *Mustela nivalis* (Linnaeus, 1766)

Мелкий зверек с сильно вытянутым тонким и гибким телом, короткими конечностями и хвостом. Длина тела 13–28 см, хвоста 1,5–8,0 см. Голова маленькая, уши короткие и широкие. Зимой окраска чисто-белая, летом двухцветная: голова, спина, бока и конечности буровато-коричневые, горло, грудь и брюхо белые. Отличается большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом для всех мелких животных; пищу ее составляют мышевидные грызуны, крысы, кроты, цыплята, голуби, а также ящерицы, гадюки, лягушки, насекомые. Населяет лесную зону, за исключением высокогорий и степей. Предпочитает долины рек. Численность сильно меняется по годам и в значительной степени зависит от состояния

кормовой базы. Ее добыча носит случайный характер, промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

33. Американская норка — *Mustela vison* (Schreber, 1777)

Мелких размеров зверек с гибким вытянутым телом, короткими конечностями и коротким непушистым хвостом. Длина тела 33–45 см, хвоста 16–25 см. Морда узкая уплощенная, уши маленькие. Окраска темно-коричневая. Белое пятно захватывает только подбородок и нижнюю губу, иногда белые пятна бывают на груди и на горле. Акклиматизированный вид, впервые была выпущена в 1936 г., после чего последовало еще несколько выпусков. Часть норок сбежали из звероводческих хозяйств. В настоящее время встречается на значительной части территории таежных районов и расширяет свой ареал. Отсутствует в лесостепных районах и на большей части Катангского района. Наиболее обычна в Качугском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Тайшетском и Тулунском районах. Объект охоты, но промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК.

34. Росомаха — *Gulo gulo* (Linnaeus, 1758)

Среднего размера сравнительно неуклюжий зверь с короткими массивными конечностями, коротким лохматым хвостом и грубым длинным мехом. Длина тела 76–86 см, хвоста 18 см. Морда вытянутая, уши небольшие. Окраска меха от рыжевато-бурой до темной коричнево-бурой, на спине, шее, груди, брюхе, лапах и конце хвоста заметно темнее. От основания хвоста вдоль боков тянется широкая рыжеватая или желтая полоса. На лбу заметно беловатое пятно. Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве. Всеядна, часто поедает остатки добычи волков и медведей, в большом количестве ловит беляков, а также тетеревов, рябчиков, мышевидных грызунов. Реже охотится на крупных копытных. Объединение в полигамные пары происходит только в период размножения — с мая по август. Населяет таежные и горные леса. Отсутствует в лесостепных и некоторых примагистральных районах или бывает там редкими заходами. Более обычна в Катангском, Качугском, Жигаловском и Киренском районах. Промыслового значения не имеет. ОО.

Природоохранный статус: МСОП (VU).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

35. Соболь — *Martes zibellina* (Linnaeus, 1758)

Зверек среднего размера, примерно с кошку, со стройным гибким телом и коротким пушистым хвостом. Длина тела 35–53 см, хвоста

11–19 см. Морда острая, уши большие. Окраска меха от желто-бурой до темно-бурой и черной, иногда с сединой. Хвост и конечности окрашены темнее, а голова и уши — светлее. Горловое пятно желтоватое. В питании есть мышевидные грызуны, главным образом красная и красно-серая полевки. В Саянах большую роль в питании соболей играют пищухи. Часто поедает белок, нападает на зайцев. Из птиц соболь чаще всего нападает на рябчиков и глухарей, но в целом птицы являются второстепенным кормом. Питается также различными ягодами. Гнездовые убежища в дуплах поваленных и стоящих деревьев, в каменных россыпях, под корнями. Населяет лесную зону на большей части территории области. Не отмечен только в Аларском и Нукутском районах. Наиболее обычен в северных таежных районах. Важнейший объект промысловой охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

36. Азиатский барсук — *Meles leucurus* (Hodgson, 1847).

Крупный зверь. Длина тела 60–90 см, хвоста 20–24 см; масса до 24 кг. Форма тела своеобразна, представляет собой как бы обращенный вперед клин, который сужается к концу вытянутой тонкой морды. Шея короткая, почти незаметная. Ноги короткие, массивные. На пальцах длинные когти, приспособленные к рытью. Окраска спины и боков буровато-серая с серебристым оттенком, низа тела — черноватая. На морде две темные полосы, тянущиеся от носа к ушам. Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам холмов, лесных оврагов и балок и использует много лет. Ведет ночной образ жизни. Характерен для большей части территории области, но в северных районах крайне редок и встречается там спорадически. Более обычен в лесостепных и примагистральных районах. На территории области обитает несколько тысяч особей. Объект любительской и спортивной охоты, промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, МГ.

37. Выдра — *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)

Среднего размера зверь с вытянутым вальковатым и слегка уплощенным телом, толстой шеей, короткими конечностями и длинным, сжатым с боков хвостом. Длина тела 70–75 см, хвоста до 50 см. Голова плоская, морда короткая и тупая, уши едва выступают из меха. Пальцы соединены хорошо развитой перепонкой. Окраска темно-бурая однотонная. Голова и спина окрашены несколько темнее, низ тела имеет серебристый оттенок. Встречается на большей части территории области, за исключением степных районов, не отмечена только

в Аларском и Нукутском районах. Населяет преимущественно реки, богатые рыбой, с чистой водой. Наиболее обычна по рекам западного макросклона Байкальского хребта на территории Байкало-Ленского заповедника и на горных реках Присаянья. Как объект промысловой охоты значения не имеет, охота запрещена.

Природоохранный статус: СИТЕС (I), К.к. Ирк. (3), МСОП (VU).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

38. Тигр — *Pantera tigris* (Linnaeus, 1758)

Крупнейший представитель кошачьих. Длина самцов 190–310 см, самок 170–200 см, хвоста соответственно 94–111 см и 86–90 см. Масса самцов 140–320 кг, самок 100–120 кг, возможно больше. Тело мощное, массивное, голова крупная, по ее бокам развиты баки. Конечности умеренной длины, сильные, с округлой широкой лапой, вооруженные мощными изогнутыми когтями длиной до 10 см. Уши округлые, короткие. Общий тон окраски красновато-рыжий или — у северных особей — тусклый охристо-желтый. На нем хорошо выделяется рисунок из темных поперечных полос. Хвост полосатый с темным концом. Известны единичные заходы на территорию области. В начале нашего века отмечен заход тигрицы с тигренком в Бодайбинский район и заход в Усть-Кутский район, в XX в. — в Казачинско-Ленский и Иркутский районы, и в XIX в. зарегистрирован заход в окрестности Иркутска и Балаганска. Зах.

Природоохранный статус: К.к. России (1), К.к. Ирк. (4), СИТЕС (I), Протокол между Правительством РФ и Правительством КНР об охране тигра, МСОП (EN).

39. Ирбис (снежный барс) — *Uncia uncia* (Schreber, 1776)

По размерам значительно превосходит рысь. Обладает длинным приземистым телом на невысоких мощных лапах. Тело до 140 см, длина хвоста до 107–108 см, вес до 60 кг, в исключительных случаях больше. Длина хорошо опушенного превосходящего толщину предплечья хвоста приближается к длине тела. Окраска представителей высокогорных популяций дымчато-серая с кольцеобразными размытыми пятнами, достигающими на спине 5–7 см в диаметре. Населяет Восточный Саян, известны единичные заходы на Приморский и, возможно, Байкальский хребты.

Природоохранный статус: СИТЕС (I), К.к. России (1), К.к. Ирк. (1), МСОП (EN).

ООПТ: ЗП.

40. Манул — *Otocolobus manul* (Pallas, 1776)

Некрупный дикий кот размером с домашнюю кошку. Длина тела 52–65 см, вес 2 500–4 500 г. Волосяной покров отличается пышно-

стью и густотой, особенно в зимнем наряде. Половой диморфизм в размерах и окраске манула выражен слабо. Самцы и самки во многом подобны. Зимний мех пышный и яркий. Общий тон окраски желтовато-охристый, подпушь темно-серая. Однако за счет многочисленных светлых окончаний волос, особенно на спине, шкура выглядит седой. Темные окончания волос образуют потемнение в области крестца. Слабо выраженные, местами едва угадывающиеся кольца покрывают хвост. На морде выражены темные пестрины, баки и идущие вдоль них две характерные полосы. Отмечены единичные заходы в Слюдянский район — в окрестности пос. Тибельти и г. Байкальск.

Природоохранный статус: СИТЕС (II), К.к. России (3), К.к. Ирк. (4), МСОП (NT).

41. Рысь — *Felis lynx* (Linnaeus, 1758)

Крупный зверь с коротким телом, высокими сильными конечностями и коротким хвостом. Длина тела 80–105 см, хвоста 20–30 см. По бокам головы хорошо заметны баки, уши сравнительно большие, острые, с длинными кисточками, мех густой и высокий. Общий тон окраски от палево-дымчатого до ржаво-красноватого, брюшная сторона светлее. Спина, бока и ноги покрыты темными пятнами. Населяет практически всю территорию области, за исключением степей и высокогорий. В северных районах редка, более обычна в лесостепных и примагистральных. На острове Ольхон находится под угрозой исчезновения. Предпочитает угодья с высокой численностью кабарги, косули и зайца-беляка. Промыслового значения не имеет, объект любительской и спортивной охоты. ОО.

Природоохранный статус: СИТЕС (II).

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК, ЭД.

Отряд Парнокопытные — Artiodactila

42. Кабан — *Sus scrofa* (Linnaeus, 1758)

Крупное животное с массивным коротким телом, большой головой, сравнительно тонкими ногами и коротким хвостом. Длина тела 125–175 см, высота в холке 80–100 см, вес 150–200 кг. Уши длинные и широкие, морда вытянута, заканчивается пятачком. У самцов верхние и нижние клыки торчат изо рта вверх. Окраска от черной и рыже-бурой до песчаной и серой. Волосяной покров грубый, щетинистый. У самок более легкое сложение. Поросята светло-бурые с продольными полосами. Обитатель разнообразных ландшафтов. Питается корневищами, клубнями и корнями различных растений, орехами. Может

поедать животную пищу — дождевых червей, насекомых, мелких позвоночных. Летом активен в ночное, а зимой в дневное время. Ведет групповой или стадный образ жизни, старые самцы держатся в одиночку. Населяет левобережную часть долины Ангары в пределах Слюдянского и Иркутского районов и лесную зону Предсаянья от Шелеховского до Тайшетского района. Известны заходы в долину Голоустной, в Баяндаевский и Балаганский районы и, возможно, до верховий Лены. Наибольшей плотности население вида достигает в Слюдянском, Заларинском и Черемховском районах. Важный объект спортивной и любительской охоты. ОО.

ООПТ: ЗП, ИР, ЗЛ, КД, КР.

43. Благородный олень (изюбрь) — *Cervus elaphus* (Linnaeus, 1758)

Крупный стройный зверь с высокими ногами. Длина тела около 200 см, высота в холке до 150 см, вес до 300 кг. Голова несколько вытянута, шея короткая, уши длинные, заостренные, хвост короткий. У взрослых самцов на рогах не менее пяти отростков. Окраска однотонная, без пятен. Основной тон летом от рыжевато-коричневого до буровато-коричневого. Вокруг хвоста большое зеркало рыжеватого или желтоватого цвета. Зимой окраска сероватая. Населяет лесные, лесостепные и горные районы на большей части территории области. В последние годы наметилась тенденция к продвижению вида на север вплоть до средней части Катангского района. Наиболее обычен на территории районов, примыкающих к Байкалу, — Ольхонского, Иркутского и Слюдянского, значительно реже встречается в северных районах. Предпочитает леса с наличием открытых участков (марян на побережье Байкала), вырубок, гарей. Важный объект спортивной и любительской охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

44. Пятнистый олень — *Cervus nippon* (Linnaeus, 1758)

Животное легкого и стройного телосложения, длина тела 173–180 см, высота в холке 100–112 см, масса 73–117 кг. Самцы крупнее самок, с ветвистыми рогами, достигающими 80 см. Летний мех с ярко выраженной пятнистостью, которая зимой выражена слабо. Зеркало очень маленькое. Акклиматизирован в нескольких охотничьих хозяйствах области, в частности в Баяндаевском районе. Имеется информация о встречах одичавшего пятнистого оленя на территории Ольхонского района. ОО.

45. Сибирская косуля — *Capreolus pygargus* (Pallas, 1773)

Крупный зверь легкого и изящного сложения с высокими ногами, длинной шеей и небольшой головой. Длина тела 100–155 см, высота

в холке 75–100 см, вес 20–50 кг. Морда относительно короткая, уши большие, хвост не выделяется. У самцов имеются рога с тремя — пятью отростками. Окраска одноцветная: летом рыжая, зимой серая или буроватая. Брюхо белесое, крупное зеркало белое или желтоватое. В настоящее время обитает во всех районах Иркутской области, кроме Катангского и Мамско-Чуйского, но в последние годы зарегистрированы отдельные заходы и туда. Крайне редка на северной границе ареала в Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском и Усть-Илимском районах. Наиболее обычна в лесостепных и примагистральных районах. Предпочитает леса, перемежающиеся с открытыми пространствами, избегает сплошных лесных насаждений. Важный объект спортивной и любительской охоты. ОО.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, МГ, ТР, ТК, ЭД.

46. Лось — *Alces alces* (Linnaeus, 1758)

Очень крупный, мощный и высоконогий зверь. Длина тела до 300 см, высота в холке до 225 см, вес до 500 кг. Голова большая, сильно вытянутая, со вздутой верхней губой, шея короткая и толстая, уши длинные, на горле свешивающийся вниз кожаный вырост. У самцов тяжелые, образующие лопату с отростками рога. Окраска одноцветная бурая, ноги светлые, почти белые, зеркала нет. Обитает практически на всей территории области, за исключением степных Аларского и Нукутского районов, отсутствует на острове Ольхон и в Приольхонье. Наиболее обычен в северных районах — Катангском, Братском, Усть-Илимском и Нижнеилимском. Предпочитает обширные, поросшие кустарником мари, старые гари и вырубки, летом держится вблизи водоемов. Важный объект спортивной и любительской охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

47. Северный олень — *Rangifer tarandus* (Linnaeus, 1758)

Крупный зверь с удлиненным телом и невысокими конечностями. Длина тела 180–220 см, высота в холке 110–140 см, вес до 200 кг. Голова слегка горбоносая, шея длинная, уши небольшие, хвост выдается из меха. На шее длинные волосы образуют гриву. Рога есть у самцов и самок. Окраска летом однотонная бурая, грива и зеркало белые. Зимой окраска более контрастная с появлением светлых пятен. В области выделяется три участка обитания этого вида, разделенных между собой степями и густонаселенными примагистральными районами. Первый занимает северные и северо-восточные таежные районы, южная граница проходит по Качугскому, Жигаловскому, Усть-Удинскому и Осинскому районам, западная — по Братскому и

Усть-Илимскому. Второй участок включает Саяны и Присаянье от Тайшетского и Нижнеудинского до Черемховского района. Третий, небольшой по площади, участок включает высокогорье хребта Хамар-Дабан в Слюдянском районе. Наиболее обычен северный олень в северных районах — Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Качугском. Алтае-саянская популяция, обитающая на территории Нижнеудинского, Заларинского, Тайшетского, Черемховского и, возможно, Слюдянского районов, малочисленна и включена в Красную книгу Российской Федерации, охота на нее запрещена. Совершает сезонные миграции в зимнее время, спускаясь с гор в долины, концентрируется на местах зимовок. Детали распространения ангарской популяции неизвестны. Объект спортивной и любительской охоты, за исключением алтае-саянской популяции. ОО.

Природоохранный статус: К.к. России (1) (алтае-саянская и ангарская популяции), К.к. Ирк. (2).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

48. Кабарга — *Moschus moschiferus* (Linnaeus, 1758)

Стройное животное среднего размера с небольшой головой и тонкими и легкими ногами. Длина тела 85–100 см, высота в холке 56–70 см, вес 15–20 кг. Задние ноги длиннее передних, уши длинные, очень подвижные, хвост короткий. У самцов изо рта торчат вниз тонкие и острые клыки, предназначение которых неясно. Волосяной покров грубый и длинный, окрашенный зимой в темно-бурый цвет, голова серая. По нижней стороне шеи и на груди беловатая полоска, брюхо белое. На боках и спине разбросаны светлые пятна. Обитатель горной тайги, где придерживается крутых склонов с выходами скал. Ведет одиночный образ жизни. Активна в сумеречные и ночные часы. Передвигается прыжками, прекрасно лазает по скалам, спасаясь от врагов на так называемых отстоях. Лежки устраивает среди скал или каменистых осыпей. Обитает на горно-таежных участках на большей части территории области. Отсутствует в Нукутском и Аларском районах. В незначительном количестве встречается в южной части Катангского района. Обычна в Тофаларии, Присаянье, на Хамар-Дабане и в верховьях рек Лена и Киренга, а также вокруг озера Орон в Бодайбинском районе. Распространение часто носит спорадический характер. Важный объект любительской, спортивной и промысловой охоты, добывается из-за кабарожьего мускуса. ОО.

Природоохранный статус: СИТЕС (II).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС.

49. Сибирский козел (козерог) — *Capra sibirica* (Pallas, 1776)

Длина тела взрослых самцов 144–176 см, высота в холке 90–105 см, в крестце — 93–111 см. Размер рогов самцов до 115 см, а развал (размах) их в самом широком месте 103 см. Общий вес крупных самцов достигает 130 кг, но может быть и выше. Размеры и вес самок значительно меньше. Длина их тела редко превосходит 136–137 см, а вес — 50–60 кг, однако длина рогов самок, обитающих в Восточном Саяне, способна достигать 42 см. Телосложение сибирского горного козла, в особенности самцов, тяжелое, массивное, крестец плотного тела на коротких крепких ногах поднят выше холки, мощная шея самцов увенчана на голове крупными саблеобразными рогами. Борода самцов в длину достигает 23 см, имеет темную окраску. Населяет горные хребты Тофаларии. Наиболее высокая плотность отмечена в долине р. Уда. Редкий вид.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ЗП.

50. Снежный баран — *Ovis nivicola* (Eschscholtz, 1829)

Крупный снежный баран с вытянутым массивным телом на коротких и толстых ногах, голова широкая, короткая, с широким плоским лбом, рога тонкие (обхват у оснований 33,5–34,0 см), ноги длинные — 100 см и более. Длина тела взрослых самцов 162–183 см, высота в холке 94–104 см. Длина тела зрелых самок 139–144 см, высота в холке 82–84 см. Отмечены заходы в летнее время в Витимский заповедник. Численность не превышает нескольких десятков особей. В прошлом обитал на Байкальском хребте и, возможно, на острове Ольхон. Зах.

Природоохранный статус: К.к. России (1), К.к. Ирк. (1), МСОП (CD).

ООПТ: ВГЗ.

Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha

51. Алтайская пищуха — *Ochotona alpina* (Pallas, 1773)

Одна из самых крупных пищух. Длина тела 17,5–25,1 см, масса 160–350 г. Самцы в среднем несколько крупнее самок. Хвост очень короткий. Уши довольно большие, округлые; их длина равна примерно половине длины головы — 1,8–2,6 см. По краям ушных раковин проходит узкая светлая кайма. Вибриссы относительно длинные, до 6–7 см, черные. Окраска летнего меха значительно варьирует от светлой желтовато-серой до буро-охристой и коричнево-бурой. Бока с рыжеватым оттенком; брюхо бледное, желтоватое или коричневатое. Местами встречаются полностью черные особи. Зимний мех пепель-

но-серый или буровато-серый с темной продольной струйчатостью. Весенняя линька идет с апреля по июнь, осенняя — с августа по октябрь. Населяет отроги Восточного Саяна и Тофаларию. Оптимальными местообитаниями являются каменистые выходы — курумы. Численность подвержена сильным колебаниям.

ООПТ: ЗП, ИР.

52. Туруханская пищуха — *Ochotona turuchanensis* (Naumov, 1934)

Длина тела 150–250 мм, ступни — 30–35 мм, ушной раковины — 16–22 мм, масса до 200 г. Уши круглые, их длина равна примерно половине длины головы. Их окраска во все сезоны бурая или серо-бурая; по краю уха проходит белая полоса, хорошо заметная летом. Хвост очень короткий, снаружи незаметен. Лапки довольно короткие. Вибриссы короткие, 42–55 мм. Окраска летнего меха варьирует от серо-желтоватого цвета со слабой ржавой примесью до яркого ржаво-охристого. Брюхо беловатое или сероватое с примесью палевого. На боках шеи коричневые пятна. Зимний мех более светлый. Населяет центральную и северную части Иркутской области на север от долины Голоустной и верховий Лены и ее левобережную часть на востоке до среднего течения Ангары на западе. Местообитаниями в основном являются влажные темнохвойные леса преимущественно по берегам водоемов в таежных районах. Численность подвержена сильной флуктуации, в последние годы отмечена тенденция к ее росту и расширению ареала.

ООПТ: ЗП, КЧ, ОЗ, ТР, ЭД.

53. Северная пищуха — *Ochotona hyperborea* (Pallas, 1811)

Мелкие зайцеобразные, хвост очень короткий, из меха не выступает. Уши короткие, округлые. Конечности сравнительно короткие. Пищуха средних или крупных размеров, длина тела 170–250 мм. Летняя окраска меха разнообразная, обычно светло-коричневая, встречаются темноокрашенные особи, иногда черного цвета. Зимой мех серый с примесью охристого на боках и голове. Населяет преимущественно таежные горные районы в Восточном Саяне и по хребтам вокруг Байкала. В целом граница ареала этих двух видов в настоящее время точно не выяснена, не исключено наличие зоны симпатрии. Численность подвержена сильным колебаниям. В годы с высокой численностью заселяет несвойственные биотопы, например равнинные участки тайги, во время депрессии численности сохраняется только в стациях переживания — курумах.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО, ТК.

54. Заяц-русак — *Lepus europaeus* (Pallas, 1778)

Относится к крупным зайцам: длина тела 57–68 см, масса 4–6 кг. Телосложение хрупкое. Внешне русак хорошо отличается от беляка более длинными ушами и длинным хвостом черного или черно-бурого цвета сверху. Глаза красновато-коричневые. Задние конечности длиннее, чем у беляка, но лапы короче и уже. Летняя окраска бывает охристо-серая, охристо-рыжая или оливково-бурая. Бока окрашены светлее спины; живот белый. Кончики ушей круглый год черные. Зимний мех немногим светлее, кончики ушей и передняя часть спины и зимой остаются темными. Акклиматизированный вид, был выпущен в 1936 и 1939 гг. в Заларинском районе, позднее — в Баяндаевском. В настоящее время заселяет лесостепные и примагистральные районы области, проникая на север по сельскохозяйственным угодьям до Чунского, Братского, Нижнеилимского и Качугского районов. Имеется информация о заходах в Казачинско-Ленский и Киренский районы. Численность низкая, более обычен в лесостепных районах. ОО.

ООПТ: МГ.

55. Заяц-беляк — *Lepus timidus* (Linnaeus, 1758)

Крупный заяц. Длина тела составляет 44–74 см, вес от 2,5 до 5,5 кг. Уши относительно короткие, отогнутые вперед. Задние ноги средней длины. Окраска тела летом бурая, серая или коричневато-охристая, на щеках и лапах рыжеватый оттенок. Зимой весь мех чисто-белый. Кончики ушей черные весь год. В течение года приносит один — три помета от трех до шести детенышей. В лесу предпочитает участки с развитым подлеском, старые вырубки и гари. Обитает практически на всей территории области, за исключением высокогорий. Наиболее обычен в таежных районах, населяет самые разнообразные биотопы. Численность может сильно изменяться по годам. Имеет важное значение как объект любительской и спортивной охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

Отряд Грызуны — Rodencia

56. Обыкновенная белка — *Sciurus vulgaris* (Linnaeus, 1758)

Мелкий зверек с вытянутым телом и длинным пушистым хвостом. Длина тела от 190 до 280 мм, хвоста от 130 до 180 мм. Голова округлая, глаза большие черные, уши длинные с кисточками на концах, пальцы удлиненные с цепкими когтями. Окраска изменчивая.

Летом верхняя сторона окрашена в различные оттенки рыжего, бурого или черного цвета. Зимой она соответственно серого, светло-серого, темно-серого или светло-бурого цвета. Брюхо всегда белое. Хвост черный, буроватый или ярко-рыжий. Основу питания составляют семена хвойных деревьев, кедровые орехи, грибы, насекомые. На зиму делает запасы. Ведет в основном древесный образ жизни. Убежища в дуплах или в гнездах. Обитает в лесной и лесостепной зонах на большей части территории области. Отсутствует в степи и высокогорьях. Встречается на территории всех районов области. Численность сильно подвержена колебаниям. Как объект охоты имеет важное промысловое значение. ОО.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

57. Обыкновенная летяга — *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758)

Мелкий зверек с длинным пушистым хвостом. Длина тела составляет 135–205 мм, хвоста — 90–140 мм. У летяги круглая голова с большими черными глазами и небольшими без кисточек ушами. Передние и задние ноги соединены кожистой, покрытой мехом перепонкой, которая расправляется при прыжках, образуя планирующую поверхность. Окраска однотонная серая, иногда с бурым или рыжеватым оттенком, брюхо беловатое. В спячку не впадает. Обитатель таежных лесов, предпочитает пойменные леса с примесью лиственных пород. Встречается повсеместно на всей территории лесной зоны, за исключением высокогорий Восточного Саяна. Предпочитает пойменные местообитания и смешанные старовозрастные леса. На значительной части северных районов встречается спорадически, численность невелика. Промыслового значения не имеет, практически не добывается. ОО.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

58. Азиатский бурундук — *Eutamias sibiricus* (Laxmann, 1769)

Мелкий стройный зверек с вытянутым телом и длинным пушистым хвостом. Длина тела 130–160 мм, длина хвоста 86–108 мм. Уши небольшие, без кисточек, имеются защечные мешки. Окраска пестрая, на спине пять продольных черных полос, разделенных светлыми желто-белесыми или ржаво-охристыми полями. Брюхо белесое или чисто-белое. Хвост двухцветный — сверху сероватый, снизу

ржавчатый. Питается семенами хвойных и лиственных деревьев, ягодами, насекомыми, семенами травянистых растений. Делает запасы на зиму. Впадает в зимнюю спячку. Норы под корнями деревьев и под пнями. Населяет практически всю территорию области, кроме высокогорий и сухих степей Приольхонья. На большей части территории обычный вид, численность подвержена ежегодным колебаниям. Практически не добывается, промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

59. Длиннохвостый суслик — *Urocitellus undulanus* (Pallas, 1779)

Крупный суслик с длинным и пушистым хвостом. Длина тела 200–320 мм, хвоста 100–150 мм. Окраска спины от охристо-бурой до серовато-палевой. Бока и плечи ржавого цвета. На спине пятнистый или крапчатый рисунок. Брюхо палево-рыжее, голова и хвост одного цвета со спиной. Питается семенами и корневищами трав, иногда поедает насекомых и ягоды. Живет колониями в норах глубиной до четырех метров. Впадает в зимнюю спячку. В год один выводок из трех — десяти детенышей. Населяет степные и лесостепные районы области на север до Качугского и Братского районов, по Транссибирской магистрали до Куйтунского района и по побережью Байкала до мыса Покойный, отмечен в высокогорьях Хамар-Дабана и, возможно, Тофаларии. Наиболее обычен в степях и лесостепях Верхнего Приангарья и Приольхонья. Численность подвержена колебаниям, в лучших местообитаниях плотность населения доходит до 15–20 особей на 1 га, в последние годы численность и ареал сокращаются. Промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ЗП.

60. Камчатский (черношапочный) сурок — *Marmota camtscatica* (Pallas, 1811)

Крупный сурок, длина тела 390–540 мм. В окраске верха преобладают темные тона, концы волос черные. Бока палевые, брюхо яркое — рыжеватое или охристо-ржавое. Голова черная или темно-бурая, щеки светлые, уши ярко-рыжие. Обитатель гор. Питается травянистыми растениями. С сентября по май залегает в спячку. Размножается в мае-июне, в помете до пяти детенышей. Населяет покрытые альпийской растительностью участки в верховьях рек Чая, Большая Чуя, Левая и Правая Мама на Северо-Байкальском нагорье, на северном макросклоне Делюн-Уранского хребта, в окрестностях озера Орон и по Байкальскому хребту вдоль побережья северной части Байкала на юг до мыса Рытого в Байкало-Ленском заповеднике.

Численность на территории области не превышает тысячи особей. Промыслового значения не имеет, охота запрещена.

Природоохранный статус: К.к. России (3), К.к. Ирк. (3).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ЛО.

61. Евразийский (обыкновенный) бобр — *Castor fiber* (Linnaeus, 1758)

Самый крупный грызун нашей фауны. Телосложение массивное. Длина тела 75–120 см, вес около 20 кг. Глаза и уши маленькие, хвост плоский, широкий, лопатообразный. Между пальцами плавательные перепонки. Цвет меха от светло-коричневого до черного. Населяет берега медленно текущих речек. Летом питается листьями и молодыми побегами, зимой и весной ест кору, ветки и корневища, на зиму делает запасы. Живет парами, размножается один раз в году. В помете один — пять детенышей. До XVII в. обитал в лесной зоне Прибайкалья, но был истреблен. Реакклиматизирован в области в середине XX в. Был выпущен в Чунском, Качугском, Нижнеилимском и Зиминском районах, на территории первых трех не прижился. В настоящее время обитает только в Присаянье — в Зиминском, Заларинском, Тулунском и Нижнеудинском районах. Численность растет, но не превышает нескольких сотен особей. Промыслового значения не имеет, охота запрещена. ОО.

Природоохранный статус: Пр. 2 (Ирк.), МСОП (NT).

ООПТ: ЗЛ, КД, КЗ.

62. Лесная мышовка — *Sicista betulina* (Pallas, 1779)

Очень мелкий длиннохвостый грызун, внешне напоминающий мышь. Длина тела до 75 мм, хвоста 90–100 мм. Морда острая и подвижная, уши сравнительно большие. На хвосте заметны поперечные кольца. Окраска верха тела желтовато- или рыжевато-коричневая, брюхо сероватое, от носа вдоль спины до хвоста тянется черная полоса. Питается насекомыми, ягодами, зелеными частями растений, семенами. Гнезда устраивает в расщелинах и под корой старых пней, в дуплах и норах. Активна в сумерки и ночью. Хорошо лазает по кустарникам. Самка приносит один помет в год, в котором от трех до восьми детенышей. Зимой впадает в спячку. Обитает в большей части лесов на территории области, за исключением северных и северо-восточных районов. Населяет различные типы местообитаний, но предпочтение отдает мелколиственным травянистым лесам, лесным опушкам и луговым биотопам с зарослями кустарников. Редкий вид, но на локальных участках в отдельные годы может быть обычным.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ТК, ЭД.

63. Степная мышовка — *Sicista subtilis* (Pallas, 1773)

Очень мелкий зверек с небольшими конечностями и очень длинным и тонким хвостом. Длина тела около 60 мм, хвоста до 90 мм. Морда заостренная, уши большие. На хвосте заметны поперечные темные кольца. Окраска обычно палево-серая, светлеющая на нижней стороне тела. Вдоль спины от носа до хвоста проходит черная полоса, еще две неяркие, но более широкие полосы тянутся по бокам. Обитатель степей и лесостепей. Пищу составляют насекомые, семена и зеленые части растений. Нор не роет, использует норы других грызунов. Зимой впадает в спячку. Предположительно, населяет степные и лесостепные районы Верхнего Приангарья, достоверные находки известны только в Аларском и Нукутском районах. Редкий вид, известны единичные находки.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (4), МСОП (NT).

64. Барабинский хомячок — *Cricetulus barabensis* (Pallas, 1773)

Мелкий зверек с коротким хвостом. Длина тела 82–102 мм, хвоста 20–30 мм. Морда заметно приостренная, уши большие, закругленные, ступня голая, хвост покрыт мягкими короткими волосами. Окраска верха тела коричневая или рыжеватая, ото лба до хвоста проходит черная полоса, брюхо серое, лапы и нижняя сторона хвоста белая, на ушах белая полоса. Питается различными семенами и насекомыми. Активен в темное время суток. Роет простые норы, иногда использует норы других грызунов. Населяет лесостепные, степные и луговые ландшафты в Верхнем Приангарье на север до Качугского, Жигаловского, Усть-Удинского и Заларинского районов, обычен в Приольхонье и на острове Ольхон. Обычный, местами редкий вид, отмечена тенденция к снижению численности.

ООПТ: ЗП.

65. Ондатра — *Ondatra zibeticus* (Linnaeus, 1766)

Грызун средних размеров. Длина тела 250–350 мм, хвоста 200–280 мм, вес 900–1 000 г. Хвост с боков сильно сжат и покрыт редкими волосами и чешуйками. Пальцы задних ног соединены плавательной перепонкой. Окраска от светлой охристо-рыжей до черной, чаще всего каштаново-коричневая. Молодые зверьки серо-бурые. Имеется мускусная железа, за что ондатру часто называют мускусной крысой. Селится по побережью рек и озер и на болотах. Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет. Активна в сумерки и утром.

Ондатра — североамериканский вид, у нас в области была акклиматизирована в 30-х гг. прошлого века. В настоящее время населяет все районы области, за исключением высокогорий Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Обитает преимущественно на побережье различных водоемов. Численность сильно меняется по годам. Имеет важное значение как объект промысловой охоты. ОО.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

66. Лесной лемминг — *Myopus schisticolor* (Lilljeborg, 1884)

Мелкий зверек с коротким, покрытым волосами хвостом. Длина тела 90–120 мм, хвоста 12–20 мм. Морда притупленная, уши небольшие, округлые. Окраска головы, боков и брюха черновато-серая с легким пепельным оттенком. На верхней стороне тела рыжевато-коричневое пятно, которое может занимать как только заднюю часть спины, так и всю спину полностью и спускаться на бока. Хвост сверху темный, снизу светлый. Обитает в таежных лесных и кустарниковых ландшафтах на большей части территории области. Отдает предпочтение ерниковым и ивняковым зеленомошным зарослям, лиственничным и сосново-лиственничным кустарниковым зеленомошным лесам. Редкий вид.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

67. Рыжая полевка — *Myodes glareolus* (Screber, 1780)

Мелкая полевка. Длина тела 80–115 мм, длина хвоста достигает более половины длины тела. Окраска верха ржаво-коричневая, различных оттенков, брюхо темно-серое, хвост резко двухцветный (сверху темный, снизу беловатый), покрыт короткими редкими волосами. Населяет все типов лесов. Зимой часто живет в стогах сена и постройках человека. Питается семенами, корой, почками деревьев, грибами, лишайниками и травянистыми растениями. Активна ночью. Устраивает гнезда в дуплах и трухлявых пнях, реже роет норы с одной-двумя камерами. Численность заметно меняется по годам, иногда очень высокая. Известны отдельные находки в предгорной части Тофаларии. Современное состояние и численность неизвестны.

68. Красная полевка — *Myodes rutilus* (Pallas, 1779)

Мелкая полевка. Длина тела составляет 85–118 мм, хвоста — 40–50 % от длины тела. Окраска верха тела яркая с преобладанием красноватых или рыжих тонов, брюхо темно-серое, хвост одноцветный,

густо опушенный. Обитатель лесной зоны, кроме высокогорий и затапливаемых участков в поймах рек. Населяет различные типы местообитаний, оптимальными являются таежные биотопы с преобладанием темнохвойных пород. В зимнее время может жить в поселениях человека. Обычный, в отдельные годы многочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

69. Красно-серая полевка — *Craseomys rufocanus* (Sundeval, 1846)

Длина тела 100–130 мм, хвост длиной меньше половины длины туловища. Окраска головы и передней части спины ржаво-коричневая. Бока и щеки пепельно-серые или серо-желтоватые, хвост резко двухцветный. Хорошо заметны граница рыжеватого и сероватого меха и рыжеватый треугольник на морде. Наиболее активна в сумерки и ночью. Норы неглубокие, расположенные в лесной подстилке. Обитает в лесной и частично лесостепной зонах на большей части территории области. Населяет различные типы местообитаний, оптимальными из которых можно считать горно-долинные леса. Обычный, в отдельные годы многочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

70. Тувинская полевка — *Alticola tuvinicus* (Ognev, 1950)

Небольшой грызун, длина тела 100–130 мм, хвоста 27–45 мм. Окраска спины серовато-песчаная с охристым или рыжеватым оттенком в области головы, брюхо и лапы белые с сероватым оттенком, хвост двухцветный. Населяет Ольхон и острова Малого Моря (Угунгой, Зумугой, Хубын, Боракчин, Малый Тойник), Тажеранскую степь до устья р. Анги. Селится преимущественно в нагромождениях камней, в останцах и скалах в степи. Делает запасы на зиму из высушенных травянистых растений. Распространение спорадическое. Ранее считалась отдельным видом — ольхонской полевкой и под этим наименованием включена в Красную книгу Иркутской области. Отмечена резкая тенденция к снижению численности, на многих прежних местообитаниях в последние годы не обнаружена.

Природоохранный статус: К.к. Ирк. (1).

ООПТ: ЗП.

71. Большеухая полевка — *Alticola macrotis* (Radde, 1861)

Мелкий зверек с коротким, покрытым густыми волосами хвостом. Длина тела 100–125 мм, хвоста 20–40 мм. Уши сравнительно

большие, округлые, с широким основанием. Подошва голая. Окраска тела серая с охристым или коричневым тоном, брюшко светло-серое. Хвост может быть однотонно беловатым или двухцветным — темно-бурым сверху и беловатым снизу. Волосяной покров относительно пушистый, на зиму не белеет. Обитатель альпийского пояса гор, где придерживается каменистых мест — осыпей или участков с отдельными камнями. В целом слабоизученный вид. Населяет горно-тундровый и подгольцовый пояс в высокогорных районах Восточного Саяна, Хамар-Дабана и Байкальского хребта, за исключением северо-востока области. Численность подвержена ежегодным колебаниям, но в оптимальных местообитаниях (скальные останцы, окруженные луговой растительностью) средняя и высокая.

ООПТ: ЗП, ЛО.

72. Леммингoвая полевка — *Alticola lemminus* (Miller, 1899)

Мелкий коротколапый и на вид неуклюжий зверек с небольшим, покрытым волосами хвостом. Длина тела 91–105 мм, хвоста 16–21 мм. Уши у него небольшие, закругленные, подошвы лишь частично покрыты шерстью, волосы на конце хвоста образуют узкую длинную кисточку. Окраска верха летом пепельно-серая с легким палевым оттенком, более заметным на боках. Нижняя часть тела белесая, хвост двухцветный, сверху буровато-серый, снизу белесый. Зимой окраска меха леммингoвидной полевки чисто-белая, иногда с палевым налетом. Волосяной покров мягкий и пушистый. Населяет склоны, занятые тундрой с участками мелкокаменистых россыпей, в которых устраивает шарообразные гнезда. Роет норы в тех местах, где позволяет грунт. Летом активна круглосуточно, осенью — только в светлое время суток. Населяет горно-тундровый и подгольцовый пояс в высокогорьях Байкальского нагорья в северо-восточной части области. Численность подвержена ежегодным колебаниям.

ООПТ: ВГЗ.

73. Водяная полевка — *Arvicola amphibius* (Linnaeus, 1758)

Внешне похожа на крысу. Длина тела составляет 140–200 мм, хвоста — около 50 % длины тела. Тело массивное, неуклюжее, конечности относительно короткие. Голова большая, ушные раковины скрыты в шерсти. Мех густой с богатой подпушью. Окраска верха от тускло-серой до черной, чаще всего рыжевато-бурая. Брюхо светлее спины. Хвост покрыт редкими волосами. Питается прибрежными и плавающими растениями. Живет в норах длиной до трех метров. Населяет поймы рек и влажные участки вокруг озер, а также торфяные

болота. Населяет большую часть территории области, но распространена спорадически. Обитает на влажных лугах и заболоченных участках, преимущественно по берегам водоемов. Численность незначительна и подвержена ежегодным колебаниям. В настоящее время практически не добывается и промыслового значения не имеет. ОО.

ООПТ: ЗП, ПГ.

74. Узкочерепная полевка — *Lasiopodomys gregalis* (Pallas, 1779)

Полевка среднего размера с коротким хвостом. Длина тела составляет 100–125 мм, хвоста — 20–25 % длины тела. Окраска верха от светлой охристой до темно-бурой. Уши короткие. Питается многими видами травянистых растений, на зиму делает запасы корма. Роет сложные норы с множеством отверстий и гнездовых камер. Обитает в лесостепной зоне, а по долинам рек заходит в южную часть таежной зоны. Населяет остепненные и суходольные луга и окраины полей. Обычный, местами в отдельные годы многочисленный вид. Численность подвержена значительным колебаниям.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, КД, МГ, ПГ.

75. Темная (пашенная) полевка — *Agricola agrestis* (Linnaeus, 1761)

Темная полевка похожа на обыкновенную полевку, но темнее, длина хвоста составляет около четверти длины тела. Бугорки на ступне задней лапы продолговатые (у обыкновенной полевки — круглые). Длина тела до 140 мм, хвоста до 52 мм (от четверти до трети длины тела, редко больше). В окраске верха преобладают темные, серо-бурые тона. Задняя ступня с шестью подошвенными бугорками. Хвост от одноцветного до довольно отчетливо двухцветного, покрыт сравнительно редкими волосами. Является преимущественно обитателем влажных биотопов, в особенности заболоченных лесов. Хотя и роет норы, но обычно строит гнезда на поверхности земли. Населяет западное Прибайкалье, включая Приангарье, Приморский и юг Байкальского хребта, долину Лены до Киренского района, Приольхонье и окрестности Слюдянки. Обитает на полях, а в естественных условиях — на вырубках, зарастающих гарях и в смешанных лесах на склонах и на небольших водоразделах. Относительно редкий вид.

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЭД.

76. Монгольская полевка — *Alexandromys mongolicus* (Radde, 1861)

Мелкая короткохвостая полевка. Длина тела составляет 98–120 мм, хвоста — 20 % длины тела. Окраска верха темно-бурая, брю-

хо серое. Хвост двухцветный. Питается различными растениями, преимущественно использует подземные части (корни, корневища и луковицы). Активна эта полевка ночью. Норы у нее простые, гнездовые камеры часто устраивает внутри кочек. Имеются указания на находки вида на территории Слюдянского района и на острове Ольхон. Современное состояние и численность неизвестны.

ООПТ: ЗП.

77. Полевка Максимовича — *Alexandromys maximowiczii* (Schrenk, 1776)

Длина тела до 152 мм, хвоста до 69 мм (около трети длины тела). Окраска темно-бурая, брюшная поверхность темно-серая с палевым оттенком. Ступня постоянно с шестью мозолями. Норы поверхностные простого устройства. Питаются семенами, надземными и подземными частями растений. Зимние запасы достигают массы 10 кг на семью. Предпочитает увлажненные стации на лугах, в зарослях ив, по опушкам смешанных лесов с высокой травой. В период массового размножения вредит полям. Известны единичные находки этого вида, датированные серединой прошлого века, в верховьях Лены (в Жигаловском районе), достоверность которых рядом исследователей ставится под сомнение. Населяет лугово-болотно-кустарниковые сообщества. Современное состояние и численность неизвестны.

78. Восточная полевка — *Alexandromys fortis* (Buchner, 1889)

Длина тела до 170 мм, хвоста до 75 мм (от трети до половины длины тела). Окраска тела темная, серовато-бурая, хвост обыкновенно резко двухцветный: сверху черный, снизу беловатый. На ступне обычно пять, реже шесть подошвенных бугорков. Ярко выражена привязанность к обитанию вблизи пресных водоемов. Хорошо плавает и ныряет. Активность круглосуточная, летом преимущественно ночная. Образ жизни семейно-колониальный; все убежища (норы) одной колонии связаны между собой сетью тропинок, выгрызенных в траве. Имеются указания на встречи этого вида в прошлом веке на территории Иркутского и Слюдянского районов. Населяет лугово-болотно-кустарниковые сообщества. Современное состояние и численность неизвестны.

ООПТ: ЗП.

79. Полевка-экономка — *Alexandromys oeconomus* (Pallas, 1776)

Крупная длиннохвостая полевка. Длина тела от 100 до 150 мм, длина хвоста обычно составляет половину длины тела. Окраска верха от светло-буроватой до черновато-коричневой, нижняя часть тела

обычно светлее. Хвост резко двухцветный. Активны в течение круглых суток, но в основном в ночное время. Населяет практически всю территорию области. Местообитания луговые, кустарниковые и таежные, за исключением горных тундр. Оптимальными являются влажные луга по террасам озер и долинам рек. Обычный, местами в отдельные годы многочисленный вид. Численность подвержена значительным колебаниям.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ПГ, ТК, ТР, ЧС, ЭД.

80 Обыкновенная полевка — *Microtus arvalis* (Pallas, 1779)

Полевка средних размеров. Длина тела составляет 90–140 мм, хвоста — до 30–40 % длины тела. Окраска верха буроватая или коричневато-охристая. Брюхо грязно-белое. Хвост двухцветный: сверху коричневатый, снизу беловатый. Численность обыкновенных полевок подвержена колебаниям. Отмечена в Тофаларии, Иркутском и Слюдянском районах. Редкий малоизученный вид. Современное состояние и численность неизвестны.

ООПТ: ЗП.

81. Восточноевропейская полевка — *Microtus rossiaemeridionalis* (Ognev, 1824)

Полевка средних размеров, длина тела составляет 90–140 мм, хвоста — до 30–40 % длины тела. Окраска верха буроватая или коричнево-охристая. Брюхо грязно-белое, хвост двухцветный — сверху коричневый, снизу беловатый. Питается преимущественно зелеными частями различных растений, изредка ест насекомых и моллюсков, зимой — кору кустарников и деревьев. Зимой может встречаться в жилищах и хозяйственных постройках человека. Активна круглые сутки. Роет сложные норы, живет колониями. Возможно, была завезена с фуражом в 80-х гг. прошлого века и сразу дала вспышку численности. В настоящее время обычный вид, активно расширяющий свой ареал. Населяет лесостепные районы Приангарья.

ООПТ: ЗП.

82. Мышь-малютка — *Micromys minutus* (Pallas, 1771)

Очень мелкая мышь. Длина тела 47–70 мм, длина хвоста равна длине тела. Взрослый самец весит 7–10 г. Хвост очень подвижный, хватательный, способен обвиваться вокруг стеблей и тонких сучьев; задние лапы цепкие. Окраска заметно ярче, чем у домовой мыши. Окраска спины однотонная, буровато-охристая или рыжеватая, резко отграниченная от белого или светло-серого брюшка. Мордочка у мы-

ши-малютки, в отличие от мордочек других мышей, тупая, укороченная, уши небольшие. Населяет значительную часть территории области, за исключением сухих степей, но распространена неравномерно, предпочитает луга и заросли кустарников в интразональных биотопах и заброшенные поля (залежи). Везде редка, но на локальных участках может быть обычным видом.

Природоохранный статус: МСОП (NT).

ООПТ: ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТК, ЭД.

83. Полевая мышь — *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)

Мелкий грызун, длина тела 100–125 мм. Хвост немного короче туловища. Окраска верха тела рыжая с охристым или бурым оттенком. Вдоль хребта тянется черная полоса. Брюхо белесое. Обитатель лесной, лесостепной и степной зоны. Населяет увлажненные участки пойм рек, опушки леса, вырубки, поля. Питается семенами, листьями, стеблями и корнями растений и насекомыми. Норы простые и неглубокие. Населяет преимущественно агроценозы в верхней части долины Ангары и ее притоков от Иркутска на север до Братского и Нижнеудинского районов. В настоящее время везде редка, известны отдельные находки.

ООПТ: ЗП.

84. Восточноазиатская мышь — *Apodemus peninsulae* (Thomas, 1907)

Мышь среднего размера, но заметно крупнее домовой. Длина тела 100–125 мм, хвост немного короче туловища. Окраска верха тела коричневато-охристая, низ тела белесо-серый. Питается семенами и косточками плодов. Активна в сумерках и ночью. Роет простые норы. В течение года два помета по шесть-семь детенышей. Населяет леса и лесостепи различного типа. Предпочитает опушки, вырубки, захламленные участки леса, речные уремы. Реже встречается в чистых хвойных лесах. Населяет почти всю территорию области во всех местообитаниях, за исключением болот, сухих степей, горных тундр и гольцов. Обычный, в отдельные годы многочисленный вид.

ООПТ: ВГЗ, ЗП, ББ, ЗЛ, ИР, КД, КР, КЧ, ЛО, МГ, ОЗ, ТР, ТК, ЧС, ЭД.

85. Домовая мышь — *Mus musculus* (Linnaeus, 1758)

Размеры мелкие, изменчивы. Длина тела 45–100 мм (за исключением некоторых тропических форм), хвоста 30–110 мм (почти всегда несколько короче тела), масса до 40 г. Голова с укороченной мордочкой, глаза и уши небольшие. Ступня короткая (не более 19 мм),

довольно широкая. Мех относительно короткий. Окраска верха тела изменяется от серой до рыжевато-бурой, брюхо серовато-белесое или белое. При благоприятных температурных и кормовых условиях размножение происходит круглый год, хотя некоторая зимняя депрессия его отчетливо наблюдается и в постройках. В природе деятельны преимущественно в сумеречные часы. В постройках время суточной активности находится в обратной зависимости от деятельности человека. Живущие здесь мыши питаются самыми разнообразными животными и растительными продуктами. Обитает в населенных пунктах практически на всей территории области. Летом в южных и центральных районах может выселяться в прилегающие к населенным пунктам природные биотопы. Обычный вид.

86. Серая крыса (пасюк) — *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)

Длина тела до 275 мм, хвоста до 195 мм (всегда короче тела, особенно у форм из «дикой» природы, в среднем около 80 % его длины). Морда сравнительно тупая и широкая; ушная раковина, если ее отогнуть вперед, не достигает глаза. Хвост покрыт редкими волосами. Ступня относительно длинная (до 45 мм). Окраска верха от сравнительно светлой, рыжевато-бурой до более темной, грязно-охристо-бурой. Среди окрашенной таким образом основной массы волос выделяются отдельные, более длинные и жесткие остевые волосы с металлическим блеском. Волосы на брюшной стороне с темными основаниями. Обитает в населенных пунктах на большей части области. В южной части в летнее время встречается в естественных местообитаниях, предпочитая луговые и кустарниковые биотопы. Обычный вид.

ООПТ: ПГ.

87. Черная крыса — *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)

Самая мелкая из наших крыс длиной тела 130–190 мм. Мордочка у́же, а ушные раковины больше и круглее, чем у пасюка. Хвост, в отличие от хвоста пасюка, длинный, тонкий, превышающий длину тела, удивительно гибкий, при лазании он помогает зверькам. Шея хорошо выражена, мордочка удлиненная, с крупными выпуклыми глазами и большими ушными раковинами. На задних лапках между пальцами складок нет. Окраска изменчива, чаще двух типов: верх темно-коричневый с зеленоватым металлическим блеском у отдельных волос, на боках окраска светлеет и брюшная сторона пепельно- или грязно-серая; окраска верха как у крысы серой, несколько светлее и рыжее, брюшная сторона беловатая или желтоватая, нередко огра-

ниченная от охристой окраски боков или же сливающаяся с ней. Спорадическое обитание установлено в Тайшетском и Нижнеудинском районах, в окрестностях Иркутска и в Байкальске. По всей видимости, завезена на территорию области по железной дороге с грузами. Скорее всего, постоянно на территории области не обитает.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеенко М.Н. Встречи редких видов птиц на западном побережье Южного и Среднего Байкала (Прибайкальский национальный парк) в 2017–2021 годах // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии : материалы VII междунар. орнитол. конф., Иркутск, 15 сент. 2022 г. — Иркутск : Изд. дом. БГУ, 2022. — С. 13–17.

Байкало-Ленский заповедник / В.В. Попов, Ю.И. Мельников, С.К. Устинов, Н.В. Степанцова, В.Н. Степаненко, Н.И. Шабурова, Ю.Г. Швецов, Ф.Р. Штильмарк // Заповедники Сибири. — Москва : Логата, 2000. — Т. 2. — С. 175–190.

Баянов Е.С. Встречи некоторых видов птиц в Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2018. — № 1 (22). — С. 24–27.

Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. Москва, 1965. — 382 с.

Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья. — Иркутск, 1989. — 207 с.

Ботвинкин А.Д. Летучие мыши в Прибайкалье (биология, методы наблюдения, охрана). — Иркутск, 2002. — 194 с.

Васильченко А.А. Птицы Хамар-Дабана. — Новосибирск : Наука, 1987. — 104 с.

Вержуцкий Д.Б. Заметки по орнитофауне Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2014. — № 1 (14). — С. 39–47.

Витимский заповедник / И.С. Белянина, В.А. Сигарев, Е.В. Чечеткин, Л.Г. Чечеткина // Заповедники Сибири. — Т. 1. — Москва : ЛОГАТА, 1999. — С. 189–198.

Водопьянов Б.Г. Видовой состав птиц, гнездящихся в долине р. Н. Тунгуски // Промысловые животные и повышение эффективности охотничьего хозяйства. — Иркутск, 1988. — С. 22–29.

Водопьянов Б.Г. Видовой состав птиц, гнездящихся в озерно-таежном урочище «Абура» (Качугский район Иркутской области) // Зоологические исследования в Восточной Сибири : сб. тр. Иркут. СХИ. — Иркутск : ИСХИ, 1992. — С. 23–30.

Водопьянов Б.Г. Летнее население птиц бассейна р. Окунайки (западный участок зоны БАМа), их охрана и хозяйственное использование // Интенсификация производства в охотничьем хозяйстве. — Иркутск, 1989. — С. 46–54.

Волков С.Л. Гнездящиеся птицы города Бодайбо (Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2018. — № 1 (22). — С. 28–35.

Волков С.Л. Залеты птиц в Витимский заповедник в 2012–2016 годах // Байкальский зоологический журнал. — 2016. — № 2 (19). — С. 68–71.

Волков С.Л. Новые виды птиц Витимского заповедника // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Этология. Экология. — 2013. — Т. 6, № 3. — С. 108–110.

Волков С.Л. Птицы Витимского заповедника (аннотированый список) // Байкальский зоологический журнал. — 2015. — № 1 (16). — С. 91–102.

Встречи редких птиц в южном Прибайкалье в 2020 г. / И.В. Фефелов, А.А. Альмухамедов, В.А. Богданович, А.С. Большаков, М.К. Боровская, С.В. Василькова, А.В. Голубева, В.А. Красильникова, О.В. Михалева, Н.В. Попова, Н.В. Степанов, И.С. Сухов, Г.С. Хасанов // Байкальский зоологический журнал. — 2020. — № 2 (28). — С. 71–73.

Гагина Т.Н. Птицы Восточной Сибири (список и распространение) // Труды Баргузинского заповедника. — Москва, 1961. — Вып. 3. — С. 99–123.

Демидович А.П. Список грызунов Иркутской области // Всесоюзное совещание по проблемам кадастров и учета животного мира : тез. докл. — Москва, 1986. — Ч. 2. — С. 274–275.

Доржиев Ц.З. Птицы Байкальской Сибири: систематический состав, характер пребывания и территориальное размещение // Байкальский зоологический журнал. — 2011. — № 6. — С. 30–54.

Дыбовский Б.И., Годлевский В.А. Предварительный отчет о фаунистических исследованиях на Байкале // Приложение к отчету СО РГО за 1869 г. — Санкт-Петербург, 1870. — С. 167–203.

Заметки по орнитофауне Витимского заповедника / В.В. Попов, И.И. Баранчук, И.С. Белянина, С.В. Иванова, Д.М. Полушкин // ООПТ и сохранение биоразнообразия Байкальского региона : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию образования гос. природ. заповедника «Байкало-Ленский», 4–5 декабря 2001 г., г. Иркутск. — Иркутск, 2001. — С. 78–81.

Иванов А.И. Каталог птиц СССР. — Ленинград, 1976. — 276 с.

Ильяшенко В.Ю. Таксономический и правовой статус наземных позвоночных животных России. — Москва, 2001. — 150 с.

К изучению куликов Братского водохранилища / С.И. Липин, В.А. Толчин, Б.Г. Вайнштейн, В.Д. Сонин // Орнитология. — 1968. — Вып. 9. — С. 214–221.

Карякин И.В., Николенко Э.Г., Барашкова А.Н. Крупные пернатые хищники степных котловин Байкальского региона, Россия // Пернатые хищники и их охрана. — 2006. — № 7. — С. 21–45.

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен — современность / под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. — Ленинград, 1981. — 160 с.

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. — Москва, 2006. — 256 с.

Красная книга Иркутской области / редкол.: С.М. Трофимова. — Улан-Удэ : ПАО «Республиканская типография», 2020. — 520 с.

Красная книга Иркутской области. — Иркутск : Время странствий, 2010. — 400 с.

Красная книга России : правовые акты. — Москва, 2000. — 142 с.

Красная книга Российской Федерации : (Животные). — Москва : АСТ : Астрель, 2001. — 860 с.

Красная книга РСФСР : (Животные). — Москва : Россельхозиздат, 1985. — 454 с.

Красная книга СССР. — Москва : Лесная промышленность, 1984. — Т. 1. — 390 с.

Красная книга Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. — Иркутск : ООО «Время странствий», 2003. — 164 с.

Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений / отв. ред. В.Е. Присяжнюк ; Лаб. Крас. кн.; Всерос. науч.-исслед. ин-т охраны природы. — Москва, 2004. — 2-й вып. — Ч. 1. Позвоночные животные. — 304 с.

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. — Москва, 1999. — 298 с.

Куницын А.А., Попов В.В. К распространению амфибий и рептилий в верхней части бассейна р. Чона (Катанский район, Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2009. — № 1. — С. 46–47.

Лисовский А.А. Сравнительный анализ акустического репертуара и изменчивости звуковых сигналов пищух (Ochotona, Mammalia) группы alpina-hyperborea // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. — 2005. — Т. 110, вып. 6. — С. 12–26.

Лисовский А.А., Лисовская Е.В. Материалы к изучению долины р. Нижняя Тунгуска // Труды государственного заповедника «Центральносибирский». — Красноярск, 2007. — Вып. 1. — С. 230–244.

Литвинов Н.И. Земноводные и пресмыкающиеся Прибайкальского национального парка // Труды Прибайкальского национального парка : юбилейн. сб. науч. ст. к 20-летию Прибайкал. нац. парка. — Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. — Вып. 2. — С. 150–164.

Литвинов Н.И. Фауна млекопитающих Иркутской области. — Иркутск, 2000. — 80 с.

Литвинов Н.И. Фауна островов Байкала : (наземные позвоночные животные). — Иркутск, 1982. — 132 с.

Литвинов Н.И., Гагина Т.Н. Птицы острова Ольхон // Экология птиц Восточной Сибири. — Иркутск, 1977. — С. 176–188.

Лямкин В.Ф. Аннотированный список наземных млекопитающих (Mammalia) котловины озера Байкал // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. — Новосибирск, 2001. — Т. 1. Озеро Байкал. — С. 176–250.

Лямкин В.Ф. Земноводные (Amphibia) // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. — Новосибирск, 2001. — Т. 1. Озеро Байкал. — С. 1051–1056.

Лямкин В.Ф. Пресмыкающиеся (Reptilia) // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. — Новосибирск, 2001. — Т. 1. Озеро Байкал. — С. 1057–1061.

Малеев В.В., Попов В.В. К распространению поганок на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа // Вестник Бурятского университета. Спец. сер.: Сибирская орнитология. — 2006. — Вып. 4. — С. 148–155.

Малеев В.Г. К распространению амфибий и рептилий на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (Верхнее Приангарье) // Байкальский зоологический журнал. — 2009. — № 1. — С. 48–49.

Малеев В.Г., Попов В.В. Изменение орнитофауны Верхнего Приангарья // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2006. — № 2 (46). — С. 79–84.

Малеев В.Г., Попов В.В. Определитель птиц Иркутской области. — Иркутск : Время странствий, 2010. — 300 с.

Малеев В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верхнего Приангарья. — Иркутск : НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2007. — 276 с.

Малышев Л.И. Материалы к орнитофауне Прибайкалья // Зоологический журнал. — 1958. — Т. 37, вып. 7. — С. 1103.

Мельников Ю.И. К авифауне бассейна Нижней Тунгуски в пределах Иркутской области // Русский орнитологический журнал. — 2000. — Вып. 89, экспресс-вып. — С. 10–16.

Мельников Ю.И. Новые виды птиц котловины оз. Байкал (вторая половина XX — начало XXI столетия) // Природа Внутренней Азии. — 2017. — № 3 (4). — С. 38–63.

Мельников Ю.И. Птицы дельты реки Голоустная (западное побережье Байкала): новые материалы о численности и распределении в летний период // Байкальский зоологический журнал. — 2010. — № 5. — С. 36–46.

Мельников Ю.И. Птицы Зиминско-Куйтунского степного участка (Восточная Сибирь). Ч. 1. Неворобьиные // Русский орнитологический журнал. — 1999. — Вып. 60, экспресс-вып. — С. 3–14.

Мельников Ю.И. Птицы Зиминско-Куйтунского степного участка (Восточная Сибирь). Ч. 2. Воробьиные // Русский орнитологический журнал. — 1999. — Вып. 61, экспресс-вып. — С. 3–13.

Мельников Ю.И. Птицы Ново-Ленинских (Иннокентьевских) болот города Иркутска во второй половине XX столетия: видовая структура, обилие и фенология основных жизненных циклов // Байкальский зоологический журнал. — 2011. — № 7. — С. 30–68.

Мельников Ю.И. Редкие виды гусей на территории Прибайкалья: распространение и характер пребывания // Русский орнитологический журнал. — 1997. — № 21, экспресс-вып. — С. 14–22.

Мельников Ю.И. Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц Байкальской Сибири // Труды государственного природного заповедника «Байкало-Ленский». — Иркутск : РИО НЦ РВК ВСНЦ СО РАМН, 2006. — Вып. 4. — С. 147–162.

Мельников Ю.И., Гагина-Скалон Т.Н. Птицы озера Байкал (с конца XIX по начало XXI столетия) : видовой состав, распределение и характер пребывания // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. — 2016. — Т. 121, вып. 2. — С. 13–32.

Мельников Ю.И., Дурнев Ю.А. Редкие и малоизученные околоводные птицы Предбайкалья // Русский орнитологический журнал. — 2009. — Т. 18, № 495, экспресс-вып. — С. 1131–1147.

Мельников Ю.И., Купчинский А.Б. Новые регистрации редких и малочисленных видов птиц на озере Байкал // Байкальский зоологический журнал. — 2018. — № 2 (23). — С. 46–49.

Мельникова Н.И., Водопьянов Б.Г., Пронкевич В.В. Видовой состав и структура населения птиц бассейна реки Тетеи // Вестник ИГСХА. — 1997. — Вып. 4. — С. 16–19.

Млекопитающие России : список видов и прикладные аспекты / А.А. Лисовский, Б.И. Шефтель, А.П. Савельев, О.А. Ермаков, Ю.А. Козлов, Д.Г. Смирнов, В.В. Стахеев, Д.М. Глазов. — Москва, 2019. — 193 с.

Натыканец В.В. Дополненный список видов птиц в г. Братске (Иркутская область) и его окрестностях, встреченных в конце мая — первой половине июня (2019, 2021 и 2022 гг.) // Байкальский зоологический журнал. — 2022. — № 2 (32) — С. 51–57.

Натыканец В.В. Регистрация видов птиц в г. Братске (Иркутская область) и в его окрестностях в конце мая — первой половине июня в 2019 и 2021 гг. // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 2 (30) — С. 92–97.

Находки туруханской пищухи (*Ochotona turuchanensis* Naumov 1934) на Приморском хребте (Иркутская область) / Н.Г. Борисова, А.А. Никулин, Н.А. Никулина, С.В. Попов, А.И. Старков, С.Ю. Ленхобоева // Зоологический журнал. — 2002. — Т. 101, № 1. — С. 94–100.

О распространении журавлей на юге Восточной Сибири / Ю.И. Мельников, В.В. Попов, С.И. Липин, В.Д. Сонин, Ю.А. Дурнев // Журавли Палеарктики. — Владивосток, 1988. — С. 168–176.

О распространении земноводных и пресмыкающихся в Прибайкалье / Ю.И. Мельников, В.Н. Степаненко, С.К. Устинов, С.Ю. Артемьева // Труды государственного природного заповедника «Байкало-Ленский». — Иркутск : Листок, 2001. — Вып. 2. — С. 119–123.

Оловянникова Н.М. Авифауна Байкало-Ленского заповедника // Труды государственного природного заповедника «Байкало-Ленский». — Иркутск : РИО НЦ РВК ВСНЦ СО РАМН, 2006. — Вып. 4. — С. 183–197.

Панова А.А. Заметки по орнитофауне окрестностей пос. Магистральный (Казачинско-Ленский район, Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2014. — № 1 (14). — С. 85–90.

Поваринцев А.И., Саловаров В.О., Свиридова Е.А. Результаты исследования орнитофауны государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» (июль — сентябрь 2014 года) // Байкальский зоологический журнал. — 2016. — № 2 (19). — С. 87–93.

Попов В.В. Амурский тигр *Panthera tigris altaica* (Temminck, 1844) в Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2011. — № 2 (7). — С. 114–115.

Попов В.В. Встречи птиц в окрестностях г. Киренска и пос. Ербогачен (Иркутская область) в июне 2021 г. // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 2 (30). — С. 98–101.

Попов В.В. Встречи птиц в северных районах Иркутской области в полевой сезон 2022 года // Байкальский зоологический журнал. — 2022. — № 2 (32). — С. 77–81.

Попов В.В. Залетные виды птиц Иркутской области // Природа Внутренней Азии. — 2019. — № 1 (10). — С. 55–77.

Попов В.В. Заметки по встречам птиц в северных районах Иркутской области в полевой сезон 2020 г. // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 1 (29). — С. 78–81.

Попов В.В. Заметки по орнитофауне западных районов Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2019. — № 2 (25). — С. 68–71.

Попов В.В. Заметки по орнитофауне окрестностей г. Братска (Иркутская область) // Русский орнитологический журнал. — 2018. — Т. 27, № 1617, экспресс-вып. — С. 2560–2565.

Попов В.В. Заметки по орнитофауне Усть-Илимского района (Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2018. — № 2 (23). — С. 61–66.

Попов В.В. Заметки по орнитофауне Усть-Кутского района (Иркутская область) // Русский орнитологический журнал. — 2018. — Т. 27, № 1613, экспресс-вып. — С. 2417–2420.

Попов В.В. Заметки по осенней авифауне верховий реки Лена (Качугский район, Иркутская область) // Труды Байкало-Ленского государственного природного заповедника. — Иркутск, 2001. — Вып. 2. — С. 107–114.

Попов В.В. Заметки по осенней орнитофауне среднего течения реки Тэтэрэ (Катангский район, Иркутская область) // Русский орнитологический журнал. — 2018. — Т. 27, № 1679, экспресс-вып. — С. 5003–5005.

Попов В.В. Интересные встречи птиц в Иркутской области в полевой сезон 2015 г. // Байкальский зоологический журнал. — 2016. — № 1 (18). — С. 105–107.

Попов В.В. Интересные встречи птиц в Прибайкалье : полевой сезон 2013 года // Байкальский зоологический журнал. — 2014. — № 1 (14). — С. 91–94.

Попов В.В. Интересные встречи хищных птиц в Прибайкалье // Хищные птицы Восточной Европы и Северной Азии : материалы III конф. — Ставрополь, 1998. — С. 100–102.

Попов В.В. К распространению редких видов птиц долины р. Киренги // Орнитология. — Москва, 1984. — Вып. 19. — С. 185.

Попов В.В. К распространению сов в Прибайкалье // Совы Северной Евразии. — Москва, 2005. — С. 403–409.

Попов В.В. Кадастр охотничьих видов зверей и птиц Иркутской области : распространение, численность, охрана и использование. — Иркутск : НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2009. — 68 с.

Попов В.В. Кадастр позвоночных животных Иркутской области не относящихся к объектам охоты. — Изд. 3. — Иркутск : Время странствий, 2018. — 102 с.

Попов В.В. Материалы по распространению в Иркутской области редких видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации, но не вошедших в Красную книгу Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2020. — № 2 (28). — С. 64–70.

Попов В.В. Млекопитающие Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2011. — № 1 (6). — С. 69–78.

Попов В.В. Наземные позвоночные Иркутской области : распространение и охрана. — Иркутск : Время странствий, 2015. — 142 с.

Попов В.В. О птицах долины р. Чулы (Катангский район, Иркутская область) // Русский орнитологический журнал. — 2018. — Т. 27, № 1653, экспресс-вып. — С. 3918–3920.

Попов В.В. Птицы (Aves) // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. — Новосибирск : Наука, 2004. — Т. 1. Озеро Байкал. — Кн. 2. — С. 1062–1198.

Попов В.В. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер пребывания. Гагарообразные — журавлеобразные // Байкальский зоологический журнал. — 2012. — № 1 (9). — С. 36–62.

Попов В.В. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер пребывания. Ржанкообразные — дятлообразные // Байкальский зоологический журнал. — 2013. — № 1 (12). — С. 49–80.

Попов В.В. Расширение ареалов птиц в Иркутской области: северное направление // Природа Внутренней Азии = Nature of Inner Asia. — 2021. — № 1 (17). — С. 66–95.

Попов В.В. Редкие виды животных Иркутской области. — Иркутск : Время странствий, 2020. — 128 с.

Попов В.В., Жовтюк П.И. Полевой определитель хищных птиц и сов Иркутской области. — Иркутск : Время странствий, 2012. — 42 с.

Попов В.В., Матвеев А.Н. Позвоночные животные Байкальского региона: видовой состав и правовой статус. — Иркутск : Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2005. — 86 с.

Попов В.В., Оловянникова Н.М., Мурашов Ю.П. Распространение ржанкообразных птиц в Байкало-Ленском заповеднике // Русский орнитологический журнал. — 2002. — Вып. 203, экспресс-вып. — С. 1037–1044.

Попов В.В., Поваринцев А.И. Заметки по орнитофауне долины р. Малой Белой (Черемховский район, Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2015. — № 2 (17). — С. 70–72.

Попов В.В., Поваринцев А.И., Фефелов И.В. Встречи птиц в северных районах Иркутской области: полевой сезон 2021 года // Байкальский зоологический журнал. — 2022. — № 1 (31). — С. 73–77.

Попов В.В., Саловаров В.О. Распространение хищных птиц и сов в Ангарском районе (Южное Прибайкалье) // Хищные птицы Восточной Европы и Северной Азии : материалы III конф. — Ставрополь, 1998. — С. 98–100.

Попов В.В., Саловаров В.О. Редкие виды птиц Ангарского района (Южное Прибайкалье) // Орнитологические исследования в России. — Улан-Удэ, 2000. — С. 191–194.

Попов В.В., Саловаров В.О. Хищные птицы лесостепи Предбайкалья в послегнездовой период // Вестник ИГСХА. — 1999. — Вып. 14. — С. 48–50.

Попов В.В., Серышев А., Куницын А.А. Заметки по летней орнитофауне верхнего течения р. Чоны (Катангский район Иркутской области) // Байкальский зоологический журнал. — 2009. — № 1. — С. 69–75.

Попов В.В., Серышев А.А. Заметки по орнитофауне Братского района (Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2016. — № 2 (19). — С. 94–96.

Попов В.В., Серышев А.А. К орнитофауне верховий р. Чоны (Катангский район, Иркутская область) // Русский орнитологический журнал. — 2018. — Т. 27, № 1652, экспресс-вып. — С. 3886–3890.

Попов В.В., Серышев А.А. К орнитофауне долины р. Киренга (Иркутская область) // Байкальский зоологический журнал. — 2014. — № 2 (15). — С. 74–80.

Попов В.В., Серышев А.А. К орнитофауне долины р. Ханда (Иркутская область, Казачинско-Ленский район) // Байкальский зоологический журнал. — 2016. — № 2 (19). — С. 97–100.

Попов В.В., Хидекель В.В. Орнитологические наблюдения в долине нижнего течения реки Китой // Русский орнитологический журнал. — 2001. — № 152, экспресс-вып. — С. 614–619.

Преловский В.А. Герпетофауна Прибайкальского национального парка // Труды Прибайкальского национального парка : юбилейн. сб. науч. ст. к 20-летию Прибайкал. нац. парка — Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. — Вып. 2. — С. 165–173.

Пыжьянов С.В. Летнее население птиц поймы и островов нижнего течения реки Ангары // Байкальский зоологический журнал. — 2013. — № 12. — С. 81–86.

Пыжьянов С.В. Список птиц побережья Малого моря и прилегающих территорий // Труды Прибайкал. нац. парка : юбилейн. сб. науч. ст. к 20-летию Прибайкал. нац. парка — Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. — Вып. 2. — С. 218–229.

Пыжьянов С.В., Тупицын И.И., Попов В.В. К изучению птиц окрестностей дельты реки Голоустной // Байкальский зоологический журнал. — 2010. — № 1 (4). — С. 65–70.

Редкие виды птиц Байкало-Ленского заповедника / В.В. Попов, Ю.П. Мурашов, Н.М. Оловянникова, В.Н. Степаненко, С.К. Устинов // Труды Байкало-Ленского государственного природного заповедника. — Москва : Инкомбук, 1998. — Вып. 1. — С. 95–98

Редкие животные Иркутской области (наземные позвоночные) / под ред. В.Д. Сонина. — Иркутск : Облмашинформ, 1993. — 256 с.

Редкие и малоизученные позвоночные животные Предбайкалья: распространение, экология, охрана / Ю.А. Дурнев, Ю.И. Мельников, И.В. Бояркин, И.Б. Книжин, А.Н. Матвеев, Д.Г. Медведев, В.В. Рябцев, В.П. Самусёнок, М.В. Сонина. — Иркутск, 1996. — 288 с.

Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири / Москва ; Ленинград, 1966. — 418 с.

Рябицев В.К. Птицы Сибири. — Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый. — Т. 2. — 352 с.

Рябцев В.В. Динамика орнитофауны Прибайкальского национального парка на рубеже XX и XXI веков // Труды Прибайкальского национального парка : юбилейн. сб. науч. ст. к 20-летию Прибайкал. нац. парка. — Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. — Вып. 2. — С. 30–254.

Рябцев В.В. Орлы Байкала. — Иркутск : АЭМ «Тальцы», 2000. — 128 с.

Рябцев В.В., Воронова С.Г. Редкие и малоизученные птицы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа : проблемы охраны // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2006. — № 2 (46). — С. 140–145.

Саловаров В.О., Демидович А.П., Кузнецова Д.В. К фауне птиц Нижней Тунгуски // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Биология, Экология. — 2009. — Т. 2, № 2. — С. 45–50.

Саловаров В.О., Попов В.В. Птицы заказника «Сушинский Калтус» // Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. — Иркутск, 1998. — С. 192–197.

Скалон В.Н. Пернатые хищники Верхнего Приангарья и их роль в жизни человека // Известия Ирк. ПЧИ Сиб. и ДВ. — Москва ; Иркутск, 1934. — Т. 1. — С. 55–83.

Скалон В.С., Шаргаев М.А. Млекопитающие Прибайкалья : (общий инвентаризационный список) // Насекомые и позвоночные Забайкалья : тр. Бурят. ин-та естеств. наук БФ СО АН СССР. — Улан-Удэ, 1977. — Вып. 21. — С. 67–73.

Скрябин Н.Г. Водоплавающие птицы Байкала. — Иркутск, 1975. — 244 с.

Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. — Москва : МСОП, 2003. — Вып. 1. Позвоночные животные. — С. 56–71.

Список птиц города Иркутска и его окрестностей / С.И. Липин, В.Д. Сонин, Ю.А. Дурнев, В.И. Безбородов // Экология наземных позвоночных Восточной Сибири. — Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1988. — С. 70–79.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. — Москва : Наука, 1990. — 728 с.

Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР : Воробьинообразные *Passeriformes*. — Москва : Наука, 1978. — 392 с.

Степанян Л.С. Состав и распределение птиц фауны СССР : Неворобьиные *Non-Passeriformes*. — Москва : Наука, 1975. — 370 с.

Тарасов М.П. Границы распространения некоторых видов птиц и млекопитающих на севере Средней Сибири // Зоологический журнал. — 1965. — Т. 44, вып. 12. — С. 1835–1841.

Тачановский В.К. Критический обзор орнитологической фауны Восточной Сибири // Труды 5-го съезда русских естествоиспытателей и врачей в Варшаве. Отд.: Зоология. — 1877. — Вып. 5. — С. 284–386.

Тимофеев В.В. Звери нашей области. — Иркутск, 1949. — 96 с.

Ткаченко М.И. Птицы реки Нижней Тунгуски // Известия Иркутского государственного научного музея. — Иркутск, 1937. — С. 152–162. — (Тр. о-ва изучения Вост.-Сиб. обл.)

Толчин В.А., Заступов В.П., Сонин В.Д. Материалы к познанию куликов Байкала // Орнитология. — Вып. 13. — Москва : Изд-во МГУ, 1977. — С. 40–48.

Тропина М.Г. К морфологии, распространению и экологии бурых лягушек Западного Прибайкалья // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 1 (29). — С. 52–58.

Тупицын И.И. К изучению авифауны северных районов Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2009. — № 1. — С. 81–86.

Тупицын И.И., Оловянникова Н.М. Фаунистические заметки о птицах «Лебединых озер» (Казачинско-Ленский район) // Байкальский зоологический журнал. — 2013. — № 12. — С. 87–93.

Фетисов А.С. Определитель грызунов Прибайкалья и Забайкалья. — Иркутск, 1940. — 42 с.

Фефелов И.В. К летней авифауне центральных частей Балаганского и Жигаловского районов Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 1 (29). — С. 82–85.

Фефелов И.В. К орнитофауне запада Иркутской области // Русский орнитологический журнал. — 1998. — № 38, экспресс-вып. — С. 15–19.

Фефелов И.В. Обзор редких находок птиц на юге Байкала весной и летом 2022 г. // Байкальский зоологический журнал. — 2022. — № 2 (32). — С. 151–152.

Хасанов Г.С., Богданович В.А. Интересные встречи птиц в Республике Бурятия и Иркутской области // Байкальский зоологический журнал. — 2021. — № 2 (30). — С. 126–127.

Холин А.В., Вержуцкий Д.Б., Попов В.В. Материалы по современному распространению и популяционной структуре длиннохвостого суслика (*Spermophilus undulatus*) в Иркутской области и западной Бурятии // Байкальский зоологический журнал. — 2020. — № 2 (28). — С. 93–104.

Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. — Новосибирск. 1977. — 153 с.

Швецов Ю.Г., Смирнов М.Н., Монахов Г.И. Млекопитающие бассейна озера Байкал. — Новосибирск, 1984. — 258 с.

Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. — Новосибирск, 1989. — 360 с.

Scalon W.N., Sludsky A.A. Sur la faune des oiseaux du basin d'Angara // Le Gerfaut. Revue d'Ornithologlie. — 1933. — Fasc. 4. — P. 189–202.

Stegmann B. Die Vogel des nordlichen Baikal // Journ. Fur Ornithologie. — 1936. — Jg. 84, Hf. 1. — S. 58–139.

Taczanowski L. Faune ornitologique de la Sibirie orientale. — St.-Petersbourg, 1891. — 684 p.

Научное издание

Попов Виктор Васильевич

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС И ОХРАНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлено к печати Т.В. Мари
Верстка Е.С. Ловчагиной
Дизайн обложки А.А. Мартыновой

ИД № 06318 от 26.11.01.
Подписано в печать 16.05.23. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 12,25.
Тираж 500 экз. (1-й з-д 1–33). Заказ .

Издательский дом ФГБОУ ВО «БГУ».
Отпечатано в ИПО ФГБОУ ВО «БГУ».
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.
http://bgu.ru.